

仲景傷寒集註卷之三

發熱九十二

○ 翁：發熱者，明其熱在外，屬表。風寒客于皮膚，邪氣拂鬱于外，表熱

而裏不熱也。蒸：發熱者，明其熱在裏，乃陽氣下入陰中，裏熱甚而外連于表也。太陽之熱，則

以肌膚為表，膀胱為裏。

太陽發熱在皮膚。肌肉之間按則無。無汗惡寒邪在

表。頭疼身熱項背強加減芍藥。三四季通浮緩惡風

兼自汗。冲和四季。四並宜煎熱渴漉癰浮脉見熱入

膀胱用五苓。散。此太陽之裏症，蓋五苓汗後惡寒仍發

熱。醫家只以小柴一行。

皮癢肌。肉熱屬陽明。鼻乾目痛不能眠。浮長熱在陽

明表解肌須用葛根湯一皆寒惡渴飲水洪長見類

陽明表裏熱相兼白虎加人參湯若不惡寒反惡熱內

實占語班與狂便秘亂煩洩更赤陽明之裏熱邪干

調胃承氣

表熱未除邪入裏十主之為不作實之形此是邪傳半表

裏少陽見症又須知耳聾胸滿往來寒熱

弦而細有時候者謂之潮熱無從中治用小柴胡一

大抵治太陽禁下陽明禁利小便少陽禁汗下禁利

熱之表裏既分明及其虛實又當評頭疼口燥思冷

飲占言狂亂擲和揚六脉浮洪俱數實此為實熱記

八
梔子黃
芩湯

須詳宜下汗後陰陽脉並虛不疼頭不渴小溲清氣

短懶言常閉目四體如何又不收便滑細沉微六部

熱焉不止是虛炎宜溫○若下利厥逆裏寒外熱脉

下利清谷、脉浮遲、表熱裏寒、用四逆湯、九○若發

熱頭痛、心中煩、梔子黃芩湯、○若虛羸、微熱、不、良者

竹葉石膏湯、四主之、實者汗之下之、虛者溫之、補之、

此治熱之六法也、○經云、陽明脉俱虛、熱不止者死、

下利發熱者死、汗出輟復熱、而脉躁疾、不為汗衰、狂

言不能食、此為陰陽交死、

梔子黃芩湯八十八○梔子 芍藥 生地 柴胡 黃

葛根

又 總詩一脊

太陽發熱惡風寒汗出陽明胃汁乾○嘔逆頭疼身發

麻黃附子細辛湯八九

小柴胡加芍藥湯九十
小柴加白虎湯九十一

熱。醫。師。當。作。少。陽。看。太。陰。厥。陰。俱。不。熱。惟。獨。少。陰。良。

有。設。陰。症。發。熱。自。不。同。脉。沉。下。利。四。肢。厥。無。頭。獨。取。

麻。附。細。甘。湯。三。四。日。來。宜。最。忌。得。時。可。用。之。初。

麻。黃。附。子。細。辛。湯。八。十。九。○。治。少。陰。發。熱。脉。沉。○

麻黃附子細辛各三錢
附子半個 水煎

寒。熱。往。來。九。十。三。

陰。陽。相。勝。三。爭。強。往。來。寒。熱。有。何。常。先。寒。後。熱。爲。陰。

盛。後。寒。先。熱。盛。於。陽。陰。不。足。者。小。柴。胡。邪。多。在。表。多。

寒。至。如。多。在。裏。熱。還。多。熱。盛。小。柴。加。白。虎。寒。多。須。用。

大。青。龍。八。其。來。寒。熱。如。相。半。方。中。只。用。小。柴。胡。多。寒。

者加桂熱多熱結於中逾十日大柴胡下又須知
有病至十餘日而結熱在裏脉實而寒熱往來者此
內實也宜此湯下之

小柴胡加芍藥湯九十 即本湯一加芍藥

小柴胡加白虎湯九十一 即小柴胡一合白虎湯
一二十

潮熱九十四

熱入陽明胃腑中未申潮熱日來冲少陽寅卯陽巳午若熱發

于此四時者謂邪未入胃不謂之潮熱若一日三五發者是發熱也亦非潮熱燥屎在胃

成斯症調胃承湯十下最宜不潮不渴無占語大便

如常脉且浮表症尚留豈可下必須候裏莫胡為必

大便實而占語燥渴自汗脉洪數有帶表熱潮無下
力潮熱急用調胃承氣湯下之無疑

症小柴一加減用無疑。或肺浮而緊與瀉而利或

未全入腑用此湯和解。○若結胸而潮熱脉不浮者

用大陷胸湯。○若下後仍發熱而潮者或腹中餘垢

解而潮熱者或已下後仍發熱而潮者或腹中餘垢

欠淨胸中脹滿而潮者並用大柴胡湯。七

大陷胸湯九十二○治大結胃○芒硝九錢五分

遂一分二厘為末水二升中先煎至大黃一

中去渣入硝又煎一沸入遂末服得利即止

大陷胸湯用大黃芒硝

并遂共相防。

汗後發熱九十五

汗後依然熱不回休說陰陽交便危裏症具和表未

盡。有裏症已具而然者汗多虛熱亦能然汗餘燥渴

有表邪未盡而然者汗多虛熱亦能然汗餘燥渴

皆如是四般餘熱又須知。若一二日發汗後仍熱不

退或頭疼項強惡寒等未

除、脉尚浮緊，此寒邪未盡也。冬再與麻黃湯，三三時
再與加減芍藥散。三若頭疼身痛惡風，自汗等未
除，脉尚浮緩者，此風邪未盡也。冬再與桂枝湯，四三
時再與冲和湯。四若發汗，身涼半日許，復熱，脉轉
洪數，或滿腹脇痛，口燥咽逆，此邪在半表裏也。用小
柴胡湯，一。若汗後仍熱，悸眩，身潤動，脉弱者，用真
武湯，三。咳者，加五味細辛、干姜、附子，去茯苓。
大便利者，去芍藥，再加乾姜、附子。若汗後，口渴煩熱，脉洪大者，用竹葉石膏湯，四。若
大汗後，熱愈甚，脉躁疾者，此名陰陽交，死不治。
又如汗出無能盡，變成瘡，狀二三翻。一度發作，二三
身痒，因何故？只緣小汗欲求通。宜芍藥散，九或冲和
屬之于少陽，宜小柴胡，一。若但浮，不眩，而無胸脇痛，則
還屬太陽，宜芍藥散。九冲和湯，四。若汗後不惡風寒，
而反惡熱者，則屬陽明內實，宜調胃承氣。十下之，有
身熱加柴胡，一。大凡傷寒發汗已，熱不退，不可便作
汗，後不解，以為危症，斷之。須分邪氣表裏之未盡，或
半表半裏，若表邪未盡，再宜汗之。裏症悉具，可議下。

之半表裏必當和之此大法也

真武湯九十三。治陰症傷寒，脉沉細，身體痛，或

發少陰汗，致筋惕肉瞤等症。真武茯苓芍藥附

生薑白朮共相扶。○茯苓芍藥生薑附

加五味干姜細辛各一錢，小便不利者，去茯苓，

苓下利者，去芍藥，加干姜二錢，嘔者，去附子，倍

下後發熱九十六

下餘猶熱，為何因？宿垢緣來未盡行，胸滿腹疼，還實

數，須教再與大柴胡。○七下後身熱不退，或胸中堅滿

實者，此藥力未到，積垢未消，腹中疼痛未止，脉尚數，未盡復與大柴胡湯。七下下亡陰，血熱不痊，脉瀉，須

葶藶苦酒湯九

將葶苈煎

葶苈酒湯

身熱心中仍結痛頭汗懊懷梔豉

三先

下後如此此湯治之

○有發汗而復下之惡寒發熱無休

止時

小建中湯

○九傷寒下藥必須用湯能蕩滌

邪穢

醫者不識以九藥下之至餘熱留而不去微煩

用梔

子干姜湯一梔子十枚干姜二錢五分○有大

下之

後熱不退再三下之熱愈盛若下之愈則邪

氣虛

脉弱不加法則無可生之理畏而不下則邪

熱極

盛陰氣極衰脉息斷絕必不可救似此之症下

之亦

死不下亦死醫者到此殺人活人一彈指間其

不至

于手足失措者幾稀矣按余論云傷寒下後自

汗虛

熱不已不拘有汗無汗俱宜參白虎湯一二十

加蒼

術地骨皮一服如神熱退身涼通仙之法也仍

用涼

膈六合解毒二三調之○大九傷寒二三下

後或

因邪氣壅塞未盡而熱不退者或因傳經日數

未至

而熱不退者醫者不可歸咎于下處用補藥以

助熱

如抱薪救火變症立殆可不慎歟亦須看脉之

力無

實有

葶藶苦酒湯九十四○治發黃煩燥面赤咽痛大

下傷血發熱脉瀼

苦酒一升五合葶藶一合生艾汁半升無取熱艾煎水

一升煎七合作三次服

勞復發熱九十七

或多語或忿怒思慮勞動俱是

新瘥氣血未能平失於調理自辛勤邪熱還經症復

舉但宜加減小柴

一行

補中益氣湯亦妙隨症以

出而解如神之妙或參胡三白湯五

食復發熱九十八

新瘥土弱谷難勝多食因而食復成加減小柴胡一

是主腹脹還宜厚朴侵

如閉脉實大熱燥渴占語又腹痛便實宜下之

燒視散
九十五

若所傷之食不多，其人稟氣素弱，但煩熱，只宜竹葉
石膏湯。因食早，謂之遺熱，經曰：病已瘥，若微煩，說不
可抵勞者，以新虛不勝谷食故也。當損谷，則不致張惶。若
大抵勞復，二症醫者識得秘妙，則先病十四日
出病七日，出汗，今復舉，亦要七日出汗，先病十四日
為慮也。瘥症三四次復舉，亦三四次戰汗，此不

女勞復熱九十九

病瘥之後，早行房，增寒發熱，目生花，腰背俱疼，頭甚
重。小腹之中裏急疼，或時陰火來冲上，關熱於頭及
面中心間煩悶，如何治？竹葉燒視散甚良。有熱加柴
散，外縮離經皆不治。脉沉足冷，又須溫。用常歸四逆
湯，心送下赤

衣散，六九節卷以道
遙散，七九主之

竹葉燒
棍散九
十五
赤衣散
九十六
逍遙散
九十七

燒棍散九十五○治男子用婦人棍襠近隱處取
一塊燒灰白湯下日三服良婦人取男須着久者

竹葉燒棍散九十五○以淡竹葉煎湯送下前棍

襠灰便是

赤衣散九十六 即前燒棍散

逍遙散九十七○治傷寒瘥後氣血未平勞動助

熱復還于經以及女勞復陰陽易此症最難調

治予魚見舌出數寸而死者多矣用此湯每得

奇功○我有逍遙湯參茸滑石膏知連生竹葉

柴犀姜朮藏人參知母竹青外縮腹痛

倍加入之黃連

井草滑石

生地 柴胡 犀角 姜朶 臨服入燒
利、陰、頭、腫、錢五分、有粘汗出而効、不出再服、小水
即愈

瘥後飲酒復劇一百

傷寒病熱去瘥除。飲酒因而熱轉增。弦數小柴一加

解毒。一三十烏梅砂仁乾葛也。須尋洪大人參添白虎。

二十黃連解毒一三十合為宜。亦加砂仁烏梅乾葛。

婦人熱入血室一百一

中風發熱惡寒時。適來經水是何如。七八脉遲熱自

退。脇胸滿似結胸形。更加占語如何治。須加生地小

柴胡。一丹皮歸尾和香附。紅花只壳及乾姜。

又

中風七八日之辰。熱寒發作有時。侵適斷其經血必結。丹皮歸地小柴胡。

又

傷寒發熱適來經明。于晝暮占言。如見鬼兮無妄。

治丹皮生地小柴胡。一婦人陽明經病下血。占語此

姜主之。此陽明經病。乃傷寒從太陽經傳至此。而病

如此者。謂之熱入血室。男子傷寒。陽明經病。下血

占語。亦是熱入血室。輕則傷肝。火迫血妄行。或經氣所

承氣湯。五。產後鬱怒。傷肝。火迫血妄行。或經氣所

虛。宮室不閉。邪得乘虛而入。是皆熱入血室也。

犀角地黃湯九十八。治熱盛吐血衄血瘀血。

犀角地黃湯九十八

四物湯 九 治中湯 一百 四君子 湯 一百

犀角地黃生地黄牡丹芍藥共相防。犀角生地黄

芍藥各二錢。一方加升麻當歸。山梔。三。黃芩。另用生藕節汁。生蒲栢葉汁。磨京墨三。匙。入藥攪勻服。如腹中有瘀血。加龜仁。紅花。酒。大黃。如上焦有血。加甘草。桔梗。陳皮。紅花。當歸。

產後發熱一百二

產餘汗下莫輕施。數般發熱。又須知產時傷力和蒸。

乳。○產後三日。則有蒸乳。發熱。因乳汁不通。而然也。

通。其熱自除。不藥而愈。○若產後不謹。感冒風寒。見。

太。陽症者。用四物加羌活。蒼朮。白朮。干姜。蘼。葉。葱。白。

取。微汗。熱甚。加柴胡。乾姜。少許。妙。黃。早興勞動。能發。

食。停。留。○產後飲食停滯。發熱。必有噎氣。作酸。惡。聞。食。

湯。加。山。查。神。曲。砂。○惡。露。未。清。能。發。熱。惡。露。不。盡。亦。有。

仁。黃。連。芎。歸。輔。之。○惡。露。未。清。能。發。熱。惡。露。不。盡。亦。有。

脇脹滿連大小腹有塊作痛或但痛無塊宜四物加靈脂丹皮紅花菴仁玄胡香附青皮干姜後磨木香

入童便姜汁溫服取其瘀血後以四過多去血亦如

然此宜庸醫不識將他汗惕潤昏迷不省人若產後

吐下藥太過遂變鬱胃昏迷肉瞤筋惕四物或果入

風攣手足大腸秘結又難通妄下如前加厥逆只須

四物入荆防常理動勞空血熱內無痛處脉虛洪有

在內即有四物湯中惟去芍參苓白朮共相加若還

血難補大熱無能止炒入干姜効有神乾姜能引血藥入血

氣分而補氣所以產後多用此○前產後不謹感冒

風寒一症若至熱邪傳裏口燥渴大便秘不通或脉沉

實占語輕則蜜導十重用四物加柴胡黃芩只壳熟

大黃下後就用四物四君補之若見少陽症者用四

物合小柴胡一產後雖有寒熱骨疼及口眼歪斜手足搖掣惡寒頭痛發熱實非風實非寒乃血虛所致不可可以風寒之藥治之若果有風有寒亦當以補氣血為主而畧帶風寒之藥○凡胎前宜養血安胎產後惡露一盡宜大補氣血雖有襍症以末治之此治產之要言也

四物湯元十九

乃補血之要藥

○四物芎歸芍藥宗熟地

加之四味同

當歸二錢

川芎二錢五分

芍

治中湯一百

人參

錢五分

熟地二錢

白朮

青

四君子湯一百

補氣之要藥此湯加生附四

陽助

○四君白朮共人參茯苓甘草不相爭

白朮

茯苓各二錢人參一錢五分炙甘草八分

姪娘傷寒一百三