

繪

卷九

省中医藥學會書

編號 11-189 $\frac{16}{16}$



訂正東醫寶鑑雜病篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君 臣 許 俊 奉 教 撰

寒下

傷寒煩渴

凡得病反能飲水此欲愈也(仲景)○傷寒汗不解脈浮者蒼朮白虎湯主之吐下後五苓散主之

腹中熱尚少不能消故也至七八日大渴欲飲水惟當少與之常令不足勿極意也言能飲一斗只與五升若腹滿小便不利若喘若噦者不可與之若小渴咽乾者少少與之令胃氣和則愈(仲景)

渴欲飲水入即吐名曰水逆五苓散主之(仲景)○厥陰病渴欲飲水者少少與之愈(仲景)○陽生煩故厥陰六七日飲水多而小便少者謂之消渴渴欲水為欲愈者傳經已盡也脈浮而渴屬太陽

陽宜白虎湯汗多而渴屬陽明宜竹葉石膏湯自利而渴屬少陰宜猪苓湯(入門)○凡渴欲飲水常令不足為善經云若還不飲非其治強飲須教別病生(醫鑒)○渴欲飲水而不能飲者丹田有

熱胸中有寒也(仲景)○陰盛陽陽之證口渴燥渴而漱水不熱蓄血之證亦漱水不欲飲(入門)

五苓散

治太陽證入裏煩渴而小便不利澤瀉二錢半赤茯苓白朮猪苓各一錢半肉桂五分右為末每

飲水不散而反吐出為水逆證或飲水雖多而小便不利者皆裏熱未實不能消水故爾五苓散的藥也(入門)

竹葉石膏湯

治傷寒解後餘熱及陽明證自汗煩渴並差後虛煩等證石膏四錢人參二錢麥門冬一錢

傷寒潮熱

潮熱者若潮水之潮其來不失時也一日一發指時而發者謂之潮熱若日三五發者即為發熱

非潮熱屬陽明若於日晡時發者乃為潮熱也陽明之為病胃家實也胃實則譫語(明理)○潮

熱者如潮少陽之有信一日一發謂之潮必日晡而作陽明旺於未申故耳諸承氣湯選用下之或潮於寅卯者屬少陽或潮於巳午者屬太陽為邪未入胃俱宜小柴胡湯和解之(入門)○吐下後不大便

傷寒發狂

發狂者熱毒在胃併入於心使神昏不定言動急速妄語妄笑甚則登高而歌棄衣而走踰垣上

屋不食不眠非大吐下不止表裏俱熱宜三黃石膏湯裏熱盛宜大承氣湯加黃連狂言譫語宜

火劫法○喜忘如狂畜血證也(活人)○凡發狂見陽證陽脈者順見陰脈舌卷囊縮者死(入門)

三白飲治傷寒熱證極狂走難子清一個白蜜一大匙芒硝三錢右合併一處涼水調下(醫鑒)

活龍散治陽毒發狂活地龍大者四五條淨洗研取汁入薑汁薄荷汁及蜜各一是新汲水調和徐徐灌盡漸次涼快若熱熾則加片腦尤妙名曰地龍水(入門)

破棺散治傷寒熱病發狂心躁言語不定不省人事人尿乾者燒成性水漬飲汁

水漬法見上湯盞下

火劫法治發狂炭火一盆置病人之前將醋一碗急沃火內使烟氣沖入鼻內須臾自定又將涼水噴面亦可(入門)

傷寒譫語鄭聲實則譫語虛則鄭聲譫語者謂言語無次第數數更端也鄭聲者謂鄭重頻煩也(將一)必鄭聲宜用白通散大便祕小便赤手足溫脈洪數者必譫語宜用調胃承氣湯(活人)○譫語有實有虛實則可下虛不可為實者胃實有燥屎可下之虛者腸胃自利也難治(入門)○傷寒大熱呻吟錯語不得眠黃連解毒湯主之(活人)○晝日明了夜則譫語如見鬼乃婦人熱入血室證也(活人)○傷寒發熱譫語宜柴胡連翹湯(醫鑒)

黃連解毒湯治傷寒大熱煩躁不得眠或差後飲酒復劇者及一切熱毒黃連黃芩黃柏梔子各一錢二分半右剉作一貼水煎服(活人)

柴胡連翹湯治傷寒發熱譫語呻吟睡臥不得柴胡黃芩枳殼赤芍藥桔梗瓜蒌仁梔子仁連翹黃連黃柏甘草各八分右剉作一貼入薑三片水煎服(醫鑒)

傷寒結胸傷寒若脈浮緊下之必結胸(海藏)○病發於陽而反下之熱入因作結胸(仲景)○傷寒表未解醫反下之胸內拒痛手不可近一云心下滿而硬痛此為結胸宜大陷胸湯(仲景)○若按心下硬痛手不可近燥渴譫語大便實脈沈實有力為大結胸急以大陷胸湯加枳殼桔梗梗下之反加煩躁者死(醫鑒)○小結胸者正在心下按之則痛脈沈滑宜小陷胸湯(醫鑒)○寒實結胸無熱證者宜三物白湯小陷胸湯(醫鑒)○熱實結胸及寒實結胸活人書不拘寒熱但用陷胸湯不差用枳實理中凡應手而愈(綱目)○但結胸無大熱者此為水結在胸脇但頭汗出名曰水結胸小半夏湯加茯苓主之(方見胸部)○熱實結胸宜大陷胸湯(綱目)○結胸宜用灸法(醫鑒)

大陷胸湯治大結胸大黃三錢芒硝二錢甘遂末五分右剉分二貼每取一貼先煎大黃至六分納硝再煎一二沸去滓納甘遂末攪服得快利止後服(仲景)

大陷胸湯治大結胸大黃三錢芒硝二錢甘遂末五分右剉分二貼每取一貼先煎大黃至六分納硝再煎一二沸去滓納甘遂末攪服得快利止後服(仲景)



小陷胸湯 治小結胸半夏製五錢黃連二錢半瓜蒌大者四分之一右剉作一貼水二盞先煎瓜蒌至一盞乃入半夏黃連煎至半去滓溫服未利再服利下黃涎便安(仲景)○一方加枳實餘各桔

梗尤效(入門)○瓜蒌惟對其殼勿對其子對其子者非也(丹心)

三物白散 治寒實結胸桔梗貝母各三錢巴豆去皮心熬煎如脂一錢右為末和勻白湯和服半錢弱人減半或吐或利不利進熱粥一碗利不止進冷粥一碗(入門)

大陷胸丸 治熱實結胸大黃五錢葶藶子炒杏仁炒各三錢芒硝二錢半甘遂一字右為末蜜丸彈子大每一丸水一盞煎半分溫服未利再服(丹心)

灸法 詳見胸部

針法 詳見胸部

傷寒藏結 病有結胸有藏結其狀何如答曰按之痛寸脈浮關脈沈名曰結胸也何謂藏結答曰如結胸狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈細小沈緊名曰藏結舌上白胎滑者難治(仲景)○病入胸中

素有痞連在臍傍引入小腹入陰筋者此名藏結死(仲景)○歌曰飲食如常時下利更加舌上白胎時連臍痛引陰筋者藏結原來死不醫○狀如結胸飲食如故時時下利而舌上白胎(活人)○病人

素有痞氣再加傷寒與宿積相合使真藏之氣閉結不通亦名藏結慎不可下止宜小柴胡加生薑以和表灸關元以回陽解陰結危哉(入門)藏結與結胸相似皆下後邪氣入裏與陽相結結在胸者為

結胸與陰相結結在藏者為藏結惟其陰結故藏結無陽證不往來寒熱或但寒不熱其人反靜飲食如常時時下利舌上白胎臍腹脹引入陰筋俱痛者丹田有熱胸中有寒所以難治(入門)

傷寒痞氣 病發於陰而反下之因作痞(仲景)○傷寒嘔而發熱者若心下滿而不痛此為痞半夏瀉心湯與痞關脈須沈若關脈浮者宜此湯(仲景)○心下痞硬按之濡其脈關上浮者三黃瀉心湯主之凡結胸

下後下利日數十行穀不化腹雷鳴心下痞硬腹下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之(仲景)○心湯主之(仲景)○汗解後胃不和心下痞硬腹下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之(仲景)

氣通用枳殼桔梗湯 氣通用枳殼桔梗湯

半夏瀉心湯 半夏製二錢黃芩人參甘草各一錢半乾薑一錢黃連五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服(仲景)

三黃瀉心湯 大黃黃連各二錢黃芩一錢右剉作一貼以麻沸湯一盞漬之良久絞去滓分溫再服(丹心)

上海校經山房石印

附子瀉心湯 湯蓋一入三味漬之良久去滓細附子汁分溫再服(仲景)

甘草瀉心湯 甘草二錢黃芩乾薑各一錢半夏夏製人參各一錢黃連三分右剉作一貼入大棗三枚水煎服(仲景)

生薑瀉心湯 生薑半夏各二錢人參乾薑各一錢水煎服(仲景)

桂枝人參湯 桂枝另剉甘草炙各一錢八分白朮人參乾薑各一錢半右剉作一貼水二盞煎至一盞入桂枝煮取七分去滓溫服日二(仲景)

傷寒筋惕肉瞤 動氣在左而發汗則筋惕肉瞤(明理)○傷寒筋惕身瞤發汗太過所致也古以真武湯主之然真武湯能止其汗而不能定其瞤者動也蓋汗多則傷血血虛無以養筋筋動而筋惕也

而四體百骸俱為之瞤動宜以四物湯去地黃加入參半夏茯苓甘草為劑以五靈脂為佐入生薑烏梅煎服自有神效此專主生血生血乃所以收汗也(直指)

傷寒除中證 厥而下利反能食者曰除中不治(得效)厥而利反能食曰除中其死也可立待也(入門)之胃氣既除豈可再復(入門)○厥利當不能食今反能食恐為除中試食以索餅發熱者除中也不發熱者非除中知胃氣尚在必愈也(入門)

傷寒血證 太陽疾六七日表證因在脈微而沈反不納胸其人若狂者以熱在下焦小腹當滿小便不利者下血乃愈抵當湯主之(仲景)○太陽證身黃發狂小腹硬滿自利者血證諦也宜抵當湯(仲景)

勝脫其人似狂若血自下者自愈但小腹急結者宜攻之宜桃仁承氣湯(仲景)○太陽病不解熱結服或脈微故也若脈浮緊身疼惡寒發熱則汗之可也宜麻黃湯桂枝湯(方並見上)若脈微不可汗則犀角地黃湯主之(方見血門)○海藏少陰病強發汗血出九竅是名上受下竭不治(仲景)○

太陽病脈浮發熱無汗而喘者自愈(仲景)○傷寒頭痛發熱口乾口鼻血出午後昏沈耳聾脇痛俗名血汗病也犀角地黃湯合小柴胡湯主之(醫鑒)

抵當湯 治一切瘀血結胸諸證漱水等證水蛭炒蠅虫炒去足翅桃仁留尖各十枚大黃蒸三錢右剉作一貼水煎服(入門)

抵當丸 治蓄血在下而無身熱便黑喜忘如狂等證但小腹滿而尿利者宜用此緩以下之水蛭蠅虫各七個桃仁六個大黃三錢右為末蜜和分作二丸水一盞一丸至七分頓服未效再服(丹心)

桃仁承氣湯 治血結膀胱小腹結急便黑諸證漱水宜此攻之大黃三錢桂心芒硝各二錢甘草一錢桃仁留尖十枚右剉為一貼水煎入芒硝溫服以瘀血盡為度(丹心)

傷寒自利 傷寒陰證身痛脈沈大便自利或嘔或咳宜玄武湯(方見上)○傷寒陽證身熱脈數煩渴引飲大便自利宜柴苓湯(丹心)益元散亦佳(方見暑門)○太陰證自利宜理中湯(丹心)

傷寒自利 傷寒陰證身痛脈沈大便自利或嘔或咳宜玄武湯(方見上)○傷寒陽證身熱脈數煩渴引飲大便自利宜柴苓湯(丹心)益元散亦佳(方見暑門)○太陰證自利宜理中湯(丹心)

柴苓湯

治傷寒熱病發熱泄瀉柴胡一錢六分澤瀉一錢三分白朮枳芍各七分半半夏七分黃芩人參甘草各六分桂心三分右剉作一貼入薑三片水煎溫服(丹心)

傷寒胸腹痛

傷寒腹痛中脫痛太陰也臍腹痛少陰也小腹痛厥陰也(仲景)○心胸硬痛不可近為結胸若未經下者非結胸也乃邪氣填塞胸中只以小柴胡加枳桔治之如未效小柴胡合小陷胸

胸加枳桔一服如神(醫鑒)○若心下脹滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔(醫鑒)○若小腹痛硬痛小便利則為蓄血之證桃仁承氣湯下之若小便不利則為尿澀之證五苓散利之若小腹痛硬痛小便澀大承氣湯下之(醫鑒)

傷寒吐蛔

傷寒有吐蛔者雖有大熱忌下涼藥犯之必死蓋胃中有寒則蛔不安其所而上膈之也吐蛔者手足冷胃虛空也(回春)加烏梅二個紅椒十粒煎服待蛔定却以小柴湯退熱(醫鑒)○傷寒

陰陽交證

黃帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食病名為何岐伯曰病名陰陽交交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無俾也病而留者其壽可立而傾也且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛者死狂言者是失志失志者死(內經)○發汗後脈躁疾狂言不能食謂之陰陽交言交合陰陽之氣不可分別此死證也(入門)

壞證

傷寒病未退重感寒變為溫瘧重感風變為風溫再感濕熱變為溫毒重感疫氣變為溫疫又太陽病經汗吐下溫針不解及過經不解皆為壞證或醫者不辨陰陽錯謬汗下使病不解壞證亂經久而不差視其犯何逆以治之表證多者知母麻黃湯表者不柴胡湯餘熱不解者參胡芍藥湯危急者奪命散諸藥不效者蠶甲散(入門)

知母麻黃湯

治壞傷寒以傷寒差後經久精神不守言語錯謬或潮熱煩亦寒熱如瘧皆由汗下不盡毒汗即愈(入門)○一本去桂心代桂枝(入門)

參胡芍藥湯

治傷寒十四日外餘熱未除或渴或煩不能安卧不思飲食大便不快小便黃赤此為壞證生地黃一錢半人參柴胡芍藥黃芩知母麥門冬各一錢枳殼八分甘草三分右剉作一貼入薑三片水煎服(入門)

奪命散

治傷寒壞證昏沈垂死或陰陽二經不明過經不解及或因誤服藥困重垂死一切危急之證好人參一兩剉作一服水二升於銀石器內煎至一升去滓以新水沈冷一服而盡汗自鼻梁上出

涓涓如水是藥之效也
一名獨參湯（丹心）

鼈甲飲 治瘰癧諸藥不效鼈甲二錢犀角前胡黃芩生地黃各一錢枳殼八分烏梅二個右剉作一貼水煎服（入門）

百合證

大病後未平復失於調理餘證在陽醫反汗之以致百脈一宗悉致其病經絡故謂之百合傷寒其證當默然欲食不能食欲臥不能臥欲行不能行或有時開食其時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤時頭不痛漸然者四十日愈若尿時決然但頭眩者二十日愈宜用時輒頭痛者六十日乃愈若尿時頭不痛漸然者四十日愈若尿時決然但頭眩者二十日愈宜用

陶氏柴胡百合湯 治百合病及勞復等證鼈甲醋煮二錢柴胡百合知母生地黃陳皮人百合洗方（仲景）○百合者百脈合病也治以百合為主者以其能和合百脈也（入門）

陶氏柴胡百合湯

治百合病及勞復等證鼈甲醋煮二錢柴胡百合知母生地黃陳皮人參黃芩甘草各一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服（入門）

百合知母湯

治汗後百合證百合七枝知母一兩右先將百合水浸一宿當白沫出去其水更以井水二盞煎至一盞去滓又將井水二盞別煎知母取一盞去滓二汁和勻同煎取一盞半分再服（丹心）

服（丹心）

百合滑石代赭湯

治下後百合證百合七枝滑石三兩代赭石一兩右煎如上法服（仲景）

百合雞子湯

治吐後百合病百合七枝雞子黃一個右先將百合水浸一宿當白沫出去其水更以井水二升煎取一盞去滓納雞子黃攪勻溫服（仲景）

百合地黃湯

治不經汗吐下百合證百合七枝生地黃汁一升右先煎百合如上法乃納地黃汁煎取一升五合分二服大便出如漆黑（仲景）

百合滑石散

治百合病變寒熱者百合一兩滑石二兩右為末每二錢白湯下日三服（仲景）

百合洗方

治百合病一月不差變成渴者百合一升水一斗漬一宿洗一身已宜淡食（仲景）

過經不解

傷寒六日傳經一遍七日當解而再傳至於十三日以上不愈謂之過經不解由汗下失宜邪氣留連故也或從輕再汗再下宜參胡芍藥湯小柴胡湯調之（方並見上○治人）○餘熱不退皆

宜小柴胡湯（治人）

勞復食復證

勞者動也動非一種有內外血氣之異若見外證則謂之復病非為勞也如再感風寒是已（海藏）○復者其病如初也傷寒新差津液未復血氣尚虛或梳洗言動太早或思為太過則



成勞復蓋勞則生熱熱氣乘虛還入經絡未免再復謂之勞復宜小柴胡湯參門冬湯和之熱氣浮者
杞鼓枳實湯鼠尿鼓湯（入門）○食復者傷寒新差胃氣尚弱若恣食飲不能化依前發熱者試用
補藥則胃熱轉增治須清熱消食輕者胸中微滿損穀自愈重者必須吐下宜施枳實湯枳實湯胸痞者主
善瀉心湯（方見上）○飲酒轉劇者宜黃連解毒湯（方見上）（入門）○勞復食復宜七味白散

勞復虛者益氣養神湯○凡復證先病七日出汗而解今復舉亦必七日而解先病十四日出汗而解
今復舉亦必十四日而解雖三四次復舉亦必三四次戰汗而解但勞復證久不愈恐成勞瘵（入門）
參門冬湯治勞復氣欲絕能起死回生參門冬二錢甘草炙三錢粳米一合右水二盞先煎枳

枳實湯治勞復發熱枳實各二錢香豉五錢右剉水煎服微汗之差（入門）

鼠屎豉湯治同上枳子三十個雄鼠屎七枚枳殼一枚炒右剉水一盞半入葱白二寸香豉三十粒同煎至一盞分二服勿令病人知（活人）

枳實枳黃湯治食復發熱枳子枳殼柴胡各一錢香豉五錢大黃三錢右剉水煎服腹脹如厚朴傷肉如山查傷飯粥如神（入門）

七味葱白散治勞復食復葱白連根三莖乾葛麥門冬熟地黃各三錢香豉半合生薑切一合右剉以甘爛水四升煎之三分去二分去滓分二服（活人）

益氣養神湯治勞復宜養氣血人參當歸白芍藥酒炒麥門冬知母枳子炒各一錢白茯苓神前胡各七分陳皮五分升麻生甘草各三分右剉作一貼入棗二枚水煎服（回春）

傷寒遺證帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而強食之故有所遺也帝曰治遺奈何岐伯曰視其虛實調其從逆可使必已矣帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則

遺此其禁也（內經）○遺謂遺熱內經註曰如遺之在人也所謂遺者大小便不禁也嘗見病差後善飲食而大小便不禁故知之（活人）○當與食復參看

陰陽易證傷寒病新差陰陽未和因合房室則令人陰腫入腹絞痛婦人病新差男子與之交得病名曰陰陽易也其男子病新差婦人與之交得病名曰陽易婦人病新差男子與之交得病名曰陰易若二

男二女並不相易所以急為易者以陰陽相感動其毒著於人如換易然其病之狀身熱衝胸頭重不能舉百節解離經脈緩弱血氣虛骨體乾便洗洗翁翁氣力轉少者床不能動搖起止仰人或牽引歲月

方死（活人）○陰陽易宜燒裯散赤衣散緞鼠糞湯青竹茹湯竹皮湯乾薑湯薑黃湯縮痛氣欲絕宜竹皮道遙散（入門）○女勞復者不因易而自病復也治亦相同但多憎寒發熱虛弱者人參道遙散（入

門）○陰陽易病見舌吐出者必死（寶鑒）○顧子獻病傷寒新差華陀診脈曰尚虛未復陽氣不足勿為勞事餘勞尚可女勞即死死當吐舌數寸其妻聞病差從百里來省之住數宿果為勞事遂吐舌

數寸而死（活人）○有婦人病傷寒賊來不能走其賊六七八人姦之皆得婦人病而死此陰陽易也

(外)

燒視散

治陰陽易取近陰處視襦一片方圓四五寸燒成性溫水調服一錢日三小便即利陰頭微腫即愈男女互用之(入門)

赤衣散

治陰陽易最效取室女月經布近陰處燒存性末米飲調下(入門)

假鼠蜚湯

治男子陰易病非白根一把假鼠蜚十四個右以水二升煮取半升去滓溫服微汗未汗再服假鼠蜚也真兩頭尖者是也(海藏)

青竹茹湯

治勞復及陰陽易病瓜萸根五錢青竹茹二錢右剉作一貼水煎服(入門)一名瓜竹湯治法服法同

竹皮湯

治陰陽易及勞復病剉取青竹皮一升水三升煮取一升分二服(一名竹茹湯(綱目))

乾薑湯

治陰陽易病速當汗之過四日不可療乾薑三錢剉水煎服得汗出手足伸即愈(得效)一方乾薑為末一兩溫湯調服覆衣取汗得解(古方)

竹皮逍遙散

治勞復及易病青竹皮(卵縮腹痛倍)生地黄人參知母滑石黃連韭白柴胡犀角甘草各一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚煎臨服入燒視襦末一錢半調服微汗之末汗再服

(門)

人參逍遙散

治女勞復虛弱者人參當歸各二錢柴胡一兩半白朮白芍藥白茯苓各一錢右剉作一貼水煎服(入門)

熱入血室證

婦人傷寒與男子無異惟熱入血室及狂娠傷寒則不同也(雲岐)婦人以血為主血室即衝脈血海也婦人傷寒發熱經水適來適斷晝日明了夜則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈活人書云小柴胡湯及生地黃主之犯胃氣謂下之犯上二焦謂發汗也(仲景)婦人傷寒寒熱如瘧晝閒夜躁如見鬼狀此謂熱入血室不實滿者小柴胡湯加牡丹皮桃仁或小柴胡湯合

滿者桃仁承氣湯主之(雲岐)

○熱入血室其血結而不行小柴胡湯加牡丹皮桃仁或小柴胡湯合四物湯主之牛黃膏亦主之(方見婦人)(入門)婦人傷寒發熱經水適來經行盡則熱隨血散不治自愈如熱除而脈遲身涼胸脇下滿按之痛者謂之血結胸

當刺期門(穴名)

隨其實而瀉之宜服桂枝紅花湯(入門)

血結胸

或問熱入血室何為而成結胸也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行或遇經水適來適斷邪氣乘虛而入血室血為邪迫上入肝經肝受邪則譫語而見鬼復入膈中則血結於胸也何以言之婦人平居水當養於木血當養於肝方未受孕則下行之以為月水既妊則中蓄之以養胎及已產則上壅之以為乳汁皆此血也今邪氣蓄血併歸肝經聚於膈中結於乳下故手觸之則痛非湯



北京中醫藥大學圖書館藏

劑可及故當刺
期門也(本事)

桂枝紅花湯治熱入血室及血結胸桂枝芍藥甘草各一錢紅花一錢

傷寒無脈為欲汗

傷寒兩手無脈曰雙伏一手無脈曰單伏○若病人寒熱而厥面色不澤胃弱而手足忽

服五味子湯時必有大汗而解矣(活人)○傷寒病六七日來別無利證忽昏迷不省脈靜或無此欲作正汗如久旱將雨之兆喘促無脈者加味生脈散陰躁無脈者迴陽返本湯下利脈不至白濁加猪膽汁湯(二方見上)脈結者炙甘草湯(方見脈部)寒熱鬱閉者兩手俱無脈亦是好汗相逼汗出自愈宜麻黃附子細辛湯(方見上)加人參五味子以汗出脈續出則生服藥而仍前無汗脈不至者死(入門)

五味子湯治傷寒喘促脈伏而厥五味子三錢人參麥門冬陳皮杏仁各一錢右剉

差後昏沈傷寒差後或十數日或二十日終不醒寤常昏沈似失精神言語錯謬又無寒熱醫或作鬼祟或

知母麻黃湯主之(方見上)○(得效)陶氏導赤各半湯極效(入門)○傷寒後無寒熱雜證但漸變神昏不語或睡中獨語一二句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則嘔不與則不思心下無痞腹中不滿大小便如常形貌如醉人此熱傳手少陰心經也心火熾肺所以昏沈名曰越經證宜陶氏導赤各半湯(入門)

陶氏導赤各半湯治差後昏沈黃芩黃連梔子知母麥門冬茯神犀角人參滑石各一錢甘草五分右剉

春四

餘熱不退傷寒餘熱不退通宜用小柴胡湯調之尿赤澀者柴芩湯(二方見上)○吐汗下三法之後別無

門)○發熱之後熱不解脈尚浮者白虎湯加蒼朮再解之(方見上)○傷寒後虛熱不已白虎加蒼朮人參一服如神汗止身涼此通神之法也如此則汗下後熱不退不問有汗無汗俱宜白虎加蒼朮不退宜加減涼膈散(方見大門)○(正傳)

孤感證赤白乍黑變異無常此因大病後腸胃空虛三虫求食食人五臟蝕其喉則為惑其聲啞蝕其肝

則為狐其咽乾殺人甚急當看上唇有瘡虫蝕其藏下唇有瘡虫蝕其肛蝕上部者三黃瀉心湯主之
（方見上）蝕下部者苦參湯熏洗之蝕肛門者生艾汁調雄黃末燒烟熏之通用黃連犀角湯治急桃
 仁湯雄黃銳
 散（入門）

散（入門）

黃連犀角湯

治感桃仁湯

雄黃銳散

傷寒差後雜證

石膏湯（方見上）○（入門）

酸棗仁湯

烏梅湯

辰砂五苓散

辰砂益元

傷寒治法

治法張仲景傷寒論載三百九十七法一百一十有三方惜乎其書一變於王叔和之撰次再變於成無己之詮註傳之愈久而愈失其真也（正傳）○帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脈病曰衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已（內經）○陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛陽虛汗之則愈下之則死此陰陽指表裏而言之也（難經）○桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡（仲景）○傷寒五法者汗吐下溫解也各有不同汗有大汗發微汗解肌之異下有急下少與微和滲利之殊溫有兼補者吐有宣涌探引者和解則一而已（入門）汗吐下三法毫釐不可差誤在表宜汗在裏宜下在胸宜吐在表半裏宜和解表裏俱見隨證滲池（得效）傷寒之病太陽屬膀胱非發汗則不愈必用麻黃之類蓋其性能通陽氣却外寒也陽明屬胃非通泄則不愈須用大黃芒硝以利之少陽屬膽無出入道柴胡半夏能利能汗佐以黃芩則能解矣太陰屬脾性惡寒濕非乾薑白朮則不能燥少陰屬腎性畏寒非附子不能溫厥陰屬肝藏血養筋非溫中之藥不能潤（得效）○太



雖淋漓而腰以下至足微潤則病終不解(活人)○凡發汗服湯其方雖言日一二服若病劇不解當促其服可半日間盡一二服連服三劑乃解若汗不出者死病也(仲景)○凡發汗病證仍在者三日內可二三汗之周遍為度未汗可作熱粥投之粥內加蔥白甚妙(仲景)○凡服藥發汗中病即止不必盡劑恐汗太過作亡陽證也吐下亦如之(仲景)

亡陽證

凡發汗過多漏不止名曰亡陽溫經益元湯主之有陽虛服藥而不得汗亦名亡陽陶氏再造散主之兼用蒸法(詳見汗部)○太陽證惡寒脈當浮而緊今反脈浮而遲遲為亡陽家能作汗身必痺桂麻各半湯主之(方見上○入門)

腎氣不足難得汗

太陽病脈浮緊身疼痛宜以汗解之假令尺脈遲者不可發汗何以知之以營血不足血少故也小建中湯(方見虛勞)加黃芪服之尺脈有力乃服汗藥(脈經)○傷寒發汗多驚悸目眩身戰孫曰太陽經病得汗早因太陽經欲解復作汗腎氣不足故汗不來所以心悸目眩身戰遂作真武湯三服微汗而解蓋附子白朮和其腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽陽能乾涸血液兩仲景云尺脈遲者榮血不足不可以汗以此知腎氣法則難得汗也(孫兆)

汗促天壽

凡傷寒發汗須顧其表裏虛實待其時日若不循次第則暫時得安虧損五臟以促壽限得足貴哉昔南朝范雲為陳武帝屬官適得傷寒恐不得預九錫之慶召徐文伯懇求促汗文伯曰便差甚易只恐二年不復起耳雲曰朝聞道夕死可矣何待二年遂以火燒地鋪桃葉設席置雲於其上須臾大汗撲以溫粉翌日便愈雲喜甚文伯曰不足喜也後二年果卒(本事)

溫經益元湯

治發汗過多衛虛亡陽以致頭眩身憊筋惕肉瞤熟地黃人參白朮黃芪蜜炒白芍藥當歸主乾地黃白茯苓陳皮甘草炙各一錢桂皮附子炮各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚煎服(入門)

陶氏再造散

治陽虛不得汗名曰亡陽證人參黃芪桂枝附子炮細辛羌活防風川芎甘草炙各一錢右剉作一貼入煨薑三片棗二枚煎至半入炒芍藥一錢再煎二三沸溫服(入門)

可下不可下證

喘不惡寒反惡熱手掌心並腋下濇濇汗出乃胃中乾燥結聚潮熱大便鞭小便如常腹滿而氣必煩脈浮頭痛惡風惡寒表證已罷而反發熱熱極譫語不大便方可用之若脈浮緊下之必結胸若脈緩下之必痞氣(海藏)○傷寒後三日法當下下之太早則必變他證輕者必危危者必死當用平和之藥小柴胡湯涼膈天水益元散也○合而服之(宣明)○若裏熱微者當微下大柴胡合解毒湯下之熱勢未退人以大柴胡三承氣下之而除表裏之熱(宣明)○凡轉下之藥與裏證藥參考選用(丹心)○脈浮不可下○脈虛不可下○惡寒不可下○嘔吐不可下○不轉矢氣者不可下○小便清不可下(活人)○非陽明本病不可下○非痞滿燥實不可下○非脈沉實不可下○非發狂不



可下
(雲岐)

急下兩證

少陰主腎繫舌本熱氣入臟留於少陰之經腎汁乾咽路焦故口燥咽乾而渴宜急下之治
陽明宜下而可緩也雖然陽明一證發熱汗多亦急下之以胃汁乾故也(活人)○少陰證已

脈不鼓擊不可下

一少年傷寒目赤煩渴脈六七至醫欲用承氣湯下之東垣偶來診之大數曰此病
兒彼以脈數為熱今脈七至是極熱也殊不知內經云病有脈從而病反者何也此伯
曰脈至而從按之不鼓諸陽皆然此陰盛隔陽於外非熱也取薑附來吾以熱
因寒用之法治之藥未就而病者小甲已青透頓服八兩汗漸出而愈(東垣)

下後熱不退宜再下

下後熱不退宜三下之熱愈盛脈微氣虛力弱不加法則無可生之理若轉而不
下則邪熱極盛陰氣極衰脈息斷絕必不可救如此之證是下之亦死不下亦死醫
者到此殺人活人一彈指間耳(河間)○經云三下而熱不退者死後人有三四次乃至十數行而

者此乃偶然誤中耳後學切不可以為法但用解毒湯合涼膈散調之庶不失人命(河間)○汗下後
熱不退不問有汗無汗宜白虎
湯加人參蒼朮解之妙(河間)

陰耗陽竭證

裏熱內盛陽厥極甚皆因失下而成此證以致身冷脈微奇慳將死殊不知此證乃陰耗陽
竭陰氣極弱謂之耗陽厥極盛謂之竭但進涼膈解毒合以服之以養陰退陽脈氣漸生得
大汗而愈若未愈解毒合承氣下之次以解毒涼

可和不可和證

傷寒熱邪半在表半在裏宜小柴胡湯和之(活人)○口苦咽乾目眩耳聾胸脇滿或往來
寒熱而嘔屬少陽忌吐下宜小柴胡湯和之(仲景)○小柴胡湯一名和解散若加黑豆一
撮煎名曰大邪湯(入門)○病若半在表半在裏法當和解小柴胡合涼膈散(方見大門)

傷寒凶證

傷寒病傷反青四肢多汗肝絕也○形如烟熏搖頭直視心絕也○環口黑柔汗發黃脾絕
也○汗出發潤喘而不休肺絕也○狂言直視便遺失腎絕也○汗出如油喘息不休水漿不
入形體不出命

傷寒不治證

陰陽俱虛熱不止者死○脈陰陽俱盛大汗出不解者死○少陰病六七日息高者死○少
陰病吐利煩躁四逆者死○汗後嘔吐水藥不入口者死○下利後脈絕手足厥冷時脈還
手足溫者生脈不還者死○發熱下利至甚厥不止者死○汗下後復熱熱脈躁疾下利不止者死○
下利厥逆無脈灸之脈不還身不溫反微喘者死○直視譫語或喘滿或下利者死○服麻黃湯二三

刺汗不出者死○熱病脈躁盛而不得汗者死○發汗不至足者逆○汗出如珠不流者死○忽冒昧無脈服藥後汗解則生若無汗脈不至者死○七八日以上發大熱難治○傷寒脈乍數乍疎者不治○脈代者不治○口乾舌黑不治○口張目陷不治○尋衣摸床者逆○厥陰證唇青舌卷耳聾身縮不治○陰陽易過六七日不治○大發濕家汗則成瘧熱而症難治○發風濕中濕汗並逆○發風濕汗必謬語不治(仲景)

傷寒十勸
李子建所撰
不可不察

傷寒頭痛身熱便是陽證不可服熱藥

傷寒六經內太陰病頭不痛身不熱少陰病反發熱而無頭痛

傷寒當直攻毒氣不可補益

邪氣在經絡中當隨氣攻之或醫者却行補益使毒氣留藏多致殺人(局方)

傷寒腹痛亦有熱證不可輕服溫煖藥

傷寒腹痛多是熱毒仲景方痛甚者加大黃則意可見也惟身冷厥逆腹痛方是陰證當消息之(局方)

傷寒自利當看陰陽證不可例服溫煖及止瀉藥

厥陰外其餘身熱下利皆是陽證不可服熱藥(局方)

傷寒胸脇痛及腹痛不可用艾灸

傷寒胸脇痛屬少陽腹痛屬太陰切不可用艾灸多致殺人(局方)

傷寒手足厥冷當看陰陽不可一例作陰證

傷寒有陰厥有陽厥當仔細分辨不可例用熱藥(局方)

傷寒不思飲食不可服溫脾胃藥

傷寒不思飲食自是常事終無餓死之理如理中丸之類不可輕服熱氣增重或至不救(局方)

傷寒病已在裏切不可用藥發汗

傷寒須看表裏若一例發汗則邪氣未除真氣先涸死者多矣(局方)

傷寒飲水為欲愈不可令病人恣飲過度

病人若渴當與水以消熱氣然不可過多常令不足為善(局方)

傷寒病初差不可過飽及飲酒食羊肉行房事

病方愈飲食過飽病即再來謂之食復勞動太早病即再來謂之勞復犯房室者必死(局方)

傷寒戒忌

傷寒病新差後但少吃糜粥常令稍飢不得飽食反此則復○差後百日内氣體未復犯房室者死○忌食羊雞狗肉肥魚多言不得勞心費力反此則復○



油骨汁及鹹藏鮮脯油餅
鈔等物病則再發(局方)

中寒證

仲景論傷寒矣未及乎中寒先哲治冒大寒而昏中者用附子理中湯其議藥則得之然曰傷寒中其病即發而暴一身受邪難分經絡無熱可發溫補已解此氣太虛也不急治則死矣(東垣)○中寒者寒邪直中三陰卒然昏不知人口噤四肢強直拘急疼痛若不急治死在朝夕先用熱酒薑汁各半

蓋灌服次用回陽救急湯(方見上)附子理中湯水附湯回陽湯(醫鑑)○中寒雖燥熱煩渴可煎附子理中湯中冷浸水中冷服之不可熱服(醫鑑)○冷極唇青厥逆無脈陰囊縮者急用葱熨法或灸

茱萸熨法(方見上)並灸臍中與氣海關元各三五十壯而脈不出手足不溫者死(入門)○中寒則口噤四肢強直卒然昏倒(得效)

附子理中湯

治中寒口噤身強直附子炮人參白朮乾薑炮甘草炙各一錢右剉作一貼水煎服(三因)○一方加吳茱萸肉桂當歸陳皮厚朴各等分煎服亦名附子理中湯(西春)

朮附湯

治中寒白朮三錢甘草炙一錢半附子炮一錢右剉作一貼入薑十片煎水調蘇合丸三凡服之(得效)

迴陽湯

治中寒益智仁青皮各二錢川烏生附子生各一錢乾薑炮五分右剉作一貼入薑七片煮二枚水煎服(得效)

寒厥暴亡

一婦人病傷寒暴亡脈絕有一道人見之曰是寒厥爾不死也令人連掘地作坑以新炭燒之俟極暖施薦覆坑昇病人卧其上厚被覆之少頃大汗沾衣即甦(類聚)

葱熨法

治中寒身冷脈微面青黑蔥白連根切小麥麩各三升鹽二升右以水和勻分二色炒令極熱絳色之互熨臍上冷則用水拌溼更妙熨之(醫鑑)

感寒及四時傷寒

寒溫不節將理失宜乍暖脫衣甚熱飲冷坐卧當風居處暴露衝冒霜雪凌晨朝起呼吸冷氣久晴暴暖急變陰寒久雨積寒致生陰濕出氣壅滯胸膈凝滯飲食不入凡此之證若

使人肢體沉重肢節痠痛項背拘急頭目不清鼻塞聲重表證宜羌活湯和湯防風湯和湯羌活湯

散(方見上)寒盡入裏吐利者霍香正氣散食停痰人參解胃湯(二方見上)時令感冒宜升麻葛根湯○大抵感冒古人不敢輕發汗者正由麻黃能開腠理用或不得其宜則導泄真氣因而致虛變生

他證此藥乃平和之劑(人參養胃湯也)止能溫中解表而已不致妄擾也(局方)○雜病與傷寒相類者極多凡有感冒輕證不可便認為傷寒而妄治之其或可者蓋亦因其不敢放肆多用和解平和

之藥散之爾(丹心)○凡感冒風寒通謂之四時傷寒宜沖和散正氣散參蘇飲(二方見上)次雪散交加散十味芎蘇散(方見瘟痘)對金飲子(方見內傷)

羌活沖和湯

治春夏秋感冒風寒發熱惡寒頭痛項強或有汗或無汗以代桂枝麻黃青龍各半湯治太陽經表熱之神藥也(丹心)○此藥非獨治四時風寒春可治溫夏可治熱秋可治濕治雜

病亦有神也（方見上）
○一名九味羌活湯

防風沖和湯 治春夏秋感冒風寒頭痛身熱自汗惡寒脈浮緩防風羌活各一錢半白朮川芎白芷
生地黃黃芩各一錢細辛甘草各五分右剉入薑三蔥二煎服○一名加減沖和湯

沖和散 治四時感冒風寒蒼朮四錢荆芥二錢
甘草一錢右剉作一貼水煎服（得效）

沃雪湯 解利四時傷寒以此溫表和裏通順陰陽蒼朮三錢厚朴一錢半川芎
當歸防風白芍藥陳皮葛根甘草各七分右剉作一貼水煎服（類聚）

升麻葛根湯 治溫病及四時感冒葛根二錢白芍藥升麻甘
草各一錢右剉作一貼薑三蔥二煎服（局方）

交加散 五積散性溫敗毒散性涼凡人遇些少感冒取兩
藥對半合和煎服則邪氣自散矣（二方見上）

外感挾內傷證 外感無內傷用仲景法（丹心）○傷寒挾內傷者十居八九蓋邪之所湊其氣必虛只用補
中益氣湯出入加減氣虛甚者少加附子以行參芪之功（方見內傷）（丹心）○傷寒得濕

用補中益氣湯海藏用九味羌活湯皆是和解之意不使真氣散失也（綱目）○丹溪海藏諸賢治傷
寒皆以補養兼發散之法此乃風雨寒熱不得虛邪不能獨傷人之旨也俗醫謂傷寒無補法不分虛
實一例汗下而致天橫實醫門之罪人也（綱目）○傷寒一證頭疼身熱惡寒微渴微汗出沈困身
痛脚痠脈浮虛無力名曰勞力感寒不可誤作正傷寒大發汗宜加味益氣湯（回春）○外感挾內傷

宜陶氏補中益氣
湯十味和解散

陶氏補中益氣湯 治內傷氣血外感風寒頭痛身熱惡寒自汗沈困無力人參生地黃黃芪當歸川芎柴
胡陳皮羌活白朮防風各七分細辛甘草各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚葱白

三莖水煎服如元氣不
足加升麻三分（入門）

十味和解散 治外感內傷頭痛身熱白朮四錢桔梗二錢當歸陳皮枳殼防風白芍藥
厚朴人參甘草各五分右剉作一貼入薑三片葱白三莖水煎服（丹心）

加味益氣湯 治勞力感寒證羌活一錢半人參黃芪防風柴胡各一錢白朮陳皮當歸各七分甘草五
分升麻黃柏酒炒各一分右剉作一貼入薑三片水煎熱甚加酒炒黃芩三分（回春）

外感內傷虛證宜補 一婦年七十患傷寒發熱惡寒諸醫以藥發散旬日不效飲食漸少昏沈不省口不
能言眼不能開咽喉有微氣有欲絕之候六脈虛微若無以人參濃煎湯徐徐灌之

連用頓與入歷十四年而卒夫人參迴元氣於無何有之鄉果有起死迴生
之功醫說載一人傷寒成壞證只服人參湯鼻梁出汗而愈與此同（回春）

