

張仲景傷寒論大陽本經諸方脉症後四卷三

西昌喻昌嘉言甫著

尚論諸方大意

仲景一百一十三方用本草九十一種耳仲景上經
神農本草經藥三百六十五種效法周天三百六十五
度之數應三才而合四時妙義開天也仲景取述神
農本草經藥品纔九十一種入傷寒論中輔相裁成有
合六經之大綱者有合六經之一目者蓋神農百病
兼收而仲景則由六經以例百病所以於上古本經
取裁九十一種用之不盡萬世而後是日炳然聖之
又聖者矣梁陶隱君別錄倍之爲七百三十種迨唐



尚論後篇卷之三諸方目錄

太陽傷風諸方 計十五方除重

太陽傷寒方 計三十九方除重附

太陽兩傷方 計十方除重



北京中醫藥大學圖書館版權所

新編後四卷之四諸方目錄

太陽陽明合方

計九方除重

陽明少陽合方

計六方除重

三陰及各症方

計三十九方除重通合三卷共
得一百八方餘五方于漸內見



張仲景傷寒論大陽本經諸方脉症後四卷三

西昌喻昌嘉言甫著

尚論諸方大意

仲景一百一十三方用本草九十一種耳仲景上經
神農本草經藥三百六十五種效法周天三百六十五
度之數應三才而合四時妙義開天也仲景取述神
農本草經藥品纔九十一種入傷寒論中輔相裁成有
合六經之大綱者有合六經之一目者蓋神農百病
兼收而仲景則由六經以例百病所以於上古本經
取裁九十一種用之不盡萬世而後是日炳然聖之
又聖者矣梁陶隱君別錄倍之爲七百三十種迨唐



本圖經證類宋嘉佑政和旁搜編錄於是旁門提
各自成名者多矣而仲景宮墻生色開出英寶
輩尤爲不孤識大識小總計一千七百四十六
雖百疾藥無纖漏天下後世永賴焉然一千七百
十六種顯現億兆如同一日昭式乃至漸推漸廣
察盡矣何獨仲景九十一種賢哲挺生莫識厥旨
也晚造無識手集神農本經竊以傷寒論中藥品爲
至其晉唐以後諸賢發揮傷寒論全方有得者亦一
錄出而目亦少步尚論諸方之後總欲門下好
隨證問藥一目燎然無檢書之苦難是慰耳

太陽經風傷衛方

辨中風證用桂枝湯解肌大綱總法

桂枝湯方

桂枝

三兩 去皮 味辛 熱

芍藥

三兩 味苦 微寒

甘草

二兩 炙 味甘 平

生薑

三兩 切 味辛 溫

大棗

十二枚 味甘 溫

右五味咬咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服

一升服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一

時許遍身絳絳微似有汗者益佳不可令如水流病

必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更

服依前法又不汗後服小促役其間半日許令三服盡

若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在

者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉



中醫藥大學圖書館版

麴五辛酒酪臭惡等物

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出
惡寒淅淅惡風翕翕發熱宜桂枝湯

仲景原文

風之傷人也頭先受之故令頭痛風在表則表寔故令
發熱風爲陽氣亦爲陽同類相從則傷衛外之氣衛傷
則無以固衛津液故令汗出其惡風者衛氣不能衛也
其脉緩者衛氣不能鼓也上件皆太陽症故曰太陽中
風桂枝辛甘辛則能解肌甘則能實表內經曰辛甘發
散爲陽故用之以治風然恐其走泄陰氣故用芍藥之
酸以收之佐以生薑甘草大棗此發散而兼和裏之意
是方也惟表邪乃可用之若陽邪去表入裏裏作燥

二便秘結此宜承氣之時也而誤用之則反矣 按承
氣之誤庸者固然而工者誤在微細伸景諄切不似此
項逐條本文詳玩始獲

凡桂枝湯病症者常自汗出小便不數手足溫和或手
足指稍露之則微冷覆之則溫渾身熱微煩而又憎寒
始可行之若病者無汗小便不數手足溫或手足逆
身冷不惡寒反惡熱或飲酒後慎不可行桂枝湯也脉
緊必無汗有汗不可誤作桂枝症此脉與症伸景說得
甚明後人看不透所以不敢用此方假令寸口脉微名
曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒也尺脉弱名曰
陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也此謂元氣受病而

然也又曰陽微則惡寒陰微則發熱醫既汗之使陽氣
微又大下之令陰氣弱此謂醫所使也大抵陰不足陽
往從之故陽內陷而發熱陽不足陰往乘之故陰上入
陽中則惡寒舉此二端明白易曉何憚而不用桂枝湯
仲景治表虛製此湯桂枝味辛熱發散助陽體輕本乎
天者親上故桂枝爲君芍藥甘草佐之如陽脈濇陰脈
弦腹中急痛乃製小建中湯以芍藥爲君桂枝甘草佐
之一則治其表虛一則治其裏虛故各有主用也
以桂枝易肉桂治傷寒腹痛神品藥也如夏中熱腹疼
少加黃芩去桂痛立止桂於春夏二時爲禁藥
按經云桂枝入咽陽盛則斃春夏發者爲禁藥也桂能

動血血熱者爲禁藥也木得桂而死肝不足者爲禁藥

桂枝湯有禁用三法

仲景本文并昌論

汗後水氣上逆有禁更汗增滿一法

本文并昌論

中風病主用桂枝湯解肌和營衛七法

本文并昌論

或問桂枝湯發字之義曰一桂枝耳或云發汗或云當

得汗解或云當發汗更發汗宜桂枝湯者數方是用桂

枝發汗也復云無汗不得用桂枝又曰汗家不得重發

汗又曰發汗過多者都用桂枝甘草湯是閉汗也一藥

二用如何說得仲景發汗與本草出汗之義相通爲一

答曰本草云桂味辛甘熱無毒能爲百藥之長通血脈

止煩出汗者是調血而汗自出也仲景云藏無他病發



熱自汗者此衛氣不和也又曰自汗者爲營氣和營氣和則外不諧以衛氣不與營氣和諧也營氣和則愈也皆用桂枝湯調和營衛營衛既和則汗自出矣風邪由此而解非桂枝能於腠理發出汗也以其固閉營血氣自和邪無容地而出矣其實則閉汗孔也昧者不解閉汗之意凡是病者俱用桂枝湯發汗若與中風自汗者合效如桴鼓因見其永效而病愈則曰此桂枝發出汗也遂不問傷寒無汗者亦與桂枝湯悞之甚矣故仲景言無汗不得服桂枝是閉汗孔也又曰發汗多人手冒心心悸欲得按者用桂枝甘草湯是亦閉汗孔也又曰汗家不得重發汗若桂枝湯發汗是重發汗也凡桂

按條下言發字當認作出字是汗自然出也非若麻
能開腠理而發出汗也本草出汗二字上文有通血
一句是非三焦衛氣皮手中藥是為營血中藥也如
則出汗二字當認作營衛和自然汗出非桂開腠理而
發出汗也故後人用桂治虛汗讀者當逆察其意則可
矣噫神農作於前仲景述於後前聖後聖其揆一矣
不解肌或悞汗病邪入裏用五苓兩解表裏二法
一法水逆用之多服煖水汗出愈
一法脈浮小便不利微熱消渴者用之

五苓散方

猪苓 十八銖
去皮

茯苓 十八銖

澤瀉 一兩
六銖

白木 十八銖 桂 半兩

右五味爲散以白飲和服方寸七日三多服煖水送下
不解肌而慢發大汗其變逆有救亡陽漏風二法
一法真武 一法桂枝加附子湯

真武湯方

此本少陰經之神方并加減法而太陽上篇先錄
之至太陽下篇尤宜緊要先同錄此

茯苓 三兩

芍藥 三兩

生薑 三兩切片

白朮 二兩

附子 一枚炮去皮破入片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

桂枝加附子湯

於桂枝湯內加附子一枚餘依桂枝湯法

不解肌而用燒鍼取汗寒入核起多核止變一法

桂枝加桂湯更加桂

於桂枝湯方內更加桂枝二兩

中風肌未解不可下宜用桂枝湯解外一法

桂枝湯

方見前

不解肌反悞下邪不服者於前下藥內更加桂枝湯

卽桂枝大黃湯之互詞因上衝陽位故兩解之也

上衝者不用此方

不解肌反悞下心痞用溫補藥兩解表裏一法

桂枝人參湯 卽理中加桂枝而易其名也



中國醫藥大學圖書館版權所

桂枝四兩 去皮

甘草四兩 炙

白朮三兩

人參三兩

乾薑三兩

右五味以水九升先煮四味取五升內桂枝更煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服

或問大柴胡瀉也桂枝人參湯補也何為皆治下利心下痞鞭曰此非裏熱乃下之早因作痞裏虛協熱而利表又不解故與桂枝人參湯和裏解表若夫傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而不利者表和而裏病也以心下痞鞭故為實當以大柴胡下之二者心下痞鞭雖同而虛實之症有別故用藥有攻補之異

不解肌反悞下邪入陽明藥用太陽兩解一法



葛根黃芩湯方

葛根

半斤

黃芩

二兩

黃芩

三兩

甘草

二兩

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取三升

去滓分溫再服

不解肌反暈下宜辨陽實陽虛加減桂枝湯一法

桂枝去芍藥湯

下之後脈促腦滿於桂枝湯內去芍藥一味餘依

桂枝湯法

去芍藥方中加附子湯

下之微惡寒於桂枝湯內去芍藥加附子一枚

不解肌反暈下陽邪作喘有用桂枝加行氣藥一法

桂枝加厚朴杏仁湯 於桂枝湯觔加厚朴二兩杏

仁五十個遵依桂枝湯法

中風病不解熱結膀胱下血有宜先表後裏一法

桃核承氣湯 外不解者尚末可攻宜桂枝湯外解

已少腹急結可用攻此

桃仁 五十個 去皮尖

桂枝 二兩

大黃 四兩

芒硝 二兩

甘草 二兩 炙

右五味以水五升煮取二升半去滓內芒硝更上火微

沸下火方食溫服五合日三服當微利

中風病不解熱痰蓄血明辨脉症用抵當湯二法

一法發狂蓄血重證 一法再辨脉證法中之法

