

赤水玄珠婦人門第二十三卷目錄

產後乍見鬼神

心神驚悸

中風恍惚

虛極生風

虛汗不止

汗多變瘰

口噤腰背反張

產後中風

四肢筋攣

遍身疼痛

產後腰痛

產後腹痛兒枕痛

產後寒疝腹痛

產後兩脇脹痛

產後血瘕

虛煩發熱

產後血渴

產後乍寒乍熱

產後瘡疾

嘔吐腹脹

氣急喘促

口鼻黑鼻衄

月水不通

四肢浮腫

腹痛泄瀉

赤白痢風

大便秘澀

大小便不通

產後遺糞

產後諸淋

小便不禁

小便出血

玉門不閉

乳少或止

婦人齒唇

赤水玄珠婦人門第二十三卷

新安生生子孫一奎著輯

產後乍見鬼神

產後如見鬼神或言語譫妄皆由血氣虧損陰虛發熱或瘀血停滯以致心神煩躁而然也宜以調經散治之

薛氏曰若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八珍加炮姜若心血虛損用柏子仁散大抵此証皆由心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神

自安矣若果係鬼祟所附即灸鬼哭穴可愈其
或不起者多因豁痰降火攻伐之過也

一產婦患前症或用調經散愈而復作仍服前散
益甚痰涎上湧朝寒暮熱乃早用八珍散夕用
加味歸脾湯各五十餘劑而愈

調經散

治血虛經閉心神煩躁渾身疼痛或時

見怪

沒藥

琥珀

桂心

各一錢

白芍

炒

當歸

各七分

細辛

五分

麝香

少許

右為末每服半錢

姜湯酒各少許調服

栢子仁散

治產後元氣虛弱瘀血停滯狂言

亂語

栢子仁

遠志

人參

桑寄生

防風

當歸

炒

生地

甘草

炙

各等分用白羊心壹

個水三盞煮清汁七分入藥五錢煎服

產後心神驚悸

薛氏曰人之所主者心之所主者血心血一虛

神氣不守此驚悸所由作也當補血氣為主

一產婦患前症二度服琥珀地黃丸局方妙香散
隨效再患服之其症益甚而脉浮大安之如無

發熱惡寒此血氣俱虛乃以十全大補加味歸
脾二湯各百餘劑而愈後遇驚恐勞怒復作仍
服前藥而安

琥珀地黄丸 治產婦惡露未盡胸腹作痛或小

便不利

琥珀

延胡索

糯米同炒去米

川歸

各一兩

蒲黃

四兩

生地

研取汁

生薑

各二斤

研取汁

留

內炒地黃滓以地黃汁炒生薑滓各乾為度

右為末蜜丸如彈子大

每服一九當歸煎湯化下

治血虛驚悸少寐及產後敗血停留少腹作痛

辰砂 琥珀 沒藥 當歸分等 右為末每服

二錢空心日午臨卧白湯調下

治產後驚悸亂語精神不定用好硃砂為細末每

以酒調下一錢

產後中風恍惚

產後恍惚困元氣俱虛心經血少或外邪所侵以

致心神恍惚怔忡不寧

薛氏曰當大補氣血為主而佐以後方為善蓋風

乃虛極之假象也固其本元諸病自退若專治

其風則速其危矣

一產後患前症盜汗自汗發熱晡熱面色黃白四肢畏冷此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾二湯始應後因勞怒發厥昏憤左目牽緊兩唇抽動小便自遺作肝火熾盛用十全大補加釣藤山梔而安再用辰砂遠志丸而愈

辰砂遠志丸

產後中風驚狂起卧不安或痰涎

上湧

石菖蒲

遠志

去心芦用甘草湯煮

人參

茯神

辰砂

各三錢

川芎

山藥

鉄粉

麥冬

細辛

天麻

半夏

南星

白附子

各一兩

為末

姜汁糊為丸菴荳大別以硃砂為衣每服三十丸姜湯送下

產後極虛生風

產後生風因去血過多氣無所主以致唇青肉冷汗出目眩神昏急服濟危上丹若投以風藥則悞甚矣

薛氏曰若心脾氣血虛用十全大補湯如不應加

附子釣藤鈎若肝經血虛用逍遙散加釣藤經
云脾之榮在唇心之液為汗乃心脾二臟虛極
急用參附湯救之

一婦患前症或用諸補劑四肢逆冷自汗泄瀉腸
鳴腹疼以為陽氣虛寒用六君子姜附各加至
五錢不應以參附加至一兩始應良久不服仍
前腸鳴腹痛後灸關元穴百餘壯及服十全大
補湯方効

濟危上丹

乳香

五靈脂

硫黃

玄精石

阿膠 卷栢 桑寄生 陳皮各等分 將上四味

入石器微火炒再研入餘末用生地黃汁丸梧
子大每服二十丸食前溫酒或當歸酒下

當歸建中湯 治產後腹痛拘急痛連腰背自汗

少食 當歸 桂心各三兩 白芍六兩 炙甘草二兩

每服五錢姜枣水煎入飴糖一匙以効為止

獨參湯 一切失血惡寒發熱作渴煩躁或口噤

痰鳴自汗盜汗氣虛脉脫手足逆冷蓋血生於

氣補氣者乃陽生而陰長也

產後虛汗不止

產後汗不止者皆陽氣頓虛腠理不密而津液妄
洩也若遇風則變痙縱虛乏短氣則身體消瘦
唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

薛氏曰若血氣俱虛急用十全大補湯如不應參
附著附湯恐汗多亡陽發痙尤當用之王好古
曰頭汗出至頸而還額上偏多蓋額爲六陽之
所會也由虛熱薰蒸而出竊謂前症當以部位
分之額左屬肝額右屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬

心治者審之

一產婦略聞音响其汗如水而昏瞶諸藥到口即嘔作脾氣虛憊用參附末為細丸時含三五粒液下乃漸加至錢許却服參附湯而痊

一產婦盜汗不止遂致癡寐神思疲甚口乾引飲乃血虛有熱用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩黃柏炒黑倍加人參五味子二劑而愈

麻黃根湯

產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安

當歸

黃芪

炒

麻黃根

牡蠣

煨

炙甘草

人參 各等分水煎服

產後氣脫汗不止小便短少四肢難以屈伸

炙甘草

兩一

附子

錢五

桂心

白芍

炒各一兩五錢

每服三五錢加姜枣水煎服以効為止

止汗散

牡蠣

錢五

小麥麩

炒八兩

右為細末

每服三五錢猪油汁調下

人參湯

產後諸虛不足發熱盜汗內熱晡熱等

症

人參

當歸

等分為末猪腰子一枚切

片水二鍾糯米半合葱白二根煮取汁八分入

藥三錢煎服

當歸六黃湯 治氣血虛熱盜汗不止如不應加

人參白朮心血不足加炒酸棗仁

當歸 熟地 黃芪 生地 黃柏
炒各二錢 炒各二錢 黑

黃芩 黃連 水煎服
炒黑各一錢

參附湯 治陽氣虛寒自汗惡寒手足逆冷大便

自利或臍腹疼痛吃逆不食或汗多發瘧等症

人參 大附子 作一服加姜枣
一兩 炮五錢 水煎徐飲下

當歸補血湯

治肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲

晝夜不

息脉洪大而虛重按全無者

當歸錢三

黃芪

炙兩

水煎服

芪附湯

治陽氣虛脫惡寒自汗或口禁痰湧四

肢逆冷

或吐瀉腹痛飲食不入及一切虛寒等

症黃芪

一兩

附子

炮五錢

作一服加姜枣水

煎如不應倍加附子乃得全濟

汗多變瘰

產後汗多變瘰因氣血虧損肉理不密風邪所乘

口噤背強如癰或搖頭馬嘶不時舉發氣息如
絕宜速灌小續命湯若汗出兩手拭不及者不
治

薛氏曰此因去血過多元氣虧損或外邪相搏以
致牙關緊急四肢痙強或陰火內動或腰背反
張肢體抽搐若有汗而不惡寒者曰柔痙若無
汗而惡寒者曰剛痙由亡血過多筋無所養故
傷寒汗下過多及潰瘍而膿血大泄者多患此
乃敗症也急以十全大補湯治之如不應急加