

武昌醫館叢書

二三



傷寒論卷第五

漢 張仲景述 晉 王叔和撰次

辨陽明病脉證并治第八

辨少陽病脉證并治第九

辨陽明病脉證并治第八

合四十四法方一十首一方附并見

陽明少陽合病法

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯第

一三味前有陽明病二十七證

陽明病脉遲汗出不惡寒身重短氣腹滿潮熱大便鞭大承氣湯主之若腹大滿不通者與小

承氣湯第二

大承氣四味
小承氣三味

陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯若不
大便六七日恐有燥屎與小承氣湯若不轉失
氣不可攻之後發熱復鞭者小承氣湯和之第

三

用前第二方
下有二病證

傷寒若吐下不解至十餘日潮熱不惡寒如見

鬼狀微喘直視大承氣湯主之第四

用前第二方

陽明病多汗胃中燥大便鞭譫語小承氣湯主

之第五

用前第二方

陽明病譫語潮熱脉滑疾者小承氣湯主之第

六 用前第二方

陽明病譫語潮熱不能食胃中有燥屎宜大承

氣湯下之第七 用前第二方有陽明病一證

汗出譫語有燥屎在胃中過經乃可下之宜大

承氣湯第八 用前第二方下有傷寒病一證

三陽合病腹滿身重譫語遺尿白虎湯主之第

九 四味

二陽併病太陽證罷潮熱汗出大便難譫語者

宜大承氣湯第十 用前第二方

陽明病脉浮緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出

惡熱身重若下之則胃中空虛客氣動膈心中

懊懷舌上胎者梔子豉湯主之第十一

二味

若渴欲飲水舌燥者白虎加人參湯主之第十

二五味

若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主

之第十三

五味下有不可與豬苓湯一證

脉浮遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之第

十四

三味下有二病證

陽明病下之外有熱手足溫不結胃心中懊懷

不能食但頭汗出梔子豉湯主之第十五

用前第十

方一

陽明病發潮熱大便澹胃滿不去者與小茈胡

湯第十六

七味

陽明病脅下滿不大便而嘔舌上胎者與小茈

胡湯第十七

用上方

陽明中風脉弦浮大短氣腹滿脅下及心痛臯

乾不得汗嗜臥身黃小便難潮熱而噦與小茈

胡湯第十八

用上方

脉但浮無餘證者與麻黃湯第十九

四味

陽明病自汗出若發汗小便利津液內竭雖鞭



不可攻之須自大便蜜煎導而通之若土瓜根

豬膽汁第二十

一味豬膽方附二味

陽明病脉遲汗出多微惡寒表未解宜桂枝湯

第二十一

五味

陽明病脉浮無汗而喘發汗則愈宜麻黃湯第

二十二

用前第十九方

陽明病但頭汗出小便不利身必發黃茵陳蒿

湯主之第二十三

二味

陽明證喜忘必有畜血大便黑宜抵當湯下之

第二十四

四味



陽明病下之心中懊懣而煩胃中有燥屎者宜

大承氣湯第二十五

用前第二方
下有一病證

病人煩熱汗出解如瘡狀日晡發熱脉實者宜

大承氣湯脉浮虛者宜桂枝湯第二十六

大承氣湯

用前第二方桂枝湯
用前第二十一方

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛本有宿

食宜大承氣湯第二十七

用前第二方

病人小便不利大便下難下易時有微熱宜大

承氣湯第二十八

用前第二方

食穀欲嘔屬陽明也吳茱萸湯主之第二十九



四味

太陽病發熱汗出惡寒不嘔心下痞此以醫下之也如不下不惡寒而渴屬陽明但以法救之

宜五苓散第三十

五味下有二病證

趺陽脉浮而濇小便數大便鞭其脾為約麻子

人丸主之第三十一

六味

太陽病三日發汗不解蒸蒸熱者調胃承氣湯

主之第三十二

用前第一方

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯第三十三

用前第一方



太陽病若吐下發汗後微煩大便鞭與小承氣

湯和之第三十四

用前第二方

得病二三日脉弱無太陽証煩躁心下鞭

小便利屎定鞭宜大承氣湯第三十五

用前第二方

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏証大

便難宜大承氣湯第三十六

用前第二方

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯第三

十七

用前第二方

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯第三

十八

用前第二方

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯第三

十九 用前第二方

陽明少陽合病必下利脉滑而數有宿食也當

下之宜大承氣湯第四十 用前第二方

病人無表裏證發熱七八日脉數可下之假令

已下不大便者有瘀血宜抵當湯第四十一 用前

第二十四方
下有二病證

傷寒七八日身黃如橘色小便不利茵陳蒿湯

主之第四十二 用前第二十三方

傷寒身黃發熱梔子檳皮湯主之第四十三 三味

傷寒痲熱在裏身必黃麻黃連軹赤小豆湯主

之第四十四 八味

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何
謂也荅曰太陽陽明者脾約一云結是也正陽陽明
者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便已胃中
燥煩實大便難是也

陽明之為病胃家實

一作寒

是也

問曰何緣得陽明病荅曰太陽病若發汗若下若
利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣
內實大便難者此名陽明也



問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中主土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此爲陽明病也

本太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濇濇然者是轉屬陽明也



傷寒三日陽明脉大

傷寒脉浮而緩手足自溫者是爲繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者爲陽明病也

傷寒轉繫陽明者其人濇然微汗出也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮而緊若下之則腹滿小便難也

陽明病若能食名中風不能食名中寒

陽明病若中寒者不能食小便不利手足濇然汗出此欲作固瘕必大便初鞭後溏所以然者以胃



中冷水穀不別故也

陽明病初欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濺然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共并脉緊則愈

陽明病欲解時從申至戌上

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛攻其熱必噦

陽明病脉遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀瘕雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也

陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者此以久虛故也

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛云一

冬陽明

陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人咽必痛

若不欬者咽不痛

陽明一云冬

陽明病無汗小便不利心中懊懷者身必發黃

陽明病被火額上微汗出而小便不利者必發黃
陽明病脉浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必

盜汗出

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了者此必大便鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今爲小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈