

丹溪附錄三種

醫學叢書

二酉堂梓

醫學發明方目錄

吳萊更丸氣不通

消痞丸心下

本草十劑

乳香神應散止痛

紫金丹骨

調中順氣丸帶痞

木香順氣湯服

加減瀉白散嗽

三奇湯痰嗽

利膈丸痰喘

黃耆補中湯

傷元活血湯墮

當歸導滯散墮

聖靈丹止痛

沉香導氣丸痛

沉香交泰丸服

神祕湯

補中益氣湯倦



朱砂安神丸鎮固

人參益肺散氣鬱

草苈薤丸心痛

丁香練實丸癰疽

茴香練實丸疝

托裏榮衛湯瘡

續命子丸虛腫

六香楊氣丸腹脹

通經湯脾濕

薑附湯寒禁

用藥如戒法

通氣防風湯氣太

白木附子湯寒中

天台烏藥散疝

川練子散疝

沉香海金砂丸脾脹

海金砂散脾濕

廣茂瀆堅湯積

赤茯苓丸脾濕

沉香桂附丸



十全大補湯補弱

中滿分消湯寒脹

加減二陳湯吐

參蘇溫肺湯寒嗽

清肺飲子開渴小便

補腎益肝丸困王

地黃丸腎虛

離珠丸虛冷

八味丸腎氣虛

潤腸湯燥結

中滿分消丸熱脹

藿香安胃散嘔吐

人參平肺散肺癆

滋腎丸熱閉不渴

還少丹補

水芝丸補

三才封髓丹益腎

天真丹下焦虛

通幽湯幽門不通

當歸拈痛湯脚氣



羌活道朮湯脚氣

除濕丹溫腫

枳實大黃湯脚腫

疎風湯中風

大羌活愈風湯風

半夏溫肺湯痰冷嗽

紫蘇飲子脾寒

雙和散補血氣

五邪相干

興結導飲丸痞悶

除風湯淋瀝

小續命湯中風

三化湯治風燥

大秦朮湯中風

丁香半夏丸停飲

巴戟丸腎虛

附子溫中丸溫胃



医李發明卷一

新安吳勉學校

膈咽不通並四時換氣用藥法

黃帝鍼經云胃病者腹脹膈胃脘當心而痛上支兩  
脇膈咽不通食飲不下取三里夫咽者璣物之門  
戶也膈者上焦胸中心肺之分野不通者升降  
氣上不得交又云清氣在下則生飧泄泄黃如糜  
米穀不化者是也濁氣在上則生膈脹腹中膈滿  
不得大便或大便難或先結後溏皆是也濁氣在  
上當降而不降者乃腎肝吸入之陰氣不得下而

反在上也胃氣逆上或為嘔或為吐或為噦者是  
陰欠之邪上衝而吸入之氣不得入故食不下也  
此皆氣衝之火逆胃之脉反上而作者也清氣在  
下則生飧泄者胃氣未病之日當上行心肺而營  
經也因飲食失節勞役形體心火乘於土位胃氣  
弱而下陷于陰中故米穀入而不得升反降而為  
飧泄也膈咽之間文通之氣不得表裏者皆衝脉  
上行逆氣所作也蓋胃病者上支兩脇膈咽不通  
飲食不下取三里者是也鍼經云清濁相于亂於  
腎中是為大惋惋者感也氣不交通最為急證不

急去之諸線生矣聖人治此有要法陽氣不足陰  
氣有餘先補其陽後瀉其陰是先令陽氣升發後  
陽分而後瀉陰也春夏之月陽氣在經當益其經  
脉去其血絡秋冬陽氣降伏當先治其藏府若有  
噎有塞塞者五藏之所生陰也血也噎者六府之  
所生陽也氣也二者皆由陰中伏陽而作也今  
四氣用藥並治法于後

冬三月陰氣在外陽氣內藏當外助陽氣不得發汗  
內消陰火勿令泄瀉此閉藏周密之大要也盛冬  
乃水旺之時水旺則金旺子能令母實肺者腎之

母皮毛之陽元本虛弱更以冬月助其令故病者  
善嚏鼻流清涕寒甚出濁涕嚏不止比常人大要  
風寒小便數而欠或上飲下便色清而多夫便不  
調夜寒無寐甚則為痰咳為嘔為噦為吐為噎白  
沫以至口開目瞪氣不交通欲絕者

吳茱萸丸主之

吳茱萸

草豆蔻仁

各一錢二分

橘皮

益智仁

人參

黃芪

升麻各八分

澤瀉

白殭蚕

薑黃

柴胡各四分

當歸身

炙甘草各六分

木香二分

青皮

分三

大麥蘖

五

半夏一錢

右件為細末湯浸蒸餅為丸如黃豆大細嚼二十丸白湯送下無時

夏三月大暑陽氣在外陰氣在內以此病而值此時是天助正氣而挫其邪氣不治而自愈矣然亦有當愈不愈者蓋陰氣極盛正氣不能伸故耳且如膈咽不通咽中如梗甚者前證俱作治法當從時利膈丸泄肺火以黃芪補中湯送下如兩足痿厥行步惛然欹側欲倒臂膈如折及作痛而無力或氣短氣促而喘或不足以息以黃芪人參甘草白

木蒼木澤瀉猪苓茯苓橘皮等作湯送下滋腎丸  
一百五十丸六七月之間濕熱之令大行氣短不  
能言者加五味子麥門冬如心下痞膨悶食不下  
以上件白朮蒼朮等湯送下消痞丸五七丸更  
當審而用之

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

木香錢七

枳榔七

厚朴姜製二兩

人參

藿香葉

當歸

炙甘草

枳實炒各三兩

大黃

酒浸焙秤二兩

右為細末滴水和丸或少用蒸餅亦可如梧子大

每服三五十丸食後諸飲下

消痞丸治一切心下痞悶及積年久不愈者

黃連炒去鬚煉淨六錢

黃芩刮黃色六錢

姜黃 白木各

人參四錢

炙甘草錢

縮砂仁錢

枳實炒黃色半兩

橘皮錢

乾生薑錢

半夏湯洗七次四錢

炒黃色二錢

一方加澤瀉厚朴各三錢

猪苓三錢

右為極細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服五七  
十九至百丸白湯送下食後服

黃芪補中湯



黃芪 錢一

人參 錢八

炙甘草

白朮

蒼朮

橘皮 各半

澤瀉

猪苓

茯苓 各三分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓大溫送

下上件九藥

本草十劑

宜可以主壅姜橘之屬是也此大畧言之蓋外感六

淫之邪欲傳入裏三陰尚實而不受逆邪氣於胃

中室塞不通而成歲或嘔所謂壅也仲景云嘔多

雖有陽明證不可攻之此乾瀉者乎三陰者故卑



用生姜宣散必愈若嘔者有聲而有物邪在胃象  
未深入胃中以生姜橘皮治之或以霍香丁香  
夏亦此之類被之必愈此天分氣分虛無痰一  
所受今乃窒塞仲景謂膈之上屬上焦惡氣表  
或有形質之物因而越之則可若氣壅則不可  
者吐也亦破氣藥也辛瀉若陰虛穢氣述上窒塞  
嘔噦不足之病此地道不通也止當用生地黃當  
歸桃仁紅花之類和血涼血無用甘藥以補  
其氣微加大黃芒硝以通其閉大便利邪氣去則  
氣逆嘔噦自不見主復有胃中虛熱穀氣大虛發

而為嘔噦者俾得五穀之陰以和之或五穀皆屬陰  
易言止則嘔噦自止且如小兒其後餘熱不退  
不收歛大便不行一謂血燥則當以陰藥治血因  
而補之用清涼飲子通利大便而瀉其熱也按古  
云涼風至而草木實夫清涼飲子乃秋風微熱之  
劑傷寒家邪入於裏日晡潮熱大渴引飲諺語躁  
狂不大便是謂胃實乃可攻之夫胃氣為濕熱所  
傷以承氣湯瀉其上實元氣乃得周流承氣之名  
於此見矣今哀世人以苦瀉火故備陳之除熱瀉  
火非其寒不可以苦寒瀉火非徒無益而以害之



故諄諄及此至如孫真人言生疆嘔家之聖藥諄  
上焦氣壅表實而言之非以瀉氣而言之也

右脾胃虛弱穀氣不行衛下流清氣不上胃中閉

塞惟益胃推揚穀氣而已不宜瀉也若妄以瀉氣

瀉血藥下之下之則轉增閉塞疼痛或變作結胃

復下其膈由此致危者多矣鍼經說阿欠噦喘振

寒噫噎噤涕淚出大息涎下耳中鳴自齧舌煩唇

視生病者補之此十二邪者皆奇邪之走空數者

也凡邪之所在皆為不足宜補而不宜瀉空數者

胃之清氣能通也胃氣虛則穀氣不上行是氣路

中國藥學大學圖書館藏

不利經云蕪泉王英者津液之道路也津液不上  
胸中氣路不開亦令人噦勿作外實以生藥生姜  
之類瀉其壅滯蓋肺氣已虛而反瀉之是重瀉其  
氣必胸中如刀割之痛與正結胸無異亦重瀉其  
外用藥之際可不慎哉

通可以去滯通草防已之屬是也防已大苦寒能瀉  
血中大熱之滯也亦能瀉大便與大黃氣味同者  
皆可瀉血滯豈止防已而已通草甘淡能助西方  
秋氣下降利小便而瀉氣滯也小便氣化若熱絕  
津液之源於肺經源絕則寒水斷流故膀胱受濕