

蓮華 微寒升浮形似心實似蓮房有瓣 苦入心經

故入手少陰厥陰包心氣分而瀉火兼除手

足少陽三焦胆手陽明經大腸氣分濕熱散諸經

血凝氣聚營氣壅遏衛氣鬱滯遂成瘰癧 利水通經殺虫止

痛消腫排膿邪腫而不痛為虛邪腫而赤者為結熱腫而不赤為留氣停痰 為十二經瘡家聖藥諸瘡皆屬心火

紫蘇 味辛入氣分色紫入血分香溫散

寒通心利肺開胃益脾氣香入脾 發汗解肌和血

下氣寬中消痰祛風定喘止痛安胎利大小

腸解魚蟹毒多服世人真氣時珍曰同陳皮砂仁行氣安胎

同藿香烏藥溫中止痛同香附麻黃發汗解

肌同芎藭當歸和血散血同桔梗枳殼利隔

下氣寬中消痰祛風定喘止痛安胎利大小

男全書卷之二

休寧汪 昂初菴著輯 男汪 端其爾

弟汪 恒殿武參閱 侄汪惟寵子錫

發表之劑發者升之散之汗之也表者對裏而言也

明為表之裏少陽為表三陰為裏而太陽為表之表陽

表以漸而入于裏始自太陽以及陽明少陽乃入陰

經由太陰少陰以及厥陰六經乃盡也治病者當及

其在表而汗之散之使不至于傳經入裏則病易愈

矣若表邪未淨而遽下之則表邪乘虛入裏或誤補

之則內邪壅閉不出變成壞症者多矣經曰善治者

治皮毛其次治肌膚其次治筋脈其次治六府其次治五藏治五藏者半死半生也

麻黃湯仲景 治傷寒太陽症邪氣在表發熱頭痛身

痛腰痛骨節痛項背強惡寒惡風但有一毫頭痛無汗惡寒尚為在表

而喘脈浮而緊寒邪外屬陽不得越故鬱而為熱經曰人之傷寒則為病熱寒初中人必先在此

益友



表卽足太陽寒水之經太陽爲諸陽主氣乃一身綱維
本經之脉起自背上腦下項循肩夾脊抵腰行于身後

故所過之處無不痛也惡寒者雖無風而惡寒惡風者
當風而始惡之故惡寒必兼惡風惡寒有陰陽之分惡

也原病式曰身熱惡寒熱在表也熱在表而淺邪畏正

故病熱而反惡寒或言爲寒在表而熱在皮膚寒在骨髓者誤也凡人之傷風暑濕皆有汗惟傷寒獨不汗出

寒能澹血又表實也氣上逆古喘邪在表故脈浮
脈緊而傷風脈緩者寒動急而風緩散也喻嘉言曰冬

傷寒春傷溫夏秋傷暑傷濕此四時正病也無夏秋有傷寒冬春亦有傷暑傷濕乃四時之客病所謂異氣

也冬春正病有汗爲傷風無汗爲傷寒自
夏秋正病有汗爲傷暑無汗仍爲傷寒
亦涼陽

明急病喘而胸滿表牙藥盛陽氣不得宣發故逆而作喘若心下滿腹痛爲實宜下之此胸

中滿胸中去表猶近裏實則有陽明然其力陽合於
尚爲在表宜汗不宜下經曰陽明病脉浮無汗而喘者

大逆或問兩經合病當用兩經之藥何以偏用麻黃湯

耶蓋邪自太陽而來仍當提出太陽
不欲其陷入陽明故不用茵根也
亦治瘧症風寒客

亦治哮喘症哮喘由風寒客

汗疏表夏月多服泄人元氣

蘇蘆氣芳者良

薄荷猫之酒也天虎

于背俞復感于寒而作此湯散寒利肺病哮喘者雖服麻黃而不作汗

之酒也蜈蚣雞之酒也桑椹鳩之酒也茵草魚之酒也食之皆醉彼猶傷者薄荷汁塗之

雞蘇

一名水蘇一名龍腦薄荷

辛而微溫清肺下氣理

數沸去沫內諸藥煎熟服覆取微汗中病即止不必盡

生者麻黃

血辟惡而消穀治頭風目眩肺痿血痢吐衄

凡用麻黃去節醋湯晷泡曬乾備用庶幾大發冬月生用傷寒初感始于太陽故以

崩淋喉腥口臭邪執諸病

局方有龍腦雞蘇丸

左莖

發汗為先汗出則愈活人云凡發汗病症仍在者三日內可二三汗之令腰以下周徧為度王海藏曰表症當

中虛似蘇葉而微長齒齒面皺葉甚烈

汗脉浮急汗之脉沉緩汗之裏症當下脉浮緩下之脉沉急下之三陽汗當急而下當緩三陰汗當緩而下當

禾賊

溫微甘苦中空輕揚與麻黃同形

急按汗有大汗解表微汗解肌之殊下有急下少與微和滲利之別

性亦能發汗解肌升散火鬱風濕入足厥陰

此足太陽藥也麻黃中空辛溫氣薄肺家崇藥而走太

少陽益肝胆治自疾退翳膜

翳乃肝邪鬱遏不能

陽能開腠散寒從此人仍從此出桂枝辛溫能引營分

于目及疝痛脫肛腸風痔瘡赤痢崩中諸病

血病

之邪達之肌表桂入營血能解肌營衛和始能作汗杏仁苦甘散寒而降

浮萍

辛散輕浮入肺經達皮膚能發揚氣甘草甘平發散而和中經曰寒淫于內治以甘熱佐

邪汗丹溪曰浮萍發汗甚于麻黃止癢癢消渴生手揭汗

水又能下水氣利小便治一切風濕癢癢

一味蜜丸酒服治三十六種風癢燒烟辟蚊癢

紫膏膏

蒼子一名莫耳即詩卷耳甘苦性溫養髮汗散

風濕上通腦頂下行足膝外達皮膚治頭痛

目暗齒痛鼻淵肢痺痛癢癢疥癢

應膏遍身癢湯作治去刺酒拌蒸豕肉聖惠

葉搗汁治產後痢

天麻辛溫入肝經氣分益氣強陰通血

脈強筋力疎痰氣治諸風眩掉頭旋眼黑

以苦辛是已喻嘉言曰麻黃發汗其力最猛故以桂枝監之甘草和之用杏仁潤下以止喘逆

如駁馬防其放逸耳李士材曰古云冬不用麻黃夏不用桂枝蓋以冬主閉藏不應疎泄夏合炎熱不宜辛溫經所謂必先歲氣毋伐天和是也又云夏月不用麻黃兩說相反何耶或舍時從症或舍症從時臨時變通存乎其人耳李時珍曰仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝未有究其精微者津液為汗汗即血也在營則為血在衛則為汗寒傷營營血內瀉不能外通于衛衛氣閉固津液不行故無汗發熱而惡寒風傷衛衛氣外泄不能內護于營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風然風寒皆由皮毛而入皮毛肺之令也症雖屬太陽然面赤沸鬱咳嗽有痰喘而胸滿非肺病乎蓋皮毛外閉則邪熱內攻故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪達之肌表佐以杏仁泄肺而利氣汗後無大熱而喘者加石膏活人書夏至後加石膏知母是皆泄肺火之藥是麻黃湯雖太陽發汗重劑實散肺經火鬱之藥膜理不密則津液外泄而肺氣虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以救表內伐肝木以防脾佐以芍藥瀉木而固脾使以姜棗行脾之津液而和營衛下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也汗後脈沉遲者加人參以益肺氣也活人書加黃芩為陽旦湯以泄肺熱也是桂

言不遂風濕痛

頭痺小兒驚癇諸風眩掉皆結以湯雖太陽解肌輕劑實為理脾救肺之藥也至履曰

不能榮筋故見前症天麻入厥陰

而治諸疾汗氣和平諸疾自瘳

及類中風者用

風藥能燥血故也昂按風藥中須兼養血藥制其燥

也養血藥或兼搜風藥宣其滯也

古云治風先治血血行風自滅

瓜蒌名赤箭有風不動無風反掛一名定風

黃桂枝等劑所以必用也溫病熱病發于暄熱之時鬱

葛明亮醫者佳濕紙包煨熟切片酒浸二

解之此桂枝麻黃等所以不可用而後人所處水解散

宿焙用

秦苑

苦燥濕辛散風去腸胃之熱益肝

氣受傷也後發之溫熱病有惡風惡寒之症者風寒在表表

胆之氣養血榮筋

風藥中潤劑治風寒濕

溫病如之症故仲景曰太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病

經曰風寒濕三氣雜至合而為痺風勝為行

矣或有不因新中風寒亦見惡風惡寒之症者蓋因表

痺寒勝為痛痺濕勝為養痺痺在于骨則體

虛熱達于表而傷表氣所謂衛虛則惡風營虛則惡寒

重在脉則血滯在筋則拘

通身發熱血不虛耳非傷風惡風傷寒惡寒也溫病熱病亦有先見表症

下里背之草 天麻 秦苑 豬鬃草 卷一 齊 二 表 二 麻黃湯

三 益友

勞營蒸時珍曰手足陽明經藥兼入肝胆陽

成可攻之症非如傷寒從表而始也每見世人治溫熱

肺潮熱骨蒸聖惠方治急勞煩熱秦艽柴胡

病誤攻其裏亦無大害誤發其表變不可言此足明其

各一兩甘草五錢為末每服三錢治小兒骨

熱之自內達外矣間有誤攻致害者乃春夏暑熱中

蒸潮熱食減瘦弱秦艽炙甘草各一

之疫症邪純在表未入于裏不可與溫病熱病同論夫

兩每服一二錢或再加薄荷五錢

秋冬傷寒真傷寒也春夏傷寒寒疫也與溫病熱病自是

毒腸風瀉血口噤牙痛齒下齦屬手陽明大

兩途豈可同治哉況傷寒直中陰經與太陽陽明傷寒不及

能去下牙痛

鬱熱則傳陰經為寒症而當溫者又與溫病熱病大不

及本經風濕濕勝風浮之症利大小便

同其可混治乎一陽子曰傷寒傳足不傳手非窮理之

兼治黃疸

言也草寇劉子指足經所屬水土木水遇寒而涸寒土

煩渴便赤

遇寒而圻裂木遇寒而凋枯故寒毒傷之手經所屬金

養真膏為使畏牛乳

與火金遇寒而愈堅火體極熱寒不能襲故寒不能傷

孫葵草 苦辛生寒熟溫治肝腎風氣四

肢麻痺筋骨冷痛腰膝無力風濕瘡瘍瘡瘡

痛出脾腎兩虛陰血不足不由風濕而得者

忌服 風藥能燥血

江東人呼猪為豬其草似猪

風藥能燥血

江東人呼猪為豬其草似猪

厥陰心包火手少陽三焦火病矣治有三黃柴若數條

小便癰秘手太陽小腸內火病矣治有五苓導赤之例

黃表

唐成訥有進稀黃表宋張詠進稀黃表云其草金稜銀線素莖紫莖

對節而生頗同蒼耳臣吃百服眼目清明以

五月五月六月七月七月九月九月採

者尤佳去粗莖留枝葉花實酒拌蒸晒九次

蜜丸甚益元氣

稀莖辛苦氣寒故必蒸晒九次加以酒蜜則苦寒之陰濁

盡去而清香之美味見矣數不至九陰濁未盡則不能透骨搜風而却病也

熬膏以甘草生地煎膏煉蜜三味收之酒調

服尤妙

威靈仙

辛泄氣鹹泄水

本草苦元素甘氣溫屬

木其性善是能宣疎五藏通行十二經絡治

中風頭風痛風頑痺

濕熱流于肢節之間腫屬濕痛屬熱汗多屬風

劉子謂火熱寒不能傷信乎經又云人之傷寒則為病熱既云病熱則無水水土圻木枯之說而有金燧火亢之徵矣劉子何人敢恃管見惑世誣人哉機要云有厥陰經下利不止脉沉而遲手足厥逆唾涕膿血此難治宜麻黃湯小續命湯汗之此有表邪縮于內當湯表而愈張子和曰殭泄以風為根風非汗不出有病此者腹中雷鳴水穀不分小便滯澁服瀉藥濕藥不効多中脘臍下數十燥熱轉甚津液枯竭延余視之脉浮大而長身表微熱用桂枝麻黃湯加薑棗煎連進三大劑汗出終日至且而愈次以胃風湯和其藏府食進而安經曰春傷于風夏必殭泄故可汗而愈按風屬木脾屬土木克土故泄也○附大黃湯大黃兩半芒硝大腹皮木通甘草各一兩桂心七錢半桃仁廿一枚治陽毒傷寒未解熱在內恍惚如狂破棺千金湯苦參一兩酒煮取吐治天行熱毒垂死水解散

防風通聖散見表裏門

本方除桂枝加石膏名麻黃杏仁甘草石膏湯

下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者

本草威靈仙 鈞藤 卷一

行桂枝湯桂枝既不可行麻黃可行耶無大熱石膏可用行耶喻嘉言曰治傷寒先分營衛桂麻二湯斷無混用

行耶喻嘉言曰治傷寒先分營衛桂麻二湯斷無混用

益友

麻屬氣虛木屬濕痰死血十指麻木亦是胃之理此症太陽之邪雖從汗解然肺中熱邪未盡所以
 中有濕痰死血脾主四肢故也痛風當分新熱雖少止喘仍不止故用麻黃發肺邪杏仁下肺氣其
 久新痛屬寒宜辛溫藥久痛屬熱宜清涼藥草緩肺急看膏清肺熱即以治足太陽之藥通治手
 河間所謂暴病非熱久病非寒是也大法宜太陰經也倘誤行桂枝寧不壅塞肺氣而吐衄膿乎亦
 順氣清痰搜風散濕養血去瘀為要威靈仙傳曰一人手足不遂數十年過新羅僧曰得
 一藥可治入山求之乃癰瘕積聚痰水宿膿家身體煩痛宜發汗本方去桂枝杏仁加附子各麻黃

威靈仙也服之而愈 癰瘕積聚痰水宿膿家身體煩痛宜發汗本方去桂枝杏仁加附子各麻黃

黃疸浮腫大小腸秘風濕痰氣一切冷痛性附子湯金匱治脉沉虛脹者為氣水屬少陰發其汗即止

極快利積疴不痊者服之有捷效然疎泄真本方除桂枝杏仁名甘草麻黃湯金匱治裏水一身面目

氣弱者慎用和砂仁砂糖醋煎治諸骨硬小便不利重覆取汗本方去桂用麻黃節不去杏仁皮尖甘草

根叢鬚數百條長者二尺餘色深黑俗名鐵生用名三拗湯局方治感冒風寒咳嗽鼻塞麻黃留節發中

脚威靈仙忌茗麵湯取其發連皮取其瀝甘草生用補中有發也

釣藤鉤 甘微苦寒除心熱平肝風治大忌汗諸症仲景曰陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛

人頭旋目眩小兒驚啼癰瘕音熾縱筋急而痛宜汗之假令尺脉遲者不可發汗以營弱血少故也咽燥喉乾者不可發汗津液不足也咳而小便秘

弛為癰伸縮不已為癰
瘰俗謂之摘搦是也
客胎風發斑疹
若失小便者不可發汗發汗則四肢厥冷肺腎虛冷也
下利雖有表症不可發汗汗出必脹滿走津液而胃

肝風相火之病風靜火動諸症自除
相火散行
虛也
熱也
痢家亡血家不可發汗發汗必便血亡耗津液反增害

于胆三
焦心包
有刺類鉤藤細多鉤者良
純用鉤功
可發汗蓋為脉微也若浮緊者麻黃湯浮緩者桂枝湯

力加
倍
久煎無方
活人云脉微者黃芩芍藥湯犀角地黃湯瘡家雖傷

茵陳
辛苦微溫有小毒治風濕拘攣痛
表益虛熱愈甚而生風故變瘧
為在裏不可發汗
少陰病但厥無汗而強發之必動

痛
時珍曰古方治風癰有茵陳九治風痺有
其血或從口鼻或從目出是名下厥上竭難治
脈動

茵陳酒治產後風有茵陳膏風濕諸症多
數微弱者不可發汗
脉沉遲為在裏反發其汗則津

用之茵陳石南薺草皆治風妙品近世罕知
液越出大便難表虛裏實必謬語
汗家重發汗必恍

蕪草辛溫有毒治頭風癰腫乳癰疔瘻蘇頌
惚心飢汗者心之液心亡血液故亂
腹中上下左右

曰古方風濕諸酒多用之今人取葉煎湯
有動氣者
不可發汗

熱含治牙虫喉痺甚効甄權曰不入湯
葉葉如石榴而短厚莖用
傷寒傷風辨
傷寒發而後能發熱傷風即能發熱傷寒

當歸
甘溫和血辛溫散內寒苦溫助心
手足微厥傷風手足背皆
溫傷寒脉緊傷風脉緩

散寒
諸血屬心凡通脉者必
先補心當歸苦溫助心
太心肝脾心
陰陽表裏辨
陽症之表發熱惡寒頭痛脊強便清不渴
手足溫
陰症之表無熱惡寒面慘息冷
手足溫
麻黃湯
桂枝湯
益友

脾統血 為血中氣藥治虛勞寒熱欬逆

氣血和則 溫瘧 厥陰辛 便血 頭痛腰痛心

腹諸痛 散寒 風痙無汗 痙音聲上聲身強項

汗為剛痙有汗為柔痙當歸辛散風溫和血

產後亦有發痙者以脫血無以養筋也宜十

全大 痙痙痙痙 筋骨緩縱足不任地曰痙風

補湯 痙痙痙痙 寒濕客于肌肉血脉曰痺血

凝氣聚按之堅硬曰癥雖堅硬 痙痙痙痙痙

而聚散無常曰瘕尚未至癥也 痙痙痙痙痙

脉為病氣逆裏急薄脉為病腹痛腰痛如

坐求中 衝脉起于腎下出于氣街挾臍上行

入足滲三陰灌諸絡為十二經脉之海 及婦

手足厥逆陽症之裏唇焦舌燥煩渴掀衣揚手鄭足大

便秘結小便赤澀爪甲紅活身輕易于轉側脉浮洪數

陰症之裏不渴跪臥引衣自蓋唇紫舌卷大便滑泄小

便清白爪甲青黑身重難于轉側脉沉細數惟腹痛與

嘔陰陽裏症皆有之三陽經又有陰陽表裏之分太陽

以熱在皮膚頭痛項強在經為表麻黃湯桂枝湯九味

皆寒為熱漸入裏白虎加參湯若自汗狂譫熱已入胃

府為全入裏調胃承氣湯少陽以胸脇之間為半表半

裏表多小柴胡湯裏多熱盛者黃芩湯以上皆發熱太

陽惡寒陽明自汗少陽多嘔皆三陽症也大抵陽症多

得之風寒暑濕邪生于太陽也陰症多得之飲食起居

七情邪生于少陰也故曰傷寒內傷者十居八九也

則痛大腸瀉者用

臣地黃為佐川芎解肌鼻鳴乾嘔者風寒為表實宜發汗汗出惡寒為表虛宜止

為使名四物湯治血之總劑血虛佐以人參黃耆血熱佐以條芩梔連血積佐以大黃牽牛昂按血屬陰四物能養陰陰得其養則血

自生非四物能生血也若氣虛血弱之人當用人參取陽旺生陰血之義多有

過服四物陰滯之藥而反致害者

傷氣血

屬陽明症以微惡寒尚兼太陽仍當從外解肌斷其入胃府之路

各有所歸故名

血滯能通血虛能補血枯能潤血亂能撫蓋其辛溫能行

桂枝

芍藥

生薑

甘草

二兩

大棗

十二枚

熱服須

氣分使氣調而血和也東垣曰頭止血而上行身養血而中守尾破血而下流全活血而

更啜稀熱粥以助藥力溫覆取微似汗不可令如水淋

不走雷敷海藏並云頭破血時珍曰治上用頭治中用身治下用尾通治全用一定之理

滴汗出病差停後服服一劑盡病症猶在者更作服

川芎方剛養秦產力桑善補以秦產頭

此足太陽藥也仲景以發汗為重解肌為輕中風不可

圓尾多肥潤氣者長名馬尾當歸尾粗堅

枯者名鑊頭當歸只宜發散用治血酒製有少和之也經曰風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以甘緩

痰壅製

昂按當歸非治痰藥薑製亦臆說耳

具薑瀉海藻生薑之以酸收之桂枝辛甘發散為陽而臣以芍藥之酸收

惡爆麴

芎藭 辛溫升浮為少陽引經入手足藥甘溫能助此不熅于發散又以行脾之津液而和營

厥陰氣分肝心包乃中氣藥助清陽而開諸衛者也麻黃湯熅于發散故不用薑棗而津液得通矣

麥可漢曰氣升則鬱自降為通陰陽血氣之使潤肝燥補肝虛肝以肝雇安時曰若無汗小便數或手足逆身冷不惡寒反惡

瀉為補所謂辛以上行頭目下行血海搜脈可與脈緊為傷寒與之則表益實而汗愈難出矣傷寒

風散瘀止痛調經治風濕在頭血虛頭痛引能例曰桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛則亡周揚俊

血下行頭痛必用之加各引經藥太陽羌活引曰風既傷衛則衛氣疎不能內護于營而汗自出矣汗

陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮少陰細辛厥營固裏則不但外邪不出且入而為裏患矣然後知和

陰吳茱萸丹溪曰諸腹痛脇風氣鬱血鬱濕營則外邪出邪出則衛自密更不必用固表之藥而汗

經氣鬱亦能頭痛瀉血痢寒痺筋響目淚多涕熱肝風木為病諸外不語以衛氣不共營氣和諧故耳以營行脈中衛行

瀉血痢寒痺筋響目淚多涕肝熱肝風木為病諸外不語以衛氣不共營氣和諧故耳以營行脈中衛行

眩掉皆屬肝木及癰疽瘡瘍癰從大府生道從五藏桂枝止煩出汗仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝湯又

為陽血為陰血行脈中氣行脈外相並周流日無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯此又能開汗

寒濕搏之則凝滯而行遲為不及火熱搏之也二義相通否乎因仲景云太陽病發熱汗出者此為

則沸騰而行速為太過氣鬱邪入血中為陰
滯于陽血鬱邪入氣中為陽滯于陰致生惡
毒然百病皆由此起也

營弱衛強陰虛陽必瘳之故用桂枝發其汗此乃調其
營氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗而解非苦麻黃
能開腠理發出其汗也汗多則桂枝者以之調和營衛
則邪從汗出而汗自止非桂枝能閉汗孔也李東垣曰

黃芩散能走泄真氣單服久服令人暴亡

仲景治表虛製此湯用桂枝為君桂枝辛熱發散體輕
助陽芍藥甘草佐之若腹中急痛乃製小建中湯以芍

單服則藏有偏勝久服則過劑生邪故有此
失若有配合節制則不至此矣昂按芍地酸

藥為君芍藥酸寒主收補中桂枝甘草佐之一治表虛
一治裏虛又曰以桂枝湯肉桂治感寒腹痛之神藥如

寒為陰芍歸辛溫為陽故四物取其相濟以
行血藥之滯耳川芎辛散豈能生血者乎治

中熱腹痛去桂加黃芩許叔微曰仲景一百一十三方
桂枝獨冠其首今人全不用何也昂按仲景治傷寒用

法云驗治伏婦人過經三月用川芎末空心
熱湯調一匙服腹中微動者是胎不動者是

麻黃桂枝而全不用羌活防風是古人亦有所未備也
故潔古製羌活湯黃耆湯川芎湯海藏製神朮散白朮

經閉 蜀蘆為川芎秦蘆為西芎江南為撫芎

傷皆用羌活防風代之黃耆川
芎湯附補門神朮白朮湯見後

以川產大塊者白不油辛甘者勝白芷為使

本方加白朮川芎羌活防風飴糖名疏邪實表湯節治

畏黃連硝石滑石惡黃耆山茱萸

同 陶氏製此以白朮為君以代桂枝湯喻嘉言曰坐令
外感內傷混同論治矣昂按節菴之君白朮亦倣潔

白芩 苦酸微寒入肝脾血分為手足太

古之黃耆湯海藏之白朮湯而來又按節菴所著傷寒
六書盡易仲景原方參合後賢治法以代桂枝麻黃葛

陰行經藥 肺濕肝火 酸斂肝肝以斂 為渴以散為補 安脾肺

根青龍等劑在後人誠為便用故世之嗜節菴者勝于
仲景以節菴為捷徑以仲景為畏途節菴之書行而仲

本草綱目 草 川芎 白芩

卷一 醫方全書表卷二 桂枝湯

七 益友

固勝理

肺主皮毛脾主肌肉肝木不尅土則

景之書晦如節菴者可謂潔古海藏輩之功臣而在長

則勝

脾安土旺能生金則肺安脾和肺安

沙實為操莽也本集採節菴方論頗多然不能無遺議

理固和

血脈收陰斂逆氣散惡血利

者以節菴之功罪本方去芍藥生薑名桂枝甘草湯

小便

斂陰生津小便自愛中止痛

治發汗過多又手冒心心下悸欲得按者

者緩其中

氣除煩斂汗安胎補勞退熱治

益氣固表甘草補中助陽本方加附子名桂枝加附子

即調血也

漏痢後重

湯仲治太陽病發汗遂漏不止惡風小便難四肢微急

冷痛忌用

虞天民曰白芍不惟治血虛大能

汗多亡陽無以衛外故惡風汗多則便自少兼膀胱無

行氣

白芍甘草湯蒸腹痛因營氣不從逆于肉裏

增其勁故四肢微急與桂枝湯本方去芍藥加附子名

白芍能行

營氣甘草能斂逆氣又痛為肝木

以和營衛加附子以助元陽

白芍能理

中瀉肝肺脹喘噎

能轉側不嘔不渴脉浮虛而濇

其收降之

體又能人血海

風濕相搏也煩風也痛濕也不嘔不渴裏無邪也故知

厥陰

經治鼻血

本方加芍藥生薑各一兩人參三

益陰肝婦人胎產及一切血病又曰產後忌兩名桂枝新加湯仲景治傷寒汗後身痛脈來沉遲

用丹溪曰以其酸寒伐生發之氣也必不得血虛也正氣虛矣外邪豈能出乎與桂枝湯本方減甘

不可更瀉也寇氏曰減芍藥以避中寒微寒如芍藥古人猶諱諱告戒況大苦大寒可肆草一半加芍藥二倍名桂枝加芍藥湯仲景治太陽誤下

行而莫之忌耶○同白朮補脾同參耆補氣同歸地補血同芍藥瀉肝同甘草止腹痛同腹痛屬太陰症表症未罷而誤下表邪乘虛而入裏實

黃連止瀉痢同防風發痘疹同薑棗溫經散濕赤芍藥主治略同滿是邪已入太陰經然但腹滿時痛尚非大實本方加

尤能瀉肝火散惡血治腹痛堅積血瘕癰瘕大黃名桂枝加大黃湯仲景治表症誤下大實痛者別見

邪聚外腎為經閉腸風癰腫目赤皆散瀉之功白朮本方去桂加茯苓白朮名桂枝去桂加茯苓白朮湯表裏

補而收赤散而瀉白益脾能于土中瀉水赤仲景治服桂枝湯或下之仍頭項強痛發熱無汗心滿微

散邪能行血中之滯產後俱忌用赤白各痛小便不利表症未退復增滿痛便秘邪已內陷故去

隨在色單辨者人藥酒炒用制其寒婦人血分薑以散滿祛寒白朮茯苓以生津導水本方加杏仁厚

醋炒下痢後重炒鹽芒硝石斛畏蠶甲小朴名桂枝加厚朴杏仁湯仲景治太陽病下之微喘表未

本草 白芍 生地黃 卷一 醫方全書表卷二桂枝湯 左監友

薊反藜蘆

生地黄

甘苦大寒入心腎瀉內火小腸為丙

火心與小腸相表裏清燥金胃火消痰通經

平諸血逆治吐血衄中唾血者隨痰咯出或帶

血絲出腎經及肺經自兩脇逆上吐出者屬

肝經衄血者血溢于腦從鼻而出咳血者咳

出痰內有血兼屬肺經吐出嘔出成盆成碗

者屬胃經經漏不止曰崩血熱則妄行宜以

此涼之虛人忌用傷寒陽強痘症大熱痘症

用乾地黄可也甚多本多服損胃生掘鮮者搗汁飲之或

草未載用酒製則不傷胃生則寒乾則涼熟則溫故分

乾地黄

甘苦寒沉陰而降人手足少

解也桂枝湯以解表

本方去芍藥生薑加茯苓名茯苓

桂枝甘草大棗湯甘瀾水煎仲景治汗後臍下悸欲作奔

豚氣逆欲上凌心故用茯苓伐腎邪桂枝治奔豚甘草

大棗助脾而平腎益上以制水甘瀾水者用瓢揚萬

遍水性鹹而重揚之則甘而輕取其不助腎氣也

萬合麻黃湯名桂麻各半湯仲景治太陽症如瘧狀熱多

寒少寒多為病進熱多為病退陽勝陰也本方二分合麻黃湯一分名桂

枝二麻黃一湯仲景治太陽病已大汗形如瘧日再發

者為輕本方二分合越婢一分名桂枝二越婢湯仲景治太

陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可發

汗喻嘉言曰此風多寒少之症無陽二字仲景言之不

一後人置為闕疑不知乃亡津液之通稱也故以發汗為戒然非汗風寒終不解故取桂枝之二以治風起婢本一以治寒方為合法方時行曰此即桂枝麻黃之

陰心厥陰心包
及手太陽經小
滋陰退陽涼

合制乃大青龍以芍藥易杏仁之變制耳
本方倍芍藥加飴糖名小建中湯

血生血治血虛發熱
勞傷咳嗽

仲景再加黃耆名黃耆建中湯
金匱並除飴糖名桂枝加

陰虛者地黃丸為要藥亦能除痰丹溪曰久病陰火上升津液生痰不生血宜補血以制相火其痰自除
瘰癧瘰癧有觸而心動曰驚無驚而心虛火動者有因肝虛胆怯者有因水停心下者火畏水故悸也地黃能交心腎而益肝胆亦能行水故治之
吐血血由心腎氣結或憂思房勞所致多屬虛寒
血運崩中經曰陰虛陽不足虛羸不足腹中痛引腰背小腹拘急血分若崩傷不止不可端作熱治

下熱痛折絕筋生地一斤瓜薑糟一斤生薑四兩炒熱罨傷折處冷則易之又生地汁三升酒升半煮服下撲損瘀血
填骨髓長肌肉利金匱治血痺如風痺狀
本方加栝蒌根名栝蒌桂枝湯

大小便調經安胎又能殺蟲治心腹急痛
治大陽症備身強凡凡脉反沉遲此為痙
方搗汁和麵作餅食能利出虫忌用鹽本強凡凡其意以肺熱不令移于腎也加于桂枝湯中則草漚曰丹溪云氣病補血雖不中病亦無害可以徹熱榮筋調和營衛矣凡字無鉤音殊羽短難飛

五青芝草 乾地黃 熟地黃 卷一 虛勞 表 二 桂枝湯 大青龍湯 益友

益友

益友

益友

益友

益友