

雜病篇

積聚 浮腫 脹滿 消渴 黃疸

東醫寶鑑

十四

院
書

東醫寶鑑雜病篇卷之六

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

積聚

積聚之因

靈樞曰喜怒不節則傷藏藏傷則虛風雨襲

積

○着於陽明之經則挾臍而居飽食則益大飢

則

益小○着於緩筋也似陽明之積飽食則痛飢

則

安飢○着於腸胃之膜原痛而外連於緩筋飽食

則

安飢則痛○着於膈筋在腸後者飢則積見飽食

則

積不見按之不得○清濕襲虛則病起於下積

之

始生得寒乃生厥乃成積厥氣生足惋足惋生

脛

寒脛寒則血脉凝澁血脈凝澁則寒氣上入於

腸

胃入於腸胃則膜脹膜脹則腸外之汁沫迫聚

不

得散日以成積○卒然多飲食則脹滿起居不

節

用力過度則陽絡脈傷陽絡傷則血外溢陰絡

傷

則血內溢血內溢則後血沫與血相搏則并合

則

血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合

至心下久不愈令入百心○脾之積名曰痞氣
收發黃疸飲食不為肌膚○肝之積名曰息賁
熱喘咳發肺癰○腎之積名曰奔豚
發於小腹上至心下若豚狀或下或上無時久不
已令入喘逆骨痠少氣纒○肝積面青脉弦而長
細作之在左脇下○心積面赤脉數而實定在心
下○脾積面黃脉大而虛而一沉○腎積面黑脉寸
積面白脉數而浮定在右脇下○腎積面黑脉寸
口大實而喘沉
定在小腹

伏梁有二證

帝曰病有小腹盛上下左右皆有根此為

血居腸胃之外不可治治之每切按之致死○帝
曰人有身體體外不可治治之每切按之致死○帝
伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而着於
肓肓之原在臍下故環臍而痛不可動之動之為
水尿流之病此二病
同名而實異也經

脉法

鬱脉多沉伏或結或促或代或氣得肺脉鬱脉結沉瀉積脉
弦堅切○沉病在右脇有積氣得肺脉鬱脉結沉瀉積脉
甚結微則積微肺脉雖不見右手脉常沉伏○
心肺有積其脉皆大○脉弦緊為積脉弦長脾腎有
積其脉皆大○脉弦緊為積脉弦長脾腎有
癥也夫癥瘕積聚之脉皆弦緊在心下即寸弦緊者
在胃脘即關弦緊在臍下即尺弦緊○內有積不
見脉難治見一脉相應為易治○診積聚其脉堅
強急者生虛弱者死○五脉弦而伏者腹中有癥不
可轉也○心死不治○五藏為積六府為聚積在
本位聚無定處○浮者死○沉者死○五實或結或伏為
聚為積實強者生○沉小者死○而沉實或結或伏為
附骨肝弦○疝則浮結○急滑脾實且長肺浮喘率○
六聚結沉疝則浮結○又有癥瘕其脉多弦弦急○
癥疾弦細○癥堅○沉重中散食成癖瘕左轉沉重
氣癥膏前若肉○癥右轉橫旋○積聚癥瘕緊則
痛纏虛弱○診婦人死○實強可瘕○春○脉弦急者生虛弱小
弱者死○

六鬱為積聚癥瘕痞之本氣血不和百病不生一有

不食散也明○熱鬱而成痰痰鬱而

癥食鬱而成痞痞滿此心然之理也○又氣鬱而濕

滯濕滯而成熱熱鬱而

而食不消化而遂成痞塊此六者相因而不為病也

○鬱者結聚而不得發越也當升者不得升當

降者不得降當變化者不得變化也此為傳化失

常六鬱之病見矣明○一曰氣鬱二曰濕鬱三曰

熱鬱四曰痰鬱五曰血鬱六曰食鬱此六鬱也六

鬱不言風寒者風寒鬱則為熱故也明○治鬱之

法順氣為先降火化痰消積分熱多少而治

芎總解諸鬱明○內經曰木鬱達之火鬱發之土

鬱奪之金鬱泄之水鬱折之木鬱達之

謂吐之令其條達也火鬱發之謂汗之令其疎散

也土鬱奪之謂下之火鬱令無壅碍也

泄解表利小便也水鬱折之謂抑之制其衝逆也

此治五鬱之大要耳明○諸鬱通用六鬱湯麤麤

加味麤麤保和丸加味麤麤保和丸

六鬱湯

通治六鬱香附子二錢川芎蒼朮各一錢半陳皮半夏製各一錢赤茯苓梔子仁各七分

縮砂甘草各五分右剉作一貼薑三木煎服

氣鬱加木香檳榔烏藥紫蘓葉○濕鬱加白朮羌活防己○熱鬱加黃連連翹○痰鬱加南星瓜蒌

仁海粉○血鬱加桃仁牡丹皮韭汁○食鬱加山

六鬱湯

川芎諸鬱火便香附蒼朮神麴梔子連翹陳皮

五分右剉作一貼薑三片水煎服

麴麴丸

解諸鬱蒼朮便香附川芎神麴炒梔子炒各等分右為末水和丸如菜豆大溫水下七丸

十丸如寡婦僧道之類名利不遂或先富後貧或久

病不愈者皆宜服此丸

麴麴保和丸

開鬱行氣消積散熱白朮三兩山楂肉二兩蒼朮川芎神麴炒便香附陳皮半

夏白茯苓枳實黃連酒炒當歸酒洗各一兩梔子
炒連翹薤蒿子炒木香各五錢右為末薑汁泡蒸
餅和九悟子大薑
湯下五十丸

加味麤麴丸
解諸鬱開膏膈進飲食蒼朮泔浸薑汁
陳皮去白木炒黃芩炒各一兩半山楂肉蒸二

氣鬱
育滿脇痛脉沉宜用香附燕芎蒼朮陳湯煎水
木香調氣散解鬱調胃湯麤麴丸○二陳湯煎水
吞下交感丹

濕鬱
周身關節走痛首如物蒙足重遇陰寒便發脉沉
濡宜用蒼朮川芎白芷赤茯苓枳○宜服參濕湯
散觀平胃

熱鬱
目蒙口乾舌燥小便赤濁脉沉數宜用青黛香附
蒼朮川芎梔子枳○宜服升陽散火湯火鬱湯
附

附

痰鬱

曹滿動則喘惡起卧急情寸脉沉滑宜用海石香
附子瓜蒌仁南星附○宜服瓜蒌枳殼湯升養二

血鬱

四肢無力能食小便淋大便紅脉沉芤宜用桃
仁紅花青黛川芎香附子附○宜服生韭飲順氣

食鬱

噎酸惡食黃疸鼓脹痞塊脉氣口緊盛宜用蒼朮
香附山查子神麴鐵砂醋炒附○宜服香砂平胃

木香調氣散

治氣鬱烏藥香附枳殼青皮陳皮厚朴
燕芎蒼朮各一錢木香縮砂各五分桂

皮甘草各三分右剉作
一貼薑三片水煎服細作

解鬱調胃湯

治氣分之火壅遏於中時作刺痛皆由
怒憂思慮勞心所致也梔子鹽水炒當

歸酒洗各一錢二分白朮陳皮白茯苓各一錢赤
芍藥酒浸生乾地黃酒洗薑汁炒香附米各八分

神麴炒麥芽炒各七分川芎六分桃仁生甘

瓜蒌枳殼湯治痰鬱瓜蒌仁枳殼桔梗川芎蒼朮香

縮砂木香各五分甘草三分右判

升發二陳湯治痰鬱半夏二錢陳皮蕪荳赤茯苓各

三片煎服一貼入薑

生韭飲治血鬱胃脘有瘀血作痛生桃仁七箇

順氣丸治血鬱香附子八兩以黃便浸

當歸活血湯治血鬱當歸赤芍藥川芎桃仁各一錢

紅花五分桂皮乾薑炮甘草各三

香砂平胃散治食鬱蒼朮厚朴陳皮便香附各一錢

各五分甘草炙三分右剉作一貼
入薑三蘿蒿子炒研一撮煎服

散鬱湯治食鬱陳皮赤茯苓各一錢二分枳殼香附各一錢甘

草五分右剉作一貼入薑三煎服○鬱則胃熱鬱
散則上焦行下脘通水穀之陰自滋沛身中之陰

氣自生矣

痞塊積聚所屬部分凡痞塊積聚在中為痰飲○在左

為血塊右為食積中為痰飲此言誠然夫左關肝
膽之位主藏血液右關脾胃之位主藏飲食中間

則為水穀出入之道路所以左為血
塊右為食積中為痰飲其理昭然

痞塊證治血塊是有形之物氣不能成塊乃痰與食積死
俱宜二陳湯加補氣行氣藥先須斷厚味○治

塊當隆火消食積○痰行氣死血塊去後須大補之

明○凡婦人有塊多屬死血○痞塊一名痰瘕
其不能移動者是癥塊也或有或無或上或下或

左或右者是瘕塊也俱用潰堅湯丸為主○脇下有塊宜當歸龍薈丸五錢加桃仁薑黃各一兩

蜜丸服之○驚氣成塊者妙應丹四錢每服五甲炒驚甲燒各三錢玄胡索蓬朮各四錢每服五

七味柴平湯消積保中○瘕塊宜用連羅九消塊凡加味柴平湯消積保中○瘕塊宜用連羅九消塊凡

化痞丹無用膏藥外貼之○凡腹中有塊不問積聚癥瘕俱為惡候切勿視為尋常若脹滿已成

膏腹鼓急雖倉扁復生亦莫能救其萬一也傳

化塊丸治瘕塊及血塊海粉酒煮三稜蓬朮並醋煮右為末醋糊和丸梧子大

白朮湯下醋糊和丸梧子大

連蘿丸治食積死血痰飲成塊在兩脇作痛雷鳴嘈同炒去茱萸一半以益智五錢同炒去益智白芥子蘿菹子並炒各一兩半莢子川芎三稜蓬朮桃

仁香附子山查肉神麴各一兩青皮五錢右為末蒸餅和丸梧子大

白湯吞下五六十九○一名

白芥丸治癰疽

消塊丸治瘰癧癰疽
各一兩半右為末陳醋三升置磁器內先納

大黃煎不住手攪使微沸盡一升下餘藥末熬至

惡物則丸如

加味柴平湯治積塊有熱柴胡黃芩半夏蒼朮厚朴

各七分甘草五分右剉作一

消積保中丸散痞除塊白茯苓土炒三兩陳皮去白二

芥子炒神麴炒黃連薑汁炒施子薑汁炒各一兩

檳榔七錢蓬朮三錢連薑汁醋炒各八錢麥芽炒六錢

乾漆炒五錢青皮香油炒縮砂炒各四錢木香阿

下八

丸十

開懷散

錢三稜蓬朮並醋炒青皮陳皮半夏白茯苓

香附子檳榔枳實紅花甘草各

柴香散

骨皮三腹有氣一塊略通或膨脹寒熱枳實地

芍藥厚朴香薷黃連玄胡索各五分

保和丸

治一切飲食所傷及積聚痞塊久服自消白

連翹香附子酒炒黃芩厚朴羅當子炒各二兩枳實麥

梧子大茶清下

化痞丹

消積塊專攻之劑大黃四兩醋浸七日日晒

香附子便浸炒桃仁各一兩紅花二錢青黛五分

葛根煎湯下黃和好醋煮成糊和九葉豆大茅根

積聚治法

可治積聚無逆察其時詳藏以知其病有餘不足可補

結者散之客者除之留者行之坐者削之強者奪之

行之節飲食慎起居和其氣病亦可退當用消積

藥使病不飲化則自消而無下積之說蓋不可直便有

取亦不以傷胃氣也○諸積勿輕吐下徒損真氣

五積九更妙○內經曰破積用毒藥衰其大半

而止藥凡大積○聚消其大半乃止藥過劑則死

瘕氣○肝積用肥氣丸○心積用伏梁丸○脾積用

聚宜用散○初聚湯香稜丸○大七氣湯○大阿魏丸○大安

阿魏丸○久則為寒宜辛溫消導○大七氣湯○大阿魏丸○大安

惡者○攻之○所喜者○誘之○積○易水蛭○如礪砂水銀○治

木香積○柳○礞石○氣○○牽牛○甘遂○治水○積○雄○黃○賦○粉○

治三枝蓬朮○石○血○積○香○附○枳○實○治○食○積○山○楂○阿○魏○

巴豆○治○寒○積○黃○連○大○黃○治○熱○積○○五○積○六○聚○通○

用增損五積九消積正元散肥氣九○伏梁九○痞氣○

九氣湯○貴九○奔豚九○又有奔豚人化鐵湯○聚湯○香○拔九○大○

氣凝結為癥瘕○腹中痞塊○堅硬○作○楚○當○以○破○氣○藥○

伐之○或以類相從○如敗梳○治風癥○銅胃治龍癥○

藥治○髮○癥○石○

灰治○

增損五積丸

錢○治○五○積○○黃○連○升○積○五○錢○脾○腎○積○七○

錢○脾○腎○積○八○錢○心○積○五○分○烏○肝○肺○積○一○錢○心○腎○脾○積○五○

分○脾○肺○積○二○錢○腎○積○五○分○肺○脾○腎○一○钱○半○心○腎○脾○積○五○

心○脾○肺○積○二○錢○腎○積○五○分○肺○脾○腎○一○钱○半○心○腎○脾○積○五○

五○分○右○為○末○蜜○九○梧○子○大○初○服○二○钱○半○○如○肝○積○加○

為○度○治○積○塊○不○拘○臍○上○下○左○右○通○用○○如○肝○積○加○

柴○胡○一○兩○川○椒○四○钱○蓬○朮○三○钱○皂○角○昆○布○各○二○钱○

東醫寶鑑卷之九

牛○心積加黃芩三錢肉桂枝神丹參各一錢
蒲五分○肺積加桔梗三錢天門冬青皮陳皮白

豆蔻各一錢紫苑川椒各一錢半○脾積加吳茱
黃芩縮砂各二錢澤瀉茵陳各一錢川椒五分

○腎積加玄胡索三錢苦練肉全蝎附子獨活各
一錢澤瀉芎藭各二錢肉桂三分丁香五分

消積正元散 治痰飲氣血鬱結食積氣不升降積聚
脹痛白朮一錢半神麴香附枳實玄胡

索海粉各一錢赤茯苓陳皮青皮縮砂麥芽炒山
楂肉甘草各七分右剉作一貼薑三水煎服○

名開胃正元散
無名實附枯

肥氣丸 治肝積柴胡一兩黃連七錢厚朴五錢川椒
四錢甘草三錢蓬朮人參昆布各二錢半皂

角白茯苓各一錢牛乾薑巴豆霜各五分川烏二
分右為末蜜丸梧子大初服二九日加一九二日

加二九至大便溏便漸減服
周而復始減半勿服

伏梁丸 治心積黃連一兩半厚朴人參各五錢黃芩
桂枝茯苓神丹參各一錢乾薑菖蒲巴豆霜川