

注解傷寒論卷第六

仲景述

王叔和撰次

成無已注解

辨太陰病脉證并治法第十

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛

若下之必胃下結鞭

太陰為病陽邪傳裏也太陰之脉布胃中邪氣壅而為腹滿上

不得降者嘔吐而食不下不得上者自利益甚時

腹自痛陰寒在內而為腹痛者則為常痛此陽邪干裏雖痛而亦不常痛但時時腹自痛也若下之則陰邪留於胃下為結鞭經曰病發於陰而反下之因作

痞太陰中風四肢煩疼陽微陰澁而長者為欲愈

太陰

脾也主營四末太陰中風四肢煩疼者風淫未疾也表邪少則微裏向和則澁而長長者陽也陰病見陽

脉則生以陰得陽則解故云欲愈

太陰病欲解時從亥至丑

土陰土

寒作和解

王於丑亥子向太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯經曰

浮為在表沉為在裏太陰病脈自利不渴者屬太陰

以其藏有寒故也當溫之宜服四逆輩自利而渴者屬少陰為寒

在下焦自利不渴者屬太陰為寒傷寒脈浮而緩手

在中焦與四逆等湯以溫其藏足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者

不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止

以脾家實腐穢當去故也太陰病至七八日大便鞭者為太陰入府傳於陽明

也今至七八日暴煩下利十餘行者脾家實腐穢去

也下利煩躁者死此以脾氣和逐邪下泄故雖暴煩

下利日十餘行而利必自止本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之表邪未罷醫下之邪因乘虛傳於太

陰裏氣不和故腹滿時痛與桂枝湯以解表加芍藥以和裏

大實痛者桂枝加大

黃湯生之

大實大滿自可除下之故加大黃以下大實

太陰為病脈弱其

人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃

氣弱易動故也

腹滿痛者太陰病也脈弱其人續自便利則邪雖在裏未成大實欲與大

黃芍藥攻滿痛者宜少與之以胃氣尚弱易為動利也

辨少陰病脈證并治法第十一

少陰之為病脈微細但欲寐也

少陰為病脈微細為邪氣傳裏深也衛氣

行於陽則寤行於陰則寐邪傳少陰則氣行於陰而不行於陽故但欲寐

少陰病欲吐不

吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故

引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者

以下焦虛有寒不能制水故令色白也

欲吐不吐心煩者表邪傳

裏也若腹滿痛則屬太陰此但欲寐則知屬少陰五六日邪傳少陰之時自利不渴者寒在中焦屬太陰此自利而渴為寒在下焦屬少陰腎虛水燥渴欲引水自救下焦虛寒不能制水小便色白也經曰平利欲飲水者以有熱故也此下利雖渴病人脈陰陽俱然以小便色白明非裏熱不可不察

緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利

脈陰陽俱緊為少陰傷寒法當無汗反汗出者陽虛不固也故云亡陽以無陽陰獨是屬少陰內經曰邪客少陰之絡令人嗌痛不可內食少陰病欬而下利少陰寒甚是當咽痛而復吐利

譫語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也

欬而下利裏寒而亡津液也反以火劫強責少陰少汗者津液內竭加火氣煩之故譫語小便難也

陰病脈細沉數病為在裏不可發汗

少陰病始得之反發熱脈沉者

為邪在經可與麻黃附子細辛湯發汗此少陰病脉

微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脉弱濇者復不可

下之脉微為亡陽表虛不可發汗脉少陰病脉緊至

七八日自下利脉暴微手足反温脉緊反去者為欲

解也雖煩下利必自愈少陰病脉緊者寒甚也至七八日傳經盡欲解之時自下

利脉暴微者寒氣得泄也若陰寒勝正陽虛而泄者

則手足厥而脉緊不去今手足反温脉緊反去知陽

氣復寒氣去故為欲解下利煩躁者少陰病下利若

逆此正勝邪微雖煩下利必自止少陰病下利惡寒踰臥寒極而

利自止惡寒而踰臥手足温者可治陰勝也利目止手足温者少陰病惡寒而踰時自煩

裏和陽氣得復故為可治惡寒而踰陰寒甚也時時自煩欲

欲去衣被者可治去衣被為陽氣得復故云可治

少陰中風脈陽微陰浮者為欲愈

少陰中風陽脈當浮而陽脈微者表

邪緩也陰脈當沉而陰脈浮者裏氣和也

少陰病欲

陽中有陰陰中有陽陰陽調和故為欲愈

解時從子至寅上為三陽少陰解於此者陰得陽則

解也少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至

者灸少陰七壯

經曰少陰病吐利躁煩四逆者死吐利手足不厥冷者則陽氣不衰雖反

發熱不死脈不至者吐利暴

少陰病八九日一身手

虛也灸少陰七壯以通其脈

足盡熱者以熱在膀胱必便血也膀胱太陽也少陰

病至八九日寒邪變熱復傳太陽太陽為諸陽主氣

熱在太陽故一身手足盡熱太陽經多血少氣為熱

所乘則血散下少陰病但厥無汗而強發之必動其

行必便血也血未可知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上

竭為難治

但厥無汗熱行於裏也而強發汗虛其經絡熱乘經虛迫血妄行從虛而出或從口

鼻或從目出諸厥者皆屬於下但厥為下厥血少陰溢於上為上竭傷氣損血邪甚正虛故為難治

病惡寒身蹇而利手足逆冷者不治

針經曰多熱者易已多寒者難

已此內外寒極純陰無陽故云不治少陰病吐利躁煩四逆者死

吐利者寒

甚於裏四逆者寒甚於表躁煩則陽氣欲絕是知死矣

少陰病下利止而頭眩

時時自冒者死

下利止則水穀竭眩冒則陽氣脫故死

少陰病四逆惡

寒而身蹇脉不至不煩而躁者死

四逆惡寒而身蹇則寒甚脉不至則

真氣絕煩熱也躁亂也若憤躁之躁從煩至躁為執來有漸則猶可不煩而躁是氣欲脫而爭也譬猶燈

將滅而暴明

少陰病六七日息高者死

腎為生氣之源呼吸之門

其能久乎少陰病六七日不愈而息高者生氣斷絕也

少陰病脉微細沉但欲臥汗

出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得卧寐者
死陰氣方盛至五六日傳經盡陽氣得復則愈反更
故自利煩躁不得卧寐則正氣弱陽不能復病勝藏
死少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯
主之少陰病當無熱惡寒反發熱者邪在表也雖脉
沉以始得則邪氣未深亦當溫劑發汗以散之
麻黃附子細辛湯方

麻黃

二兩去節甘熱

細辛

二兩辛熱

附子

一枚炮去皮破八片辛熱

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以辛潤之
麻黃之甘以解少陰之寒細辛附子之辛以溫少
陰之經

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去土沫內諸
藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二

三日無證故微發汗也

二三日邪未深也既無吐利厥逆諸裏證則可與麻黃附

子甘草湯微汗以散之

麻黃附子甘草湯方

麻黃

二兩去節

甘草

二兩炙

附子

一枚炮去皮

麻黃甘草之甘以散表寒附子之辛以溫經氣

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸

藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧黃連阿膠

湯主之

脈經曰風傷陽寒傷陰少陰受病則得之於寒二三日已上寒極變熱之時熱煩於內心



中煩不得卧也與黃連阿膠湯扶陰散熱

黃連阿膠湯方

黃連

四兩
苦寒

黃芩

一兩
苦寒

芍藥

二兩
酸平

雞子黃

二枚
甘溫

阿膠

三兩
甘溫

陽有餘以苦除之黃芩黃連之苦以除熱陰不足以甘補之雞子黃阿膠之甘以補血酸收也泄也芍藥之酸收陰氣而泄邪熱

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烱

盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附

子湯主之

少陰客熱則口燥舌乾而渴口中和者不苦不燥是無熱也背為陽背惡寒者陽氣



弱陰氣勝也經曰無熱惡寒者發於陰也灸之助陽消陰與附子湯溫經散寒

附子湯方

附子

二枚炮破八片去皮辛熱

茯苓

三兩甘平

人參

二兩甘溫

白朮

四兩甘溫

芍藥

三兩酸平

辛以散之附子之辛以散寒甘以緩之茯苓人參白朮之甘以補陽酸以收之芍藥之酸以扶陰所以然者偏陰偏陽則為病火欲實水當平之不欲偏勝也

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三

服

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之

少陰腎水而主骨節身體疼痛支冷脈沉者寒盛於陰也身疼骨痛若脈浮手足熱則可發汗此手足寒



脈沉故當與少陰病下利便膿血者桃花湯主之陽病
附子湯溫經下利便膿血者協熱也少陰病下利便膿血
者下焦不約而裏寒也與桃花湯固下散寒

桃花湯方

赤石脂

一斤一半全用

乾薑

一兩

粳米

一升

瀉可去脫赤石脂瀉以固腸胃辛以散之
乾薑之辛以散裏寒粳米之甘以補正氣

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內赤

石脂末方寸七日三服若一服愈餘勿服

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止

便膿血者桃花湯主之

二三日以至四五日寒邪入裏深也腹痛者裏寒也小便

不利者水穀不別也下利不止便膿血者腸胃虛弱下焦不固也與桃花湯固腸止利少陰病



下利便膿血者可刺下焦血氣留聚腐化則為膿少

陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之利止

手足厥冷則陰寒氣甚煩躁欲死者少陰病下利咽

痛胃滿心煩者猪膚湯主之少陰之脈從腎上貫膈入肺中循喉嚨其支

別者從肺出絡心注胃中邪自陽經傳於少陰陰虛

客熱下利咽痛胃滿心煩也與猪膚湯調陰散熱

猪膚一斤味甘寒味

猪水畜也其氣先入腎少陰客熱是以猪膚解之加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白

粉五合熬香和令相得溫分六服

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗

湯陽邪傳於少陰邪熱爲咽痛服甘草湯則差若寒熱相搏爲咽痛者服甘草湯若不差與桔梗湯以

和少陰之氣

甘草湯方

甘草

二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七合日

二服

桔梗湯方

桔梗

一兩味辛甘微溫

甘草

二兩味甘平

桔梗辛溫以散寒甘草甘平以除熱甘桔相合以調寒熱

右二味以水三升煮取一升去滓分温再服

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主

之熱傷於絡則經絡乾燥使咽中傷生瘡不能

苦酒湯方

半夏

洗破如棗核大十四枚辛温

雞子

一枚去黃內上苦酒著雞子殼中甘微寒

辛以散之半夏之辛以發音聲甘以緩之雞子之甘以緩咽痛酸以收之苦酒之酸以飲咽瘡

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀鐸中安

火上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

甘草湯主少陰客熱咽痛桔梗湯主

少陰寒熱相搏咽痛半夏散及湯主少陰客寒咽痛也



半夏散及湯方

半夏

洗辛溫

桂枝

去皮辛熱

甘草

炙甘平以
上各等分

內經曰寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦半夏
桂枝之辛以散經寒甘草之甘以緩正氣

已上三味各別搗篩已合治之白飲和服方寸七

日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散兩

方寸七更煎三沸下火令小冷少少嚥之

少陰病下利白通湯主之

少陰主水少陰客寒不能
制水故自利也白通湯溫

裏散
寒

白通湯方

葱白

四莖
辛溫

乾薑

一兩
辛熱

附子

一枚生用去皮
破八片辛熱

內經曰腎若燥急食辛以潤之葱白之辛以通陽氣薑附之辛以散陰寒

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾

嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯脉暴出者死微

續者生

少陰病下利脉微為寒極陰勝與白通湯復陽散寒服湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者寒

氣太甚內為格拒陽氣逆亂也與白通湯加猪膽汁湯以和之內經曰逆而從之從而逆之又曰逆者正治從者反治此之謂也服湯脉暴出者正氣因發泄而脫也故死脉微續者陽氣漸復也故生

白通加猪膽汁湯方

葱白

四莖

乾薑

兩一

附子

一枚生去

皮破八片

人尿

五合

猪膽汁

一合