



新編分類藥物學講義

太倉景芸芳編述

第十四類搜風通絡藥

威靈仙

產地

陝西河北均有

形態

蔓性類。莖長三四尺。葉作肉蓯形。夏開合。辦花。淺紫色。或碧白色。一根叢聚。數百條。

乾者深黑色。可入藥。

性味

味苦辛。鹹性溫。

選用

採根。陰乾。粗切用。

主治

（從新）中風痛風。筋骨頑痺。便瀉。疏風邪。走經通絡。可導可宣。治痺行痰去濕。



近世
用

用量

方

禁忌

為一切風痛之藥。治痛風更效。功能通筋

二錢至三錢

配海桐皮、片姜黃、治痛風、乳蒼朮、防風

夏、傳攻、治痺痛、乳高楠、這志、治中風

其性利下、病人壯實者、誠有殊效。氣虛者

服之必瀉、而成痼疾。以其耗血、走氣也。若

血虛而痛、不因風濕者、勿用。

按本經言此藥。侯宗甫室有之。時珍釋其名

曰威者、言其性猛也。靈仙言其功神也。本品

辛泄氣。恒言立臥弱也。能宣通藏府經絡。治



痺閉。故一切胸腹冷滯痰水癥病。用有風濕
 而成者。皆可用此。行散。惟性急且溫。辛味。而
 散。若無風邪痰濕者。用之。恐損真氣。當慎。
 所云治痛風。即歷節痛。之類。以濕邪流入枝
 節。痛不可忍。至手足麻痺。而成頑癰。則有蓋
 痰之別矣。麻者。屬氣。表木。屬血。表土。有因
 痰死血。而十脂麻。和胃中。有濕痰。而四肢不
 用。其治。當知新久。大率。新痛。屬寒。宜用辛溫。
 久痛。屬熱。宜用清涼。河間所謂。暴病能熱。久
 病能寒。是也。大法。宜理氣化痰。搜風去濕。養
 血去瘀。為要。若有人病手足不遂。寸步難移。



者數十年。近良醫莫能療。必遇一人告曰。此疾一藥可治。但不知此地有否。因為之入山。求覓果得。乃知威靈仙也。使服之數日。能步履。其後山人知。遂傳其事。此藥能治一切病。觀婦科大全良方。威靈散。治婦人久冷氣滯。血蓄少腹痛。世醫得效。元威靈仙丸。治男年氣耗。大便秘結。一則雖有滯而病已久。一則高年真氣已衰。前云衰者勿用。何二方均用之耶。蓋与邪正配伍。使祛邪而不傷本也。又能治骨硬。歌云。鐵脚威靈仙。砂糖和酒煎。一口吞下去。鐵鞭軟如綿。

蠍

產地
形態

性味
選用
近世
用量

廣東一帶

卵生虫類長三寸許八足青黑色

形上有

觸鬚一對如蟹螯現胸部頗短腹部隱而

十三段端大環節扶小如尾末有毒鉤過

敵則向上彎曲注射毒液捕蜘蛛等小虫

為食並能螫人

辛甘溫有毒

或用尾或全用但須去炒乾

搜風治驚

三

藥物學

二 蠍

三

中國醫學院



麝香

与鎮逆平肝通絡。治凡有魚養血。

禁忌

用者。覆者慎用。

按蠟味辛有毒。其力在尾。有單用尾者。

全用者。入肝。搜風。走臍。行經。治大人中。

凡小兒驚痛。屬寒邪者。皆可用之。至東垣治。

月事不調。寒熱帶下。有丁香。香柴。切。湯。方。用。美。

活柴。切。當。歸。生。地。丁。香。全。蠟。蓋。取。其。八。肝。煎。

散。血。中。之。風。熱。耳。

海桐皮

產地

生南海山谷中



形態

桐之一種。枝幹皆有刺。葉圓大。稍似梧桐。其葉密。春暮色深紅。花附幹而生。側敷。蒙其皮入藥。

性味

辛溫。

選用

用皮粗切。

功用

行經絡。去風濕。

用量

錢半至三錢。

藥方

配海風藤片。姜黃。治痛風。有特效。亦須与

表白藥同用。

禁忌

有風濕者勿用。

按海桐生近海處。皮若梓皮而堅。能行經達



白芷

產地
形態

性味
選用

病。所治風濕腰脚不遂。血脉頑痛。腿膝疼痛。
為宣散之品。長于治下焦之病。古法用以
為者。多矣。本經名茅香。別錄名澤芬。

生川谷下澤。今蜀之有之。

莖高一尺餘。葉卵圓形。對生。花白色。而微

黃。夏結子。根長尺餘。粗細不等。色白。根與

葉均可入藥。

味辛。性溫。

時珍曰。今人採根洗刮。截以石灰拌勻。

晒乾。其色白也。入藥微炒。



主治

功用

用量

方

禁忌

本經主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱

風侵目淚出長肌膚潤澤顏色可作面脂

長于祛風勝濕凡一切火鬱風濕之症可

用外科用以挑膿散腫止痛生肌解蛇毒

一錢至錢半

配甘菊、蒺藜、治疔、風、侵目、淚出、同黃耆、皂

角、赤芍、或、挑、膿、止、痛

性溫而外、嘔吐、因于、熱者、漏下、赤白、因于

火者、勿用、瘡、疽、潰、後、亦、宜、漸、減、以、其、能、耗

胃氣也

按白芷辛、上達、性溫、氣、入、手、足、陽、明、經



入手太陰為解利陽明凡熱其痛及空熱
 凡侵目淚出之要藥其所主之病亦不為
 經如寧熱其眉後骨痛其目齒三經之凡
 熱也漏下赤白瘡疽其面皮膚膏凡痺癢
 經之濕熱也凡熱者辛以散之濕熱者燔以
 徐之取其辛散利竅之功故能散血而陰腫
 且有挑膿生肉之能故外科多用之如腸癰
 肉潰見肺腹絞痛便下敗膿濁血腥穢甚
 項此以挑膿為全乃以他藥補之且能治鼻
 淵改其所以患鼻淵者亦因凡熱乘肺上燥
 於腦疔見鼻多濁涕腥臭如膿經云腦滲為



羌活

產地

形態

性味

選用

主治

涕宜同細辛，夷治之上云能愈漏下赤白者，以其凡入脆丸所致，故有都梁丸之治。味白芷洗晒為末，蜜丸，荆芥湯化下。蓬原云此方深得本經之旨，真以其性善祛風也。

生于羌胡。雍州四川皆有之。與獨活相埒，惟色紫而蜜氣猛烈。辛苦性溫，氣雄而散。色紫有臭味者力優。綱目以獨活、羌活主治不分，因率其類二種也。



功用

此品為足太陽經。凡濕相搏。一身盡痛。除痛。肢節痛。督脉為病。脊強而厥者。此藥。

用量

二錢至三錢。

藥方

羌活獨活同用。去風濕。配阿膠。可治頭痛。內傷等症。血氣珍痛。及遍身肢節痛。皆能。

禁忌

所宜。

按此物與獨活異同。但羌活入足太陽膀胱經。獨活入足少陰腎經。羌活性燥而散。獨活性平而達。羌活治上。獨活治下。故古人療風多用獨活。兼水則用羌活。蓋其氣雄而散。味



獨活

又名獨搖草

產地

雍州川谷

形態

薄上并能急走絡筋祛寒散濕透肌者
風之邪利用身百節之痛外台秘要用獨
活羌活松節酒煎同服少許治歷節痛風
頗效

一莖直上不為風搖叶皆有毛夏月高達
六七尺叶為羽狀複叶秋開小花甚多五
瓣淡綠色實紫根入藥古方唯用獨活後
人分為二種以形虛大者疏色黃為獨活
節密猛烈者為羌活



性味

辛苦微温

選用

去皮或焙用

主治

本經主風寒所擊金瘡止痛奔豚痼疾

子疝瘕

功用

能通達周身而散風勝濕兩足濕痺不能

運動凡風濕相搏之病為皮膏枯枯痺手

足掌痛皆可用之

用量

一錢至二錢

要方

与細辛同用治厥陰頭痛与羌活防風同

用治痺症配生地治風熱齒痛

禁忌

陰虛下体痿弱者禁用一切虛風類中成



非獨活所宜

獨活為足少陰腎經引經藥較羌活

氣味

均細升中有降不為風搖而能治風浮萍

浮水不沉而能治水因其所勝而為制也

本經治金瘡為風所擊而痛及奔豚痼疾

女子血癥皆風邪內疾之候也

天麻

抱朴子名獨搖芝本經名禹母一名定風草

產地

高山深谷之露

形態

其莖大如手指色紫叶甚小根有大塊為

斗細者為子

性味

平甘而溫



選用
主治
功用

酒浸明亮堅實者佳

本經殺蠱毒惡氣

為所經氣分筋通筋脉疏痰氣血虛

肝弱

風從内生者可用為邪旋眼花時時黃作

此處風內動也天麻投之甚效小兒驚痰

風熱亦可用之子名還筒子能受風補震

一錢至錢半

用量

配桑叶鉤藤半反治頭痛配當歸川芎鉤

藤小生也則補肝震配龍胆叶羚羊角鉤

藤則清肝熱配桑叶菊花薄荷豨豆衣則

泄肝陽配蠍尾地龍蚕砂煇衣則定所風

