

廣醫大全目錄

卷二十四

前陰部

龜頭腫痛門主論 附方

陰頭癰門主論 附方

魚口便毒橫痃門主論 附方

陰腫如斗門主方

下疳門主論 附方

初婚玉莖傷損門主論



傷寒瘡後內外瘡門主論

囊癰門主論 附方

腎囊風門主論 附方

腎囊生瘡門主方

濕陰瘡門主論

胞漏瘡門主論

陰囊出汗門主方

疝氣偏墜門主論 附方

陰器部



陰吹門主論

陰瘡門主論

附方

陰匿門主論

附方

陰菌門主論

附方

陰挺門主論

附方

陰癢門主論

陰戶腫突門主論

陰脫門主論

附方

產婦陰戶傷損門主論

附方



南京中醫藥大學圖書館藏

陰戶交接出血門主論

陰戶開張門主論

女子新嫁陰戶痛門主論

陰冷門主論

實女無竅門主方



北京中医药大学图书馆藏书

瘍醫大全卷二十四

光華堂梓

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

項錢之栢東陽

男 槐煥用和 全校

前陰部

自外腎起至前陰腎囊止一切癰疽疔疰疳腫皆彙
於此部中以便檢閱恭治

龜頭腫痛門主論

澄

曰龜頭腫痛有因肝經濕熱下注其腫紅脹宜龍
胆瀉肝湯主之外搽介靈丹有因塗搽春藥交接
違理其腫滲痛宜用松夢茶洗外搽玉紅膏有因
嫖妓變童沾染穢毒其腫紫黯上有黃衣溺管必
痛小便淋瀝否則莖皮收緊包住龜頭卽成袖口
疳瘡亦有龜頭之下紅胞如瘤堅硬亦有所患之
胞如水光亮卽爲雞嗉疳瘡治之大法以大黄下
之撤毒爲主亦有新婚損傷龜頭腫者以濃甘草

湯洗之擦玉紅膏



卷之六



南京中医药大学图书馆版权所有

龜頭腫痛門主方

龜頭腫大硬痛

沈貞疇

用雞蛋三個去黃留蛋清將龜頭插入一炷檀香
時取出再以捫青布燒灰存性碾末一錢加冰片
一分搽上過夜其腫即消

龜頭腫痛

蟹蟄二隻炭火炙去皮肉將骨炙酥爲極細末每
一分加冰片一分碾勻細細搽上

又方

鬼饅頭嫩枝

即木蓮蓬

三四兩煎湯薰洗止痛消腫

又方

蝸

牛

焙乾

枯

礬

各等分

碾細濕則乾摻乾則香油調搽

陰頭癰門主論

王肯堂曰陰頭癰生於陰頭

準繩

陰頭癰門主方

驗方

鱉甲爲末鷄蛋清調敷





魚口便毒橫痃門主論

陳實功曰左爲魚口右爲便毒兩腿合縫之上名橫

痃 正宗

鬼遺方云腿胫兩處起爲便毒

王肯堂曰便毒生於小腹下兩腿合縫之間其毒初

發寒熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎爲作強之

官所藏者精與智也男女大慾不能直遂其志故

敗精搏血留聚經隧乃結爲便毒矣蓋腿與小腹

合縫之間情氣所出之道路也或觸景而動心或



夢寐而不洩既不得偶合陰陽又不能忘情息念
故精與血交滯而成腫結也初起切不可用寒涼
之藥恐氣血愈滯不得宣通反成大患惟當開暢
散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣

準繩

孫曰商賈中野合不潔淫妓便構此證或疳瘡或楊
梅者皆由慾火淫熾一旦交合不潔爲淫火冲動
膚腠開通是以受毒初發之時慎不宜以敗毒之
藥瀉之何也毒邪非虛不入若復虛胃氣與毒邪
下陷治之非彌年累月不愈也捷法只宜發汗其

次利小便膚勝所感之邪汗易散也陰莖腿縫皆
肝經絡肝腎主下焦又肝主小便使毒邪從小便
中出所治皆順也故治之不旬日便可奏功若曾
發汗利小便體厚邪固而不得宣通者乃以破毒
活血調氣之劑攻之俟毒氣宣通隨以補劑托之
亦不失先後着也

陳實功曰左爲魚口右爲使毒總由精血交錯生於

兩胯合縫之間結腫是也

魚口生於左腿兩胯合縫之間便毒生於右腿

兩胯合縫之間

生於小腹之下近之陰毛之傍結腫名曰

橫痃又名外疔是也此三症得之於奔走勞役濕熱下注者少得之於人房忍精強固不泄或慾念已萌停而不遂以致精血交錯凝滯結而爲腫腐毒內攻者多然其毒從便而入亦當從便而出當散滯行瘀通利大小二便初起宜通水丹逐之不應用九龍丹山甲內消散七日已後根本堅固恐其作膿宜用火針法刺之亦妙已出膿者十全大補湯服之庶易收斂遲則恐生別症難愈謹戒

房事 正宗

又曰因奔走勞役而得者卽用四妙湯補而消之甚
驗

馮魯瞻曰便毒生於小腹下兩腿合縫之間小兒是
肝火肝疳總屬肝經熱毒治宜瀉肝再視血分毒
氣爲之斟酌若大人犯此者多因慾火不能直遂
其志故敗精搏血留聚經隧乃結爲毒治宜散鬱
散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣間有因
交合不潔爲淫火衝動是以受毒所致者治宜先
爲發汗次利小便可也

錦囊

又曰婦人疝瘕或肝經濕熱下注或鬱怒傷損肝脾
其候兩脇小腹腫痛或玉門焮腫作痛憎寒壯熱
小便澀滯腹內急痛或小腹痞悶上攻兩脇者肝
經濕熱鬱滯也龍膽瀉肝湯玉門腫脹者肝火血
虛也加味逍遙散若槩投散血攻毒之劑則誤矣
周文采曰便毒初發寒熱交作兩腿合縫之間腫起
疼痛是也夫腎爲作強之官所藏者精與志也男
女大慾不能直遂其志故敗精搏血留聚中途而
結爲便毒矣夫人脚腿與小腹合縫之間乃精血