

尚科傳
議義
程門先
生扁雪



程門雪先生編

婦科論義

流瀉洲朱昂之題



婦科學講義目錄

一 經閉門

二 崩漏門

三 胎前門

四 妊娠門

五 白帶門



婦科學講義

程門雪先生編輯

李秉仁抄

經閉門

經閉者月事不以時下也。欲知其月事不以時下之病，因當先識月事能以時下之原理。求之內經之云：女子二七而天癸至，任脉通，太衝脈盛，月事以時下。故有子此言，能以時下之平人也。又云：二陽之病，兼心脾，有不得隱曲。女子不月，此言不以時下之病理也。只此二項，已將婦科經行經閉之旨，闡發過半矣。二陽者，胃也。胃為水谷之海，飲食入胃，取汁變化，游溢精氣，上輸於脾。之氣散。

精上奉於心化生精血故曰心生血脾统血胃為生化之源也女子二七血脈漸充灌養百骸之外尚有餘力以歸於奇經任脉上通胞絡其餘者由胞達任則任脉通矣衝為血海日積月將儲蓄漸滿則太衝脉盛矣任通衝盛期以一月故月事應時而不以月之盈穀潮之有信故又曰月信月信準確則能有子是為平人反而言之若太衝不盛則血海空虛多所羸弱何未滿溢則經事不能以時下而為經閉矣其閉也固由太衝之不盛血海之空餒而血海之無餒又由乎任脉之不通每以下注於血海任脉之不通固也其不通之原理

又由乎心脾生化之不足。血濁裏少。用以灌輸藏府。流注百骸。已塞矣不及。又何能以其所餘。少润奇經耶。原夫生化之源。出自中焦胃腑。反本窮源。是經閉由於衝不盛。衝不盛由於任不通。任不通由於心脾血少。心脾血少由於二陽胃土生化不及。剥爾抽丝。厚之精進。其妙不可勝言矣。更為下特語。胃土生化不及。固也。其所以致此生化不及者。又因何哉。曰。仍在於心脾。憂愁傷心。憂傷脾胃。氣鬱而不行。心氣結而不通。心有所憶。則廣寢忘餐。脾胃有所思。則食入不化。不觀乎恩憲過度。憂愁之極者乎。終日不食。亦不饥。犯不飢也。脾胃失其運化之功。

能也。所納既弱於平時。運化又失其常度。血者。水谷之精氣。水谷既弱。精氣自少。何以使心生血灌。既因身更何以旁溢橫流。充於奇脈耶。反復四環。以求一当。此一段經文之精義。肯能逃乎胸中。則一切經用。多候均可迎刃於腕下。而經任脉通。太衝脉盛。月事時下之反面。以悟出經閉病理治法。尤為前人所未言。環研医方。汗牛充棟。实無能与此意相合者。惟帰脾湯一方。妙具會心。实為經閉之聖方。方用參芪。帰身。有服。補益氣血。沂其化源。為君。术艸。雲木。健其脾氣。參仁。遠志。補其心血。為臣。尤妙在木主一味。游其督絡。助

其消磨。与遠志同用。尤能引胞通任。靈實并顧。行補相益。凡屬心脾鬱結。二陽病之經閉。服此而不效者寡矣。吾嘗以此方之意。变化出入。用梔仁。柏仁。帰釐。降蘭。辛潤。通絡之品。以通任脈。又附砂仁。木香。凍皮。芳草。營中之品。以行脾氣。荷童。遠志。菖蒲。貝母。辰姜。通竅化疾之品。以用心結。存觀其氣血多少。或佐之物。以養榮。或佐之更。以調氣。苺利絳而用灵。亦奏奇功。於不覺。其有獲於經旨也。矣矣。且其中尤有深義。存焉。女科諸書。每不謂血隨氣行。氣流血流。氣以血凶。故調經以理氣為先。凡七情鬱結之症。必先氣鬱。然後血閉。故經閉每



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library

用生砂涼附以通氣。常惟行氣之員。多偏走。燉若因
寒而凝者。投之固無所碍。若因鬱結而閉者。多偏
藏。必有鬱火結立。至燉助立。必致反增病邪。後人每謂
血得寒則凝。得熱則行。之成謬。信用多疑。遂成習慢。
貽害不淺。倘遇斯症。用固有害。不用又不能奏效。只能
斟酌。倅氣少佐控用。或取其較和平者用之。主不外
陳附。不外砂。昔人已有明論。或取育陰清熱之品相制
而用。亦屬良工苦心。總不外承姜。貝母二味之妙。承姜潤
燥消結。貝母潤鬱化痰。行而不溫。通而不燥。凡氣結血
結。均由不得曉曲。比附結而未。血結成燔。氣結成瘻。得此

二味以润燥用结。游滯化疾。氣不行而自行。血不通而自通。有游滯結之功。而無助燥立之害。有滯火結熱者。極其相宜。即吳氏姜貝養食榮之遺意也。昔人謂調經必先理氣。丹參不以魚附。吾為之續曰。理氣必先游滯。魚附不以為以也。贝母之解滯結。見於詩經。女子善懷。即不得隱曲之意。配以衣美。其效更大。若再以桃仁。柏仁。紅花。帰薦。猩絳。桑麻等。系養食。辛潤之品佐之。則更成合美。以辛通之品。亦偏溫燥。求其能辛通閉結而不致溫燥碍熱者。惟此表里一法。此法叶氏最為擅長。誠屬聽以過人一等。大足取法。愿未大医。以趨良養食。奏易

恩箇肇。倡言治癆。而所用方剗。雖不出越鞠道遥。
神抑氣一途。仍是了而不了。萬不以此法之善。故吾謂其半。
尤有深意。可以世所傳經閉大法。分血枯血結二種。抑在
任脈不通。衝脉不盛。脫胎而未。有主峻攻者。則不通之
極則也。有主峻補者。則不盛之極則也。有主閉者。理氣末
用。道遠者。則不得隱曲之遺意也。有主養心和脾。用
歸脾者。則病兼心脾之遺意也。有主先和胃氣。用黑
功者。則二陽為病之遺意也。數取義多得。一旦倘能
融会贯通。依症化裁。則經閉之效。大体在是矣。至其詳
細治療。則血枯血結之中。又有分別。血結者。有寒凝熱

閉。疾阻之不同。血枯者。有氣不生。血陽不化。陰及陰虛。火炎。並血竭之分別。其餘附症。尤不勝記。今且先言。血滞血结者。一曰寒。凝脇產之反。經行之時。血海空虛。胞門不閉。凡冷襲於胞門。寒氣客於子宮。血得寒。則凝。風冷外來。血流凝泣。則經閉。症見少腹冷痛。四肢不溫。面青舌白。不渴形寒。脉來細壅緊濶。諸寒象。需治者。宜以溫通之。呂派之沉寒冰結。得熱則行也。當分經重二法。妙用时不久。僅一二月。少服而堅結之形者。只以桂枝。吳萸。川椒。生姜。細辛。當帰。川芎。桃仁。紅花等。辛溫祛寒。去瘀通經。可呂可矣。或但寒傷。



任脉闭塞不通者。古方以鹿茸、当归、吴茱萸、加麝蔚、生
少许通之。亦能立见功效。若脉壅经行之脉。徐缓未
净。適傷寒冷。裡血凝瘀。日就月將。渺形長大。以及
歷年血寒積結胞門。愈積愈堅愈大者。闭及數年。
少亦數月。甚則繫痛大痛。少腹有形。拘之坚硬如絳。
所謂石癥瘡癧者。往用溫通。病淺病深。渺難取效。宜
用重剝大辛大苦。破積削坚之品。如川烏、硫黃、巴霜
之類為主。以溫破其積冷。更以乾漆、麤虫、礬石、山稜之
類為佐。以消其堅癖。如礬石丸、通經丸、芎中牽丸之
屬。均為要法。此症有性命之危。始則月事不行。繼則

形消骨立。若投前法。能够得大便似痢。不臭。下白物如麩。
之状。则為積寒凝瘀。出臍。慎勿心之。堅癖。消。則白物
自此十去八九。後以溫和之品調之。惟患甚多。愈者極少。
良以眩瞑之病。人之所畏。用之不專。信之不堅。每致因循。
坐悞。積習難返。深可嘆也。二曰立結。治亦有二。一為心肺
熱癰。素問曰。月事不來者。胞胎閉也。胞胎者。屬心而終
胞中。心火上行。氣上迫肺。不得下通。胞胎閉塞。月事不
來。癰見心立煩躁。舌尖作痛。小溲短赤。心胞終日烘炙。
治宜先降心火。輕則清心導赤。重則涼膈。潤心之類。
二為腸胃立癰。腸胃者。二陽也。腸胃素立。上薰心脾。



或病中。滯津液不生。為立所燂。經脉不行。夫經者。水
谷之精液也。精液既爛。生化多源。新者不生。舊者
為乾血。而經脉閉絕。瘀見大便閉。小便難。消渴。善
形肉消瘦。口氣齶。齒右閏洪大。治宜厚陽胃之法。
虛。脾強者。妙涼膈。調胃承氣之類。脾弱者。以三和湯。
玉燭散之類。據古東垣二氏。每用此法。以治婦人經閉。極
有見地。以一陽實症結立。固能此不除。即肉傷初起。膏
火。滯結。賜殊便閉者。亦可借此。曾聞至結。以立補
丸。丹地之物。之類收功。乃核商氏謂純用三和玉燭殊
未尽善。當從趙養葵。深水補肝之法。又贊綱目議。

全善之矣。為者見於張李二氏，頗有微辭。实則結不
開。則立經何生。若中用滋養。愈深愈固。其後愈
堅。其立愈甚。反增病勢。萬不及先用養血潤燥。房
火開結。以為當。吾於肉經二陽結。謂之消。三陽結。謂之
膈。二德。頗有心得。故知凜古東垣之論。曷有識之浩
為不謬也。三言疾阻。体未之质。多湿多痰。積疾下流
於胞門。占滿於血海。血少痰多。脂盈碍血。經為疾所碍
而不行。致陰經閉者。其体多肥白。勿認為陽虛。其時
多沉伏。勿指為血少。但觀其起居如常。并無倦怠。
多寒熱之象。多虚寒之形者。便是其候。當以行痰。

之刺。投之不必调经而经自通。所谓除病必求其本。是也。妄方。徒以平胃二陳湯加遠志。菖蒲。玉金散。而隨症加減。症至者。可用導痰陽。白朮丸。若閉塞日久。積痰生瘀者。首用渡陽加川芎以開痰結。費廉。次用丹溪氏治積痰生瘀症。脉二逆并矣。饮食少而經行不行。先以之物加萸附。作靈犀。次之。不效。繼以其起居多碍。乃歎為痰結。其經不行者。絕乎血也。為痰阻碍血。故經不行。其多血者。絕也。為痰虛也。結伏。故而不見。乃改用三花神佑丸。果經通而六脉俱出。此種症候。最難診治。苟不細心体会。一遇經閉。年

