

瘍醫大全目錄

卷七

論初起腫瘍

論內消法

癰疽腫瘍門主方

癰疽門丹散主方

癰疽門膏藥主方



南京中醫藥大學圖書館藏

瘍醫大全卷七

光華堂梓

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

壻錢之栢東陽

男 櫟燮用和

全校

論初起腫瘍

澄

曰初起腫瘍者乃癰疽惡毒始發壅腫七日之內

未成膿者目曰腫瘍施治之早儘可內消十之六

七縱不能全消亦可移深居淺轉重就輕但不可

驟用寒涼敷藥冰凝肌肉更勿輕投苦寒丸劑凝

滯氣血遏鬱毒氣便難消散若已八九朝內膿已

卷七 論初起 顧氏秘書



成治無消法若勉強消之不獨不能消散反致氣
血受虧根脚散漫內膿不能外泄膿汁清稀所以
消腫瘍之法貴乎早也



論內消法

王肯堂曰癰疽之證發無定處欲令內消於初起紅腫結聚之際施行氣活血解毒消腫之藥是也當審淺深大小經絡處所形脉虛實如發於腦背腰項醫膈者乃太陽經也宜黃連羌活背連脇處爲近少陽宜柴胡並宜敗毒散仙方活命飲形實脉實者宜漏蘆湯內疎黃連湯追毒丸疎利之氣虛者參耆爲主血虛者歸芎爲主佐以消毒之藥隨分野以引經藥行至病所六經分野上有癰疽其

五經各隨本經標本寒溫氣血多少以行補瀉惟
少陽一經雖曰氣多血少而氣血皆不足也治血
氣虛血虛同法凡瓜蒌射干穿山甲金銀花夏枯
草蟾酥連翹地丁鼠粘子木鱉子之類爲內消之
藥仙方活命飲內消丸柞木飲子牛膠飲子車
散返魂丹消毒飲爲內消之方衆皆知之殊不知
補瀉虛實平治寒溫使氣血各得其常則可內消
也其外用紫葛湯淋洗及用散塗膏貼者亦使氣
血和平而腫消熱退也

李東垣曰夫癰疽丹腫之生皆由陰陽不調榮衛凝滯氣血不流之所生也古人有言曰陽滯於陰則生瘡陰滯於陽則生疽瘡疽之生有內有外內生於臟腑胸腹之中外生於膚肉筋骨之表發無定處夫鬱滯之本則因氣血不流蒸氣不能外達留滯而成內熱瘡疽所生焉若初覺氣血鬱滯皮肉結聚腫而不潰時可疎滌風熱通利臟腑一二行後徐次用諸湯湯漬卽得內消矣不然則治之稍慢毒熱不散反攻其內致合膿血之聚也內經謂

治病必求於本蓋瘡疽本乎中熱之鬱結不通也
其風邪寒氣所聚也治之宜溫熱之劑和血令內
消也辨之有法須認風寒則腫硬色白熱毒則爛
腫色赤以爲異也如有氣已結聚不可用內消之
法宜用排膿托毒之藥此皆先後之次也

又曰消者滅也滅其形症也經曰諸痛痒瘡瘍皆屬
心火火者離卦也離者外陽而內陰內陰壅滯必
然外攻治當內消使絕其源而清其內不令外發
故云內消乃初起微覺之時卽以湯液丸散內服

外敷疎其源絕其毒卽時消散如形症已成不用此法也

程山齡曰內消者腫毒初起卽用藥消散也凡疔瘡疽發背對口疔毒其初起憎寒壯熱有似傷寒而痛偏着一處飲食如常者蓄積有膿也當初起時膿尙未成不過氣血乖違逆於肉裏耳外敷遠志膏或金黃如意散鐵箍散或貼普救萬全膏內服銀花甘草湯或內消散卽時消散若係疔瘡卽宜刺破或艾灸腫處上搽蟾酥餅貼以萬全膏內服



菊花甘草湯隨卽平伏菊花連根帶葉皆治疔瘡
之聖藥也其中亦有挾風寒而發者又宜先用劑
防散或芎芷香蘇飲冬月萬靈丹以散之隨服銀
花菊花等藥卽可內消務須及早下手不可遲滯
十法

癰疽腫瘍門主方

內消散 正宗

金銀花

知母

穿山甲

半

夏

大貝母

乳香 去油

天花粉

白芨

皂角針 各一錢

酒水全煎熱服取汗

搗加秋芙蓉葉二兩搗

敷患上留頂透氣

立消散

生地

龍膽草

柴胡



防風

荆芥穗

槐花

青木香

各等分

升麻

上部

牛膝

下部

酒水全煎熱服取汗輕可立消重者二劑

已成將潰禁服

銀花甘草湯

十法

一切惡毒肺癰初起立消誠外科捷法

鮮金銀花

五兩

甘草節

一兩

作一劑入砂銚內水二碗煎一半加無灰酒一

大碗畧煎數沸分作三服一日夜服完重者二



劑服至大小便利則藥力到矣如下部加牛膝
外用生金銀花搗爛敷四圍中留一孔透氣
沈內翰云金銀花乾者終不及鮮者力大而效
速

四妙湯

即神效托裏散
說約

此瘍科首用捷法功效立奏增減活法醫者臨

症酌用

生黃耆

五錢

大當歸

金銀花

各一兩

甘草節

二錢

水煎晝夜服盡自可移深居淺轉重作輕如已成氣血素虧不能穿潰者加白芷皂針山甲各二錢一伏時自潰如已潰後卽宜刪去皂針山甲如初起熨痛口渴加天花粉此治癰疽發背腸癰之神方也

澄

自幼及今數十年來凡治一切癰疽皆賴此方遇大症金銀花每加至六兩四兩黃芪加至兩許當歸加至二兩甘草節加至三錢但見瘡色不起膿水清稀卽加肉桂轉陰爲陽化毒成

膿如乳癰乳吹卽加蒲公英二兩立消百發百中

中萬穩萬當

大毒惡瘡初起卽消已成自潰

廣陳皮

二錢五分

白芷

當歸尾

乳香

去油

甘草節

沒藥

去油

天花粉

防風

川貝母

去心

赤芍

穿山甲

皂針

各一錢

連翹

肉桂

各八分

酒水全煎熱服取汗

忌犯鐵器

孕婦忌服



槐花酒 彭辛菴用此方三十年無不見效

初起大毒炊腫服之內消

槐花

四兩入砂鍋內炒黃乘熱入酒二碗煎十餘沸

瀉去渣熱服取汗如未消再服極效

活血調氣湯

專主消毒散瘀

荆芥

天花粉

防風

赤芍

陳皮

各一錢二分

甘草節 八分

川貝母

去心

金銀花

白芷

當歸尾 各二錢

水煎服

背上及冬月加 羌活

內熱及夏月加

消腫加

牛蒡子
穿山甲

痛甚加

小便澀加

木通

泄瀉加

消無名大毒

陳琉璃砥

炙黃存性

研極細輕者三錢重者五錢無灰酒冲服取汗

忌風



神授衛生湯

正宗

解毒消腫清熱活血止痛

白芷

天花粉

連翹

各六分

牛蒡子

荆芥

甘草節

各一錢

乳香

去油

沒藥

去油

防風

各五分

金銀花

三錢

當歸尾

川貝母

各一錢五分

水煎服

若大便秘結熱甚者加大黃

酒炒一二錢

芎芷香蘇散

十法

凡毒初起多有挾風寒而發者宜先用此藥

