

秋部

S 2942
3416

第六卷	見點門
第七卷	起脹門
第八卷	貫膿門
第九卷	收靨門
第十卷	落痂門
第十一卷	餘毒門

馮氏錦囊秘錄痘疹全集

共十五卷
訂四本

馮氏錦囊秘錄痘疹全集卷七 起脹門

男

乾元龍田

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

門人王崇志慎初今較

男

乾吉佑民

起脹諸論

夫痘子起發不可拘以日數。瘡出以漸其發亦以漸。謂之適中。若一齊湧出。卽皮肉虛腫。一齊厥發者。此表氣虛毒氣奔潰而出。表虛則不能收斂。必生癢痛潰爛矣。其治急宜救表爲主。若已出盡當起不起。此裡氣虛毒氣留伏壅。

起脹諸論

而不出必增煩躁腹滿喘促矣此又急宜救裡爲要然痘疹發於肌肉陽明胃經主之脾氣一溫胃氣特暢決無陷伏之患如痘人籠蒸之法但欲其鬆耳凡痘發起發之時磊落分布者乃表裡疏通上下發泄毒氣解散爲順痘也若顆粒叢聚根窠堅硬似瘤之紅而不痛似核之堅而不動似癰之腫而不潰者此氣血凝滯而不流肌肉敗壞而不化毒氣鬱積而不解爲逆痘也不出四五日必癢癢悶亂而死更有初出細密模糊不成窠粒至於起發盡成大泡清水虛癢者此乃衛氣不斂爲逆痘

也不出二三日。皮脫肉乾。悶亂而死。此皆惡毒之氣所致。須於出現起發之時候。之若到成膿。則無是病矣。凡痘之出。以氣血和平爲主。尖圓堅實者。氣也。血活明潤者。血也。紅活平陷者。血至而氣不足也。圓實而色淡者。氣至而血不足也。平塌灰白者。氣血俱不足也。焮腫紅綻。氣血俱有熱也。若痘至起發。則欲透而磊落。尖圓光壯肥澤者。上也。如根腳橫開。皮起水漲者。次也。如頂皮不起。根腳不開。猶是先出之形。不見新生之水者。此卽謂之起發不透。如氣本實者。此必曾感風寒。宜用發表。如氣本虛者。此

必不能飲食或兼吐利宜補中氣而兼托表若時日已多發猶不透是以煩躁不安啼叫惡熱者此毒熱在裡宜急鬆肌表托而兼解散熱毒導引心火可也若譫語而妄有見聞時發狂叫者此五臟熱毒蘊積而陽氣獨盛無陰氣以和之必大便秘不利宜微通之使裡無留滯而外得快利也甚至昏不知人腹脹喘呼者不治總之起發之時不徐不疾以漸長大尖圓磊落光壯堅實根腳紅活此氣充足載血而行透徹諸瘡自然尖圓光壯不須服藥如雖紅活頂平中陷不成尖圓色嫩皮薄不能堅厚其變爲癰塌爲

留○伏○壅○遏○乃○氣○虛○也○宜○用○補○氣○若○瘡○皮○薄○色○嬌○淫○淫○如○濕○
者○此○氣○不○勝○血○宜○補○氣○涼○血○如○浮○囊○虛○起○殼○中○無○水○者○此○
氣○不○依○血○血○不○附○氣○其○變○爲○癢○塌○爲○癰○腫○矣○宜○十○全○大○補○
湯○加○減○主○之○凡○由○紅○斑○而○水○泡○水○泡○而○膿○泡○膿○泡○而○結○痂○
有○自○然○之○序○者○吉○也○若○顛○倒○失○常○盡○由○氣○血○兩○虛○邪○火○冲○
擊○變○現○爲○害○及○初○起○發○瘡○頭○便○帶○白○漿○者○不○分○何○處○並○非○
佳○兆○不○特○口○唇○也○

三○日○四○日○痘○出○當○齊○點○至○足○心○勢○方○安○定○若○猶○有○陸○續○不○
出○之○狀○或○隱○隱○於○皮○膚○之○內○不○見○不○起○者○非○風○寒○壅○遏○之○

因必內虛不振之故。是以四日以前。痘毒方出身。表宜涼。四日以後。毒出已定。身表宜溫。涼則氣血和平。痘色必然潤澤。溫則腠理開通。其毒易以成漿。至此而身若不溫。雖未必至於冰伏。而痘瘡斷難易長。又若身熱不退。或身痛不止。或因風寒所迫。或因暑氣所併。而無二便秘塞煩喘之症者。是症在表。而不在裡。宜葛根透肌之藥。以發之。待其表和而痘出自順。但不可過汗。以喪其津滋。至四五日。際血泡已成。理當起脹。如果肥大而粗。根紅而頂光色白者。已具行漿之勢。若還赤色過頭。雖見嬌紅可愛。然延綿

六日必依然到頭空殼虛花皮薄而光亮如燈內含是水
頂尖而根腳不紅行漿弗實熱毒盛而不解則爲紫爲黑
墜而不起則爲陷爲塌滯而不榮則爲乾爲枯爲青爲灰
怯而不振則爲不快或爲停漿肉先腫脹而痘反不起漿
則滯而不行而已虛浮而痘反退縮毒則遏而不進身不
熱而痘不起已成冰硬之形赤色若還不變溫之可興氣
血弱而不振遂成不快之狀紅潤依然如舊補之可生紫
色乾枯只宜活血鬆肌切忌溫中帶補爲重爲滯烈藥雖
然可發透肌尤是良方瀉瀉惟宜溫補爲先久瀉佐以升

提爲要此驗痘之經常而用藥之大槩也

論黑陷血陷紫陷白陷灰陷及氣血虛實寒熱

氣陽也血陰也痘之一症非陽則不能以發其毒非陰則不能以化其毒故必得其陰陽交會氣和血順也有陽始會陰氣至血附根窠旣立而忽中陷者此因元氣不足而不能續其後來是以陰血雖有附氣之功而陽氣乃無制毒之力以致陷而不滿生生之道絕矣其陷有五一日黑陷二曰血陷三曰紫陷四曰白陷五曰灰陷黑陷者爲初出少稀後出加密陽會陰之次因陽氣弱而不能續其初

出之功血無氣故枯萎而黑陷也血陷者血盛於氣氣弱不能拘領其毒久則變而爲紫陷也紫陷者爲氣愈虛而血無氣蓄則毒之盛負載不前是以血亦爲之離去也白陷者爲氣不足其血亦弱久則變而爲灰陷也灰陷者氣血衰敗而不榮也此等之陷一皆氣之虧損使然如折奇花少生氣既絕則憔悴不榮矣故宜預爲早治凡見形平塌勢不起發摸不硬手兼或皮皺甚至頂陷其現症而爲吐瀉不食語言不主此皆氣之虛也卽宜保元如痘形飽滿輪郭豐厚其瘡堅硬或發壯熱或喘痰壅嗽此氣

之實也。治宜清肺和解。如鼻流清涕。咳嗽惡風。身體戰慄。自汗。瘡色慘白者。此氣之寒也。宜中和之。如鼻孔乾燥。皮毛枯槁。咳嗽。或鼻出血。瘡色焦紫者。此氣之熱也。治宜瀉肺。如瘡不紅活。淡白發癢。不能貫漿。以手摸過色。即轉白者。此血之虛也。如身熱不除。或寒熱往來。瘡色焦紫。口苦舌乾。唇青面赤。脇肚作痛者。此血之實也。如瘡色灰慘。血凝不活。面青筋縮。嘔吐清水。瀉稀水如青菜色者。此血之寒也。若瘡色黑。發癢。眼珠紅赤。大便堅燥。身熱易怒。此血之熱也。虛者補之。熱者清之。寒者溫之。實者抑

使氣血無過不及但保元陽冲和之氣
之功何慮五疔之患哉

論痛

凡痘疹起發痛者其症有數一則毒邪欲出氣血隨之是以肌肉繃急而痛者宜用活血散一則皮厚痘密又為外寒相搏而痛者宜用葛根湯若熱毒甚者宜用消毒散若食雞魚酒物者宜用清胃散若發熱飲冷大便秘結而脾胃實熱者宜四物連翹之類若發熱飲冷大便秘結而脾胃實熱者是可清胃潤燥若發熱作渴飲湯而屬脾胃虛熱者又宜

白朮散投之。六日已前多用發散。六日已後多用活血。因
乾滯而痛者。以水楊湯浴之。若醫時痛甚。治之不愈者。凶。
然大抵身前面痛者屬肺。身後痛者屬膀胱。身側痛者屬膽。
四肢痛者屬胃。總宜急止。否則傷氣。忍痛傷血。而多
變症矣。故痘瘡不可過食毒物者此耳。若至結靨乾硬而
痛者。外宜塗酥以潤。內服清涼解毒可也。

起脹三朝順逆險 碎錦

順症勿治

凡發痘三日當逐漸起脹。先出先起。後出後起。痘胖一分。

則毒出一分痘胖已盡則毒出亦完根窠紅綻頂肥碍手
面目漸腫飲食二便如常而無他症者吉此是氣盛血榮
於內發揚於外毒已受制自當化毒成漿不治自愈一
凡痘瘡自初至結靨竝宜痘內暗晦其外光潤所謂外陽
內陰少陰君火之象反此爲凶若內外皆光爲純陽無陰
治當補血內外皆暗爲純陰無陽治當補氣一凡痘瘡
之毒必氣以煦之血以濡之而後可得成熟也故於起發
之時光壯者氣有餘也肥澤者血有餘也氣血有餘表裡
俱和不須服藥一痘至起脹其痘頂必有小凹名爲痘

眼若根脚散大、漿色淺白、頂無痘、眼者、此爲水痘。

險症當治

一痘雖起發、乾枯無水、謂之不肥、澤帶着紫黯色、謂之不紅、活其變爲黑陷、乃血虛也、宜內用四物加減、外用胭脂塗法。一形長大而色枯燥者、此氣至而血不榮也、治宜補血色紅潤而形平塌者、此血至而氣不充也、治宜補氣。形平塌色枯萎者、此氣血俱不足也、治宜大補氣血。色灰白者、氣虛也、紅紫起發者、血熱也、紅紫退縮者、血滯也。一痘頂陷不起、若年壽之上痘起者、不必憂慮、如年壽上

亦不起者急與內托及痘當起脹而天庭印堂不起者亦
宜內托爲主否則漸變不治一痘雖紅鮮但乾燥而不
充肥者此火盛而血不足也治宜退火涼血爲主一痘
充肥而帶濕者此脾中有濕而氣不足也治宜去濕補氣
兼風藥以勝之但不可太過太早以損釀漿濕潤之氣
一浮裏虛起而殼中無甚漿水者此氣不拘血血不附氣
必後發癰腫甚則癢塌而死宜參耆芍歸之類加桂王之
使氣血交會方能化毒成漿一有因諸獸驚嚇而痘隨
伏色變者是心失其主而血不能歸附氣不能充托耳宜

用托裡之劑內加入參遠志之類。一痘正脹之時痘雖起發然皮薄不碍手按之清水便出而痘色不暗者此爲假脹宜急參朮耆草姜桂之類提氣貫膿方可成就否則十一二日必不能回漿結靨而死。一痘因觸以致痘陷如石白硬者則以芎歸殭蠶參耆姜桂之類主之。一痘漸平塌頭面漸腫者治宜急用角刺穿山甲殭蠶之類透托爲主否則散漫無拘肉腫痘不腫矣。一痘紫陷不起或痘黑如疥者此血分大熱急用丹皮紅花紫草當歸升麻燒人屎之類外則挑去惡血可也。一凡憂齒噤牙者