

午 31

64

竹林寺
外科要旨

咸豐壬子新鐫

竹林寺女科要旨

光緒丙申桂月
石
五峰氏謹鈔

此書出自安徽竹村寺安寂禪師函友
人江鈔試之廣致微良方也嘗見人家
婦少偶染一病即張皇失措求之
其策甚乏誤投厚資其病不除
屈何者家置一帙照症用方不效
西平安耶然則在書行在即所以
濟用扶危之良方也

雨菴神效

竹林寺女科秘方

婦人之症一百有十三

治法七十有二

第壹症

自月經前論其症血來如胆水五心作熱腰痛並小腹痛面色黃瘦不思飲食乃血氣虛也先用黃苓散次用調經丸黃苓散者先退其五心煩熱也煩熱退再投以調經丸則次月自然血勝而愈矣

黃苓散

黃苓六分 川芎八分 當歸一分 白芍二分 蒼朮一分

炙草三分 知母七分 水煎溫服

調經丸

三稜 義朮 當歸 白芍 生地

熟地各一分

元胡

黃芩各二兩 川芎

小茴各一分

烏藥八分

砂仁五分

香附一兩二分

米糊為丸每服三分老酒送下

第二症

月經後論其症血來如漏水頭昏目暗小腹作痛更兼白帶咽中臭如魚腥惡心吐逆先用理經四物湯後用內補當歸丸次月即愈

理經四物湯

當歸

川芎

生地

柴胡

白朮

香附

元胡各一分

白芍

黃芩

三稜各八分

內補當歸丸

當歸

續斷

白芷

阿膠

厚朴

白茯苓

肉蓯蓉

蒲黃炒黑

萸肉各二兩 川芎八分

熟地一兩五分

炙草 乾姜各五分 製附子三錢

煉蜜為丸每服八丸空心酒下

第三症

月經或前或後論其症因脾土不勝不思飲食
由此血衰經水或前或後不用理血只須調脾
以紫金丸服之脾土勝氣血旺自然應期

紫金丸

陳皮

良姜

莪朮各八分

檳榔

砂仁

紅豆

各一分

枳壳

烏藥各八分

三稜兩

飯後用米湯下百丸

第四症

血虛發熱論其症因婦人性急或行經時房
事觸傷腰中結一塊如鷄子大左右兩肋痛月
水不行五心煩熱頭昏目眩咳嗽生痰先用逍

遙散止其熱次用紫苑湯止其嗽若半年一年

失醫肉瘦泄瀉百死無生

逍遙散加減當歸炒 白朮炒 白芍 柴胡 花粉各八分

黃芩六分 地骨皮一分 石蓮肉一分 薄荷四分

胆草五分

紫苑湯

杏仁去皮尖
一分五分

水煎卧時或空心服

紫苑湯

杏仁去皮尖
一分五分

阿膠八兩炒研
冲服

桑白皮蜜炙
一分

五味子

五分

知母炒一分

貝母八分
去心

款冬花

六分

紫苑花

桔梗

蘇子各八分

枳實一分

水煎臨卧服

第五症

經閉發熱論其症或行經時或產後多吃生冷并
水果等物蓋血見水則凝滯故也初起二三日生
寒作熱五心煩燥若脾土一勝自然經血流行
萬無一失倘半年不治變作骨蒸子午面熱肌
膚消瘦泄瀉不止百無一生急宜治之如病重者
用鴉片一二厘甘草湯服有起死回生之力亦用
逍遙散紫苑湯服之

第六症

行經血氣作痛論其症經來一半血未曾盡腹
中作痛發熱須用紅花散破其血熱心痛安

紅花散

枳壳六分

紅花一分

牛膝

當歸

蘇木各一分

赤芍

三錢

義朮各八分 川芎五分

水煎空心服

第七症

經來一月半月不止乃血妄流行當審此婦曾

吃熱物椒姜過度否是為熱症須用金狗散

金狗散

續斷

阿膠炒

地榆

當歸各一

白芍八分

黃苓

金毛狗杞各一

川芎

白芷各八分 熟地二分

水煎空心服

第八症

經來如綠水全無血色乃大虛大寒不可用涼藥

要用烏雞丸服半年不但愈病兼能恆孕

烏雞丸

天雄

附子各三

鹿茸二兩 山藥

肉蓯蓉

蒲黃炒黑肉桂

當歸

山萸肉

白芍各兩

烏雞肉

去皮油酒
蒸三兩

熟地一兩
五分

川芎八分

糊米為丸空心黃酒下百丸

第九症此症人虛經來如黃水不可太涼務煖經血次月血勝而愈須用加味四物湯則病自愈矣

加味四物湯

當歸

川芎

烏藥

元胡各一分

白芍八分

小茴八分熟地二分

引用姜三片棗二枚水煎空心服

補載

經水將來肚中渾痛乃氣血俱實也宜用清熱

調血湯飲之自無不效者

清熱調血湯

當歸

川芎

白芍

生地

香附

黃連

莪朮

元胡

丹皮各七分

水煎服

第十症

經來全白色無血色五心煩熱小便作痛面色青黃乃血氣虛弱宜用烏雞丸服半月次月必孕方詳第八症

十一症

經來成塊如蔥白色又如死猪血黑色頭昏目眩唇麻此虛症也不可服涼藥急用內補當歸丸方詳第二症

十二症

經來臭如夏月之腐此乃血弱更兼吃熱物譬

如溝渠水涸天時無雨久則臭也身衰舊血新血不接則臭宜用龍骨丸又服湯藥則安矣

龍骨丸

龍骨

鰓鱗

牡蠣

生地各一斤

當歸

川芎

白芍

茯苓各八分黃芩六分

合為丸空心酒下百丸

湯藥方

當歸

三稜

莪朮

赤芍

丹皮

白朮

香附各八分

陳皮

桑苓

木通各七分

生姜一片水煎服

十三症

經來不止如魚腦雙足痛疼不能動履乃下元

虛冷更兼風邪所攻宜活血順氣須用疎風

止痛散

疎風止痛散

當歸

天麻

姜蚕

烏药

牛膝

獨活

石南藤

乳香

紫金花

骨碎補

各一兩

川芎五分

姜三片葱白三根黃酒煎服

十四症

經來牛膜片此症經來不止兼下膜色一般昏

迷倒地乃血氣變而成雖驚無事宜用硃砂

丸服之立效

硃砂丸

硃砂一兩茯苓一兩

研末水合為丸姜湯下五十丸

十五症

經來下血胞經水不止或下血胞三四個如卵大綿軟如絮刀割開內如石榴子其婦昏迷不知人事雖驚不妨宜用十全大補湯

十全大補湯

當歸一分 白朮一分 人參 川芎 白芍

茯苓各八分 生地 黃芪各二分 炙草六分 肉桂一分

十六症

姜一片東三枚水煎空心服立效

十六症

經來小腹痛如刀割此乃血悶皆用八珍丸無效宜用牛膝湯一劑有效

牛膝湯

土牛膝三分 乳香一分 麝香一分 水一鐘半煎牛膝又

一鐘磨乳香麝香入內空心服如係火症可用

硃砂六一散

十七症

經來吊陰痛不可忍此症筋两条從陰中吊起
玉乳上疼痛身上發熱宜用川練湯

川練湯

川練子

猪苓

澤瀉

白朮

小茴

烏藥

元胡

乳香各二分

木香五分

麻黃六分

檳榔八分

引用姜三片葱一莖水煎對酒服大
發汗二劑即愈

十八症

經來未盡潮熱氣痛此症經來一半又口渴小
腹痛此因傷食生冷血滯不行有餘血在內不可
用補藥只宜用涼藥熱去經盡痛止宜用義術散

莪朮散 莪朮

三棱

紅花

牛膝

蘇子各二斤

水煎空心服

十九症 經來已盡作痛此症手足麻痺乃腹中虛冷氣

血甚衰宜用人參四物湯

人參四物湯

人參

歸身

白芍

川芎各一斤

姜一片束三枚煎服

二十症

經來小腹結成一块如皂角一条橫逆痛不可忍

不思飲食面色青黃急宜用元胡散

元胡散

元胡

四斤 髮灰三斤

共為末黃酒調服半月其块自消

二十一症 經來氣痛脇內一塊如盃大其血淡黃色宜治

塊為先須用四物元胡湯

四物元胡湯

當歸

川芎

白芍各八分元胡一分

熟地五分

姜三片黃酒煎服加沉香三分沖服

二十二症

經來遍身疼痛乃寒邪入骨或熱或不熱宜解

表須用烏藥順氣湯

烏藥順氣湯

烏藥

疆蝨

白芷

陳皮各分炙草五分

麻黃去節四分

姜三片葱一莖水煎服發汗即愈

二十三症

能經傷寒經來忽能候食生冷過