

癆醫大全目錄

卷二十一

內癰部

內癰門主論

心癰門主論

附方

肝癰門主論

附方

脾疽門主論

肺癰肺痿門主論

附方

腎癰門主論



164
北京中医药大学图书馆藏

瘍醫大全

胃癰門主論

大腸癰門主論

小腸癰門主論 附方

三焦疽門主論

痞積癰疽門主論 附方



南京中醫藥大學圖書館藏

傷醫大全卷二十一

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東陽

男

櫟燮用和

全校

內癰部

白五臟六腑內癰內疽癰疽疔瘡止皆彙於此部中

以便閱檢泰治

傷醫大全

卷二十一

內癰部

一

顧氏秘書



清华大学图书馆藏

內癰門主論

凡人胸腹有十一募募者各臟腑陰會之所也靈樞
云發內癰內疽者其本經募上肉必浮腫募中必
時時隱痛浮腫爲癰隱痛爲疽此卽內癰內疽之
驗也但內癰有治法而內疽無治法何也蓋內癰
內疽其病原無殊惟在根淺根深之別耳根淺者
爲癰根深者爲疽若臨症用藥攻補得宜無不收
效至募有十一而內癰僅九證者何也蓋膽府形
如膜皮無出無納汁清氣潔不生內癰內疽若夫

膀胱亦如膜皮中惟濁水故古今書籍並無講吸
內癰內疽者是以未敢詳載雖然中極穴卽膀胱
募也今人間有中極穴或浮腫或隱痛者所見證
候竟同小腸癰相似則治法亦當按小腸癰治之
可也俟後之學者留意焉

驗內癰法 凡遇生內癰疑似者但與生黃豆五粒
令病人嚙之口中無荳腥味者是其候也

書云凡內癰俱係膜內成患外皮不腐

齊氏曰臍腑腸胃內癰內疽其疾隱而深藏目旣不

見手不能近所至難矣但以診脉辨之亦可知也

若其脉洪數者膿已成也設脉遲緊雖膿未就已

有瘀血也宜急治之不爾則邪氣內攻腐爛腸胃

不可救也



心癰門主論

經曰巨闕隱隱痛者心疽其上肉微起者心癰

鳩尾下一寸
心之募也

王肯堂曰心癰始發巨闕穴必隱痛微腫令人寒熱
身痛頭面色赤口渴隨飲隨乾由心火熾盛更兼
癰飲嗜熱而成宜服涼血飲如酒毒爲病宜升麻
葛根湯治之但此證甚屬罕有而治法不可不脩



王肯堂曰心經之發為胸穴心經之發為胸穴

心火熾盛
則氣不下

孫曰三關關則氣滯心火其土肉瘡敗者心火熾盛

心火熾盛

心癰門主方

涼血飲

生地

麥門冬

連翹

天花粉

木通

赤芍

荆芥

車前子

瞿麥

白芷

甘草

薄荷

山梔

各等分

白燈心爲引

潮熱加

淡竹葉

升麻葛根湯



升麻

柴胡

黃芩

白芍

葛根

木通

山梔

黃連

甘草

水煎服

甘草

甘草

天麻

車前子

麥冬

天麻

木通

木通

生薑

麥門冬

麥門冬

生薑

麥門冬

麥門冬

心藏門主



肝癰門主論

經曰期門隱隱痛者肝疽其上肉微起者肝癰

名肝募在乳傍一寸半再直上一寸半

素問曰肝癰兩肱滿卧則驚不得小便

華真君曰肝癰不可用針刺須用內消內散

秘錄

陳遠公曰人素多惱怒容易動氣一旦兩脇脹滿發

寒發熱已而脇疼之至按之疼不可忍人以爲肝

火盛也誰知肝葉生瘡乎人但知肺生癰不知肝

亦能生癰也且靈素諸書亦未詳言得毋創論以

驚俗乎余聞異人云脇疼手不可按者肝葉生癰也靈素未詳者以肝癰世不常有所以畧之也凡古今之氣運不同癰毒之生長不一肝能生癰為可缺而不論乎况肝之生癰未嘗無理也肝一惱怒則葉開張肝氣卽逆大怒之後肝葉空脹未易平復設使時加惱怒是肝葉竟不得安且怒後必然動火怒益多而火益盛盛必燥乾肝血血乾則肝氣大燥無血養肝更易發怒欲不鬱結成癰烏可得乎然癰生於內何從而見然外可辨也肝癰

生在左而不在右左脇之皮必見紅紫之色而舌
必見青色也此而辨之斷斷無差治必以平肝爲
主佐以瀉火去毒萬不可因循令其潰爛而不可
救也化肝消毒湯白芍當歸各三兩金銀花五兩
黑山梔五錢生甘草三錢水煎三劑疼止又減半

服數服全愈

冰鑑

此方以歸芍入肝以滋肝血則肝血驟生易平肝
血之燥又得甘草緩急梔子清火銀花解毒安得
不效哉惟是火毒大盛肝血大虧不如此大劑亦
自徒然倘執以肝火之旺非肝癰之症只用當芍
治脇痛必不效也

又曰有左脇大痛按之尤甚此肝癰耳非脇痛也驟
癰多得之惱怒前條已論之矣然而憂鬱亦能生
癰也惟惱怒得者其痛驟憂鬱得者其痛緩初痛
之時逍遙散大劑煎飲痛立止矣何至成癰也因
失於速治而肝中鬱氣苦不能宣而血因之結矣
血結不通遂化膿而成癰其勢似緩然肝性最急
癰成而毒發甚驟也有脇疼數日而死者正因生
癰毒敗而死非脇痛能死也可不急爲治之乎宣
鬱化毒湯柴胡薄荷香附各二錢白芍當歸金銀

花各一兩生甘草天花粉各三錢陳皮枳殼各一錢水煎服四劑全愈重則六劑後用四物湯大劑調治不再發也此症世不常有前論已悉然肝癰少見而脇痛世所常有余特發明憂鬱之能成癰又如此人知急治何至成癰哉

朱丹溪曰肝癰始發期門穴必隱痛微腫令人兩腳脹滿脇痛側卧則驚便溺艱難由憤鬱氣逆而成初服復元通氣散次服柴胡清肝湯痛脹已止宜六味地黃丸脾虛食少佐以八珍湯滋腎補脾治

之

肝癰門主方

救肝敗毒至聖丹

岐天師

治肝癰

當歸

白芍

各三兩

黑山梔

生甘草

錢各三

金銀花

十兩水十碗煎汁四碗聽用

以金銀花汁二碗加水二碗全煎服搗又加水

二碗全前存金銀花汁二碗煎一碗服一劑愈



脾疽門主論

經曰章門隱隱痛者脾疽其土肉微起者脾

章門

名脾募在臍旁開六寸高上二寸

王肯堂曰脾癰始發章門穴必隱痛微腫由過飧生
冷兼濕熱或瘀血鬱滯脾經而成令人腹脹咽噤
乾燥小水短澁宜大黃湯赤豆以仁湯二方合而
用之腹脹全消宜六君子扶脾調理



中醫學大學圖書館