

湯頭歌訣下

經絡歌訣

續增日食藥物

收瀉之劑

殺蟲之劑

明目之劑

癰瘍之劑

經產之劑

調經之劑

急救良方

渭珍氏

本草醫方合編

卷陸



腋音亦左右時間也

臍音如嫩要說

肘音肘節也

頸音歌項也

頰音夾耳下腮傍

頤音通鼻梁

環音還圍繞也又玉一循一

俠音挾任一傍也差也

頤音夷

頤音寒一頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤

跗音夫足背

呻音申一吟痛聲

胛音干足胛骨又音幹

踝音華上聲

腕音腕

腋音腋

腋音腋

胛音夾此目

眦音眦

頤音頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤

臀音又腰底也

脛音脛

頤音頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤

眦音眦

眦音眦

頤音頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤

瘡音瘡

瘡音瘡

頤音頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤

頤音頤



利濕之劑 十三首附方八

五苓散 仲景治太陽府 太陽經熱傳入 白朮

澤瀉猪茯苓 膀胱化氣添官桂利便消

暑煩渴清 猪苓茯苓白朮炒各十八銖

三錢。二苓甘淡利水。澤瀉甘鹹瀉水。

能入肺腎而通膀胱導水以泄火邪。加

白朮者補土所以制水。加官桂者氣化

乃能出也。經曰膀胱者州都之官津液

藏焉氣化則能出矣。除桂名為四苓散無寒但渴

服之靈。濕勝則氣不能施化。故猪苓湯

醫方集解卷之六

收瀉之劑 滑則氣脫脫則散而不收必有酸瀉之藥

汗出亡陽精滑不禁泄痢不止大便不固小便自遺

久嗽亡津此氣脫也。若亡血不已崩中暴下諸大吐

衄此血脫也。十劑曰瀉可去脫。牡蠣龍骨之屬是也。

氣脫兼以氣藥血脫兼以血藥亦兼氣藥氣者帥也

陽脫者見鬼陰脫者目盲此神脫也。當補陽助陰非瀉劑所能收也。

赤石脂禹餘糧湯 治傷寒服湯藥下利不止心下痞

鞭服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之

利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯

利小水所以

實大腸也

別清濁

復利不止者當利其小便

赤石脂禹餘糧

等分杵碎煎

下焦主分

利小水所以

實大腸也

別清濁

膠以存津液。此為利濕兼瀉熱疸黃。小便閉。

渴嘔。五苓治濕勝。猪苓兼熱勝。

小半夏加茯苓湯。仲行水散痞有生薑。夏

一升。茯苓三兩。生薑半斤。除茯苓。名小半夏湯。加桂除夏治悸。

厥。茯苓甘草湯。名彰。夏名茯苓甘草湯。仲景治傷寒水氣乘心。厥而心下悸者。

先治其水。却治其厥。火因水而下。行則悸眩止。而痞滿消矣。

腎着湯。金匱內用乾薑。茯苓甘草白朮。襄傷

濕身痛與腰冷。亦名甘薑苓朮湯。乾薑

芍藥各四兩。甘草炙。白朮炒。各二兩。數

藥行水補土。此濕邪在經。而未入府藏。

此手陽明藥也。瀉可去脫。重可達下。石脂餘糧之瀉。

止脫重以固下。甘以益氣。李先知曰。下焦有病。難會。須用餘糧赤石脂。

桃花湯。仲景治少陰病二三日。至四五日。腹痛。下利不止。便膿血者。成氏曰。陽明下利。便膿血者。協熱也。少陰下利。腹痛。便膿血者。下焦不約而裏寒也。凡下利。便膿血者。身涼脉小者。易治。身熱脉大者。難治。

赤石脂一斤。乾薑兩。粳米一升。

此足少陰藥也。李時珍曰。赤石脂之重。瀉入下焦血分。而固脫。乾薑之辛溫。煖下焦氣分。而補虛。粳米之甘溫。

佐石脂。乾薑而潤腸胃也。朱丹溪曰。桃花湯主下焦血虛且寒。非乾薑之溫。石脂之重瀉。不能止血。用粳米之甘。以引八腸胃。準繩曰。便膿血熱勢下流也。成氏釋為裏寒。非也。桃花湯雖用乾薑。

血熱勢下流也。成氏釋為裏寒。非也。桃花湯雖用乾薑。

血熱勢下流也。成氏釋為裏寒。非也。桃花湯雖用乾薑。

血熱勢下流也。成氏釋為裏寒。非也。桃花湯雖用乾薑。

血熱勢下流也。成氏釋為裏寒。非也。桃花湯雖用乾薑。



者黃耆防己湯金除薑朮甘薑棗共

煎。嘗此治風水與諸濕身重汗出服之

良黃耆防己各一兩白朮七錢半甘草

炙五錢加薑棗煎。防己大辛苦寒

通行十二經開竅行水黃耆生用達表

白朮燥濕強脾並能止汗加甘草者益

土所以制水又以緩

防己之峻急也

舟車丸河牽牛及大黃遂戟芫花又木香

青皮橘皮加輕粉燥實陽水却相留口

面赤氣粗便閉而腫脹者為陽水黑牽

牛四兩炒大黃二兩酒浸甘遂麵裹煨

芫花醋炒大戟麵裹煨青皮炒橘紅各

一兩木香五錢輕粉一錢水丸。牽牛

大黃遂戟芫花行水屬藥木香青陳以

行氣少加輕粉以透經絡然非實症不

方

然分兩最微石脂粳米居多以調正氣瀉滑脫佐以乾
薑用辛以散之之義謂便膿血皆傳經之熱邪也吳鶴
臯曰少陰腎水主禁固二便為火所灼尅伐大陽與金
故下利膿血石脂寒能勝熱瀉可收脫用乾薑者服其
辛熱以從治用粳米者恐石脂性寒損胃也聊攝之開
而猶昧此況其下乎程郊倩曰此症終是火衰不能生
土未可指為傳經之熱邪也不知此而漫云滲泄腎防
一徹前後泄利而陽神陷矣昂按成氏生于千載之後
而能昌明仲景之書使後學有所循入其功非小奈何
後起之士動輒非之成氏之死已心安能起而辨其是
非乎如此症成氏以為寒而王肯堂吳鶴臯皆以為熱
竊謂便膿血者固多屬熱然豈無下焦虛寒腸胃不固
而亦便膿血者乎若以此為傳經熱邪仲景當用寒劑
以徹其熱而反用石脂固瀉之藥使熱閉于內而不得
泄豈非關門養盜自貽伊戚也耶觀仲景之治協熱利
如甘草瀉心生薑瀉心白頭翁等湯皆用芩連黃柏而
治下焦虛寒下利者用赤石脂禹餘糧湯比類以觀斯
可見矣此症乃因虛以見寒非大寒者故不必用熱藥
惟用甘辛溫之劑以鎮固之耳本草言石脂性溫能益
氣調中固下未聞寒能損胃也若準繩則執凡傳經者

可輕投。

疏鑿飲

檳榔及商陸。芩皮大腹同椒目。赤

豆。芫花。瀉木通。煎。薑皮。陽水服。商陸

茯苓皮。大腹皮。椒目。赤小豆。秦艽。芫花。活

澤瀉。木通等分。加薑皮。棗煎。芫花散

濕上升。通瀉瀉濕下降。芩腹薑皮行水

于皮膚。椒豆商。檳。攻水于腹裏。亦上下

表裏分

消之意

實脾

飲嚴氏

苓朮與木瓜。甘草木香。大腹加

草。蔻附。薑兼厚朴。虛寒陰水。效甚誇。便

不渴而腫脹者。為陰水。茯苓白朮土炒。

木瓜甘草木香。大腹皮。草豆蔻。附子

炮。黑薑厚朴炒。加薑棗煎。脾土虛補以

苓朮甘草。脾寒溫以蔻附黑薑。脾濕利

皆屬熱邪一語。遂以為熱耳。程郊倩每以直中為寒邪。傳經為熱邪。古今相傳二語。覺未盡然。不為無見。多見其不知量也矣。

訶子散

東垣

治虛寒泄瀉。米穀不化。腸鳴腹痛。

膿血日夜無度。

御米殼

去蒂蜜炒五分

訶子

煨去核七分

乾薑

炮六分

橘紅

五分

右末

空心服

此手足陽明藥也。御米殼酸澁。微寒固腎。膏腸。訶子酸

澁苦溫。收脫住瀉。炮薑辛熱。能逐冷補陽。陳皮辛溫。能

升陽調氣。以固氣脫。亦可收形脫也。泄瀉為氣脫。脫肛為形脫。

河間訶子散

一兩半生半煨

木香

五錢

甘草

二錢

黃連

三錢為末



以茯苓大腹脾滯導以厚朴木香又土之不足由于木之有餘木瓜木香皆能平肝瀉木使木不尅土而脾和則土能制水而脾實矣經曰濕勝則地泥實土正所以制水也

五皮飲澹用五般皮陳茯苓桑大腹皮陳

茯苓皮薑皮桑白皮大腹皮或用五加皮易桑白脾

虛虛脹此方司脾不能為胃行其津液故水腫半身以上宜汗

半身以下宜利小便此方于瀉水之中仍寓調補之意皆用皮者水溢皮膚以皮行皮也

羌活勝濕湯局羌獨芎甘蔓葉本與防風

濕氣在表頭腰重痛發汗升陽有異功

每服二錢用白朮芍藥湯調下治瀉久腹痛漸已瀉下

漸少以此止之如不止加厚朴一兩竭其餘邪木香黃連

行氣清火止痢厚腸甘草芍藥甘草湯也甘經酸收和

中止痛加訶子瀉以收脫加白朮補以強脾厚和除濕

散滿平胃調中故更藉之以去餘邪也真人養藏湯市治瀉痢日久赤白已盡虛寒脫肛大

腸之使大腸受熱受寒皆能脫肛大腸者傳導之官

腎者強作之官酒色過度則腎虛而泄母氣肺因以虛

大腸氣無所主故脫肛小兒血氣未壯老人血氣已衰皆易脫肛亦治下痢赤白臍腹

疼痛日夜無度

罌粟殼去蒂蜜炙訶子麵裹煨一兩二錢肉豆蔻麵裹煨一兩二錢木香

二兩肉桂八錢白朮炒當歸六錢白芍炒一兩生甘



風能勝濕升能降氣升則水自降不與行水滲

濕同濕氣在表宜汗又風能勝濕故用風藥上升使濕從汗散羌活獨活

各一錢川芎甘草炙藁本防風各五分蔓荊子三分如有寒濕加附子防已

若除獨活芎蔓草除濕湯升麻蒼朮充

除獨活川芎蔓荊甘草升麻蒼朮名羌活除濕湯治風濕身痛

大橘皮湯治濕熱五苓六一二方綴陳皮

木香檳榔增能消水腫及瀉泄用五苓散赤茯苓

苓一錢猪苓澤瀉白朮桂各五分用六一散滑石六錢甘草一錢加陳皮錢半

木香檳榔各三分每服五錢加薑煎○

瀉二散皆行水瀉熱之藥加檳榔峻下陳皮木香理氣以利小便而實大便也

草一兩八錢

每服四錢藏寒甚加附子一方無當歸

此手足陽明藥也脫肛由于虛寒故用參朮甘草以補

其虛肉桂肉蔻以祛其寒木香溫以調氣當歸潤以和

血芍藥酸以收斂訶子罌殼則澀以止脫也此虛寒脫肛之劑宜

大補元氣或加芎歸調血及升柴以升提之又有氣熱血熱而肛反挺出者宜用芩連槐栢或四物加升麻柴

胡素芫防風之類

附丹溪脫肛方人參黃耆當歸川芎升麻此治氣血兩虛而脫肛者

當歸六黃湯治陰虛有火盜汗發熱心之所藏在內者為血發于外者為

汗汗乃心之液也五藏六腑表裏之陽皆心主之以行其變化隨其陽氣所在之處而生津亦隨其火擾所在



水腫亦濕熱為病故皆治之

茵陳蒿湯

仲景

治疸黃陰陽寒熱細推詳陽

黃大黃梔子

入痰熱在裏口渴便閉身如橘色脉沉實者為陽

黃茵陳六兩。大黃二兩。酒浸梔子十四枚。○茵陳發汗利水能泄太陰陽明之

濕熱。梔子導濕熱出小便。陰黃附子與乾

薑。以茵陳為主。如寒濕陰黃色暗便溏者。除梔子大黃加乾薑附子以燥濕

散。亦有不用茵陳者。仲景栝皮梔子湯。

黃栝二兩。梔子十五枚。甘草一兩。按陽

黃胃有痰熱者宜下之。如發熱者則勢

外出而不內。不必汗下。惟用梔子黃

栝清熱利濕以解和之。若小便利色白無熱者。仲景作虛勞治用。小建中湯。

之處泄而為汗。是汗盡由心出。如醒而出汗曰自汗。屬陽虛。睡而出汗曰盜汗。屬陰虛。汗者心之陽。寢者心之陰。陰虛睡熱。衛外之陽乘虛而入。陰中表液失其固衛。故戰戰然汗出。覺則陽氣復而汗止矣。因熱和乘陰虛而出者。汗必熱。因寒邪乘陽虛而出者。汗必冷。有火者謂有面赤。口乾唇燥。便赤。音重。脉數諸症。○凡傷風傷濕。中暑。風溫。柔痙。氣虛。血虛。脾虛。胃熱。亡陽。痰飲。驚悸。勞役。房室。癰瘍。產後等症。皆能令人出汗。經又云。飲食飽甚。汗出于胃。驚而奪精。汗出于心。持重遠行。汗出于腎。疾走恐懼。汗出于肝。搖體勞苦。汗出于脾。凡頭汗左顛。屬肝。右顛。屬肺。鼻屬脾。頤屬腎。額屬心。津液自胃府湧達于外。為手足汗。有胃熱胃寒二症。自汗亦有屬實者。故外感初症多自汗。

當歸

生地黃

熟地黃

黃芩

黃栝

黃連等黃

當倍

此手足少陰藥也。盜汗由于陰虛。當歸二地所以滋陰。

八正散局

木通與車前。扁蓄大黃滑石研。

甘草稍瞿麥兼梔子煎加燈草痛淋蠲。

一方有木香。治濕熱下注。口渴咽乾。淋痛。尿血。小腹急滿。木通燈草瞿麥降心火。入小腸。車前清肝火。入膀胱。梔子瀉三焦鬱火。大黃滑石瀉火利水之捷藥。扁蓄利便通淋。草稍入莖止痛。雖治下焦。而不專于治下。必三焦通利。水乃下行也。

草解分清飲

石菖蒲。草稍烏藥益智俱。

甘草稍減半。餘藥等分。

或益茯苓鹽煎服。

少許通。

心固腎濁精馬。遺精白濁。車前能泄厥陰陽明濕熱。去濁分。

清。烏藥疏通氣而止便數。益智固脾腎。而開鬱結。石菖蒲開九竅而通心。甘草。

汗由火擾黃芩栢連所以瀉火。濕熱無熱不作汗。濕得汗熱蒸則令人出汗。

由腠理不固倍用黃耆所以固表。

李時珍曰。當歸黃耆湯加麻黃根。治盜汗。

其捷。蓋其性能行周身肌表。引諸藥至衛分。而固腠理也。按此盜汗與傷寒盜汗不同。傷寒盜汗邪在表。裏故以和表為主。古法小柴胡加桂主之。此屬陰虛。以補陰為主。李士材曰。陰虛則元氣有降而無升。復用此苦寒肅殺之劑。得毋犯虛虛之戒乎。惟火實氣强者宜之。不然苦寒損胃。禍彌深耳。○準繩曰。陰虛陽必發。故發熱自汗。當歸六黃湯加地骨皮。陽虛陰必發。故發厥自汗。黃耆建中湯。甚者加附子。或者附湯有濕熱合邪。汗出不休。以風藥勝其濕。苦藥泄其熱。是活勝濕湯有痰症。冷汗自出。宜理氣降痰。痰去則汗自止。有用固滋藥。汗愈不收。止可理心血。汗乃心之液。心失所養不能攝血。故溢而為汗。宜大補黃耆湯加酸棗仁。有微熱者。更加石斛下靈砂丹。王海藏曰。晉郎中童子盜汗七年。諸藥不效。予與涼膈散三黃丸三日病已。蓋腎主五液。化為五濕。腎水上行。乘心之虛。心火上炎而入肺。欺其不勝。皮毛以是而開。為汗出也。先以涼膈散瀉胸。

稍達腎並而止痛使濕熱去而心腎通則氣化行而淋濁止矣此以疎泄為禁也者
縮泉丸 益智同烏藥等分山藥為糊

丸便數需 鹽湯下治便數遺尿

當歸拈痛 湯東 羌防升猪澤茵陳芩葛明

二朮苦參知母草 瘡瘍濕熱服皆應歸

酒洗羌活防風升麻猪苓澤瀉茵陳黃芩酒炒葛根蒼朮白朮土炒苦參知母並酒炒甘草炙○羌活通關節防風散留濕苦參黃芩茵陳知母以泄濕熱當歸以和氣血升葛助陽而升清苓瀉瀉濕而降濁參甘二朮補正固中使苦寒不傷胃疏泄不損氣也劉宗厚曰此方東垣本治濕熱脚氣後人用治諸瘡甚驗

潤燥之劑 十三首附方二

中相火次以三黃丸瀉心火以助陰則腎水還本藏玄府閉而汗自止矣

附撲汗法 白朮薑本川芎各二錢半米粉兩為末絹袋盛

身撲之治汗出不止又方龍骨牡蠣糯米等分為末撲之

牡蠣散 治陽虛自汗

牡蠣 煨 黃耆 麻黃根 一錢 浮小麥 百粒 煎服

此手太陰少陰藥也陳來章曰汗為心之液心有火則汗不止牡蠣浮小麥之鹹涼去煩熱而止汗陽為陰之衛陽氣虛則衛不固黃耆麻根之甘溫走肌表而固衛

栢子仁丸 治陰虛盜汗



炙甘草湯仲景參薑桂麥冬生地大麻仁大

棗阿膠生薑加酒服虛勞肺痿效如神甘草炙人

參生薑桂枝各三兩阿膠蛤粉炒二兩
生地一斤麥冬麻仁研各半斤棗十二

枚水酒各半煎仲景治傷寒脉結代心
動悸及肺痿唾多千金翼用治虛勞實

鑑用治呃逆外臺用治肺痿參草麥
冬益氣復脉阿膠生地補血養陰葉麻

潤滑以緩脾胃薑
桂辛溫以散餘邪

滋燥養榮湯兩地黃芩甘歸芍及芩防先防

風藥潤劑瓜枯膚燠兼風秘火爍金傷血液

亡當歸酒洗二錢生地熟地白芍炒黃
芩酒炒秦芩各一錢防風甘草各五分

活血潤燥生津飲丹二冬熟地兼栝萸桃

栝子仁炒研去油二兩人參白朮半夏五味子牡蠣

三麻黃根一兩麥麩五錢棗肉丸米飲下五十丸

此手足太陰少陰藥也陳來章曰心血虛則

栝子仁之甘辛平養心寧神為君牡蠣麥麩之鹹甘

躁收脫為臣五味酸斂潛收半夏和胃燥濕為佐濕能作汗

麻黃根端走肌表引人參白朮以固衛氣為使

秩菟丹局方治遺精白濁及強中消渴心腎為水火之藏法天施地生之道

心神傷則火動火動不已則腎水受傷腎主藏精所受

五藏六府輸至之精皆不得藏而時下矣故為遺精夢

泄戴氏曰遺精有因用心過度心不攝腎以致失精者有思色慾不遂致精失位輸泄而出者有色慾太過滑
泄不禁者亦有年壯氣盛久無色慾精滿而泄者赤濁
屬血由心小腸屬火也白濁屬氣由肺大腸屬金也又



仁紅花及歸芍利秘通幽善澤枯熟地

白芍各一錢。天冬麥冬枯蕒各八分。桃仁研。紅花各五分。

葦汁牛乳

飲丹

反胃滋養榮散痰潤腸奇

五汁安中

飲張

薑梨藕三般加入用隨

宜

牛乳半升。葦菜汁少許。滾湯頓服。名

汁梨汁各一分。和服。名五汁安中。飲並

治噎膈。反胃壅膈。由火盛血枯。或有

痰血寒痰阻滯胃口。故食入反出也。牛

乳潤燥養血為君。葦汁藕汁消痰益胃。

潤腸丸

東垣

用歸尾。薤桃仁。麻仁。及大黃。歸

尾。活大黃各五錢。桃仁。大麻仁各一兩。蜜丸。○歸尾。桃仁。潤燥活血。薤活散火。

曰赤濁為心虛有熱。因思慮而得。白濁由腎虛有寒。由嗜慾而得。渴症下消者。名強中。腎水虧。心火亢也。

芫絲子

十五兩

五味子

八兩

石蓮肉

白茯苓

芫絲用酒浸。浸過餘酒。煮山藥糊為丸。漏精。鹽湯下。赤

濁。燈心湯下。白濁。茯苓湯下。消渴。米飲下。

此手足少陰藥也。芫絲。辛甘和平。強陰益陽。能治精寒。

淋渴。五味滋腎生津。石蓮清心止濁。山藥健脾利濕。皆

潛精固氣之品也。茯苓能通心氣于腎。利小便而不走。

氣取其淡滲于補。正中能泄腎邪也。

治濁固本丸

治胃中濕熱。滲入膀胱。下濁不止。

淋病在

肝。胆。都。濁。病。在。精。竅。屬。腎。膀。胱。部。或。由。濕。熱。或。由。虛。寒。大。抵。熱。者。多。而。寒。者。少。赤。屬。血。白。屬。氣。或。由。敗。精。瘀。血。



搜風大黃破結通
幽麻仁滑腸利竅
或如光防皂角子

加秦艽防風皂角子
燒存性研皂
風秘

子得濕則滑善通便
秘丸防治風

血秘善通腸
風燥血燥
致大便秘

通幽湯垣東
中二地俱桃仁紅花歸草需升

麻升清以降濁
清陽不升則濁陰不降
故大便不通生地熟地

各五分桃仁研紅花當歸
身甘草炙升麻各一錢
噎塞便閉此

方需有加麻仁大黃者當歸潤腸湯名

殊上藥皆潤
燥通腸

搜風順氣丸
大黃蒸郁李麻仁山藥增防

獨車前及板枳莧絲牛膝山茱仍中風

壅塞腹道痛澀異常非
是熱淋不宜用淋藥治

蓮鬚黃連炒二
黃柏益智仁砂仁

苓一猪苓二甘草炙三

此足少陰太陽太陰藥也精濁多由濕熱與痰黃連

心火黃柏瀉腎火所以清熱二苓所以利濕半夏所以

除痰濕熱多由于鬱滯砂仁益智辛溫利氣又能固腎

強脾既以散留滯之氣且稍濟連柏之寒甘草和中而

補土惟蓮鬚之瀉則所以固其脫也
朱丹溪曰巢氏原

由勞傷腎腎氣虛冷故也歷代宗其說不惟白濁之理
不明所治之法亦誤不思內經本無白濁之名惟言少
陰在泉客勝洩便變少陽在泉客勝則洩白又言思想
無窮入房太甚發為白淫與脾移熱于腎出白二者皆



風秘及氣秘。腸風下血。總堪憑。大黃九

五兩。大蘇仁。郁李仁。去皮。山藥酒蒸。車前子。牛膝酒蒸。山茱肉。各三兩。菟絲子酒浸。防風獨活。檳榔。枳殼。麩炒。各一兩。蜜丸。○防獨潤腎搜風。枳。順氣破滯。大黃經蒸晒。則性稍和緩。同二仁骨利潤燥通幽。牛膝車前。下行利水。加山藥。山茱菟絲。固本益陽。不使過于攻散也。

消渴方。丹中花粉連藕汁生。地汁牛乳研。

粉連研末。時或加薑汁。蜜為膏服。瀉火生

津益血痊。黃連瀉心火生地滋腎水藕汁益胃花粉生津牛乳潤燥

益血

白茯苓丸治腎消。花粉黃連草解調二參。

隨洩而下。夫非白濁之源乎。原病式因舉內經謂諸病水液渾濁。皆屬於熱。言天氣熱。而水渾濁。寒則清。謂發聖人之旨。以正千載之誤矣。予嘗聞先聖論赤白濁。多因濕熱下流。膀胱而成。即靈樞所謂中氣不足。便為之變是也。必先補中氣。使升舉之。而後分其藏府。氣血赤白虛實以治。與夫其也。邪熱所傷者。固在為熱。補虛設腎氣虛甚。或火熱亢極者。則不宜過用寒涼。劑必以反佐治之。要在權衡輕重而已。葉氏曰。遺濁多作腎虛補瀝之而罔效。不知此因脾胃濕熱所乘。飲酒厚味。痰火之人。多有此疾。腎雖藏精。其精本于脾胃。飲食生化。而輸于腎。若脾胃受傷。濕熱內鬱。使中氣者而不清。則所輸皆濁氣。邪火擾動。心不得而安靜。故令遺也。

水陸二仙丹 治遺精白濁。精與濁所出之竅不同。便濁即是膏淋。肝胆之火也。精濁

乃精氣滑出。不便亦然。此腎水不足。淫火薰蒸。故精離其位也。

金櫻膏 取半黃者熬膏一斤。熟則全甘而失滋味。艾實 一斤蒸熟為粉。和丸鹽湯。

熟地覆盆子石斛蛇床脆脛要音皮鵠

也茯苓花粉黃連萆薢人參玄參熟地黃覆盆子各一兩石斛蛇床子各七錢半雞肫皮三十具微炒蜜丸磁石湯下○黃連降心火石斛平胃熱熟地玄參生腎水覆盆蛇床固腎精人參補氣花粉生津茯苓交心腎萆薢利濕熱脆脛治膈消磁石色黑屬水假之入腎也

猪腎齊危

湯干

參茯神知

同磁石

麥冬葛草石膏因

磁石天花同黑豆強中消渴此方珍下消

之症莖長興盛不交精出名強中緣服邪術熱藥而毒盛也猪腎一具大豆一升薤芩人參石膏各三兩磁石綿裹茯神知母黃芩葛根甘草花粉各二兩先煮豆腎去滓下藥分三服○知母石膏以瀉邪火人參甘草以固正氣葛根花

酒下

此足少陰藥也金櫻芡實甘能益精潤能滋陰酒下脫一生于水一生干山故名水陸二仙丹

金鎖固精丸

治精滑不禁

精滑者火炎上而水

沙苑蒺藜

炒

芡實

蒸

蓮鬚

二龍骨

酥炙

牡蠣

鹽水煮一日

夜煨粉一兩

蓮子粉糊為丸鹽湯下

此足少陰藥也蒺藜補腎益精蓮子交通心腎牡蠣清

熱補水芡實固腎補脾合之蓮鬚龍骨皆瀉精秘氣之

品以止滑脫也

治遺精大法有五心神浮越者辰砂磁石龍骨之類鎮之痰飲迷心者猪苓丸

之類導之思想傷陰者潔古珍珠粉丸黃柏蛤粉等分滋陰降火思想傷陽者謙甫鹿茸菟絲等補陽陰



粉以生津。薺危黑豆最能解毒。磁石猪腎引之入腎也。

地黄飲子易簡參耆甘。二地二冬。批斛。赤澤。

瀉枳實疏。二府。燥煩消渴血枯含。人參黃耆

甘草炙。天冬麥冬生地。枇杷葉蜜炙。石斛澤瀉。枳實麩炒。每服三錢。○參耆甘草以補其氣。氣能生水。二地二冬以潤其燥。潤能益血。石斛平胃。枇杷下氣。澤瀉瀉膀胱之火。枳實宣大腸之滯。使二府清。則心肺二藏之氣得以下降。而渴止。白

酥蜜膏酒千金用飴糖。二汁百部及生薑。杏。

棗補脾兼潤肺。聲嘶氣憊酒溫膏。酥蜜飴糖

棗肉杏仁細研百部汁生薑汁共煎一炊久。如膏溫酒細細燕服之。

陽俱虛者。丹溪作心虛治。用珍珠粉丸。定志丸。補之。附本事猪苓丸。猪苓末二兩。先將一半炒。半夏令黃。取半夏為末。糊丸。更用猪苓末一半同炒。微裂砂。飯後吞。未開空心酒鹽湯任下。釋曰。半夏有利性。猪苓導氣使通之意也。定志丸見目門。

人參樗皮散 治藏毒挾熱下血久痢膿血不止。謂熱者

熱及飲酒煎炙之熱也。久痢不止。氣虛也。

人參 樗根白皮東引者去粗皮醋炙 等分為末。米飲或酒調下。

此手足陽明藥也。人參之甘。以補正氣。樗皮之苦。以燥其濕。寒以解其熱。瀼以收其脫。使虛者補而陷者升。亦劫劑也。初起勿用