

溫病條辨中焦篇

汪瑟菴先生參訂

吳

塘鞠通氏著

徵以園先生同參

慈溪葉氏濬吾樓重鐫

朱武曹先生點評

梅橋阮志銳校字

風溫 溫熱 溫疫

溫毒

冬溫

①面目俱赤語聲重濁呼吸俱粗大便閉小便濇舌

苔老黃甚則黑有芒刺但惡熱不惡寒日晡益甚者

傳至中焦陽明溫病也脈浮洪躁盛者白虎湯主之



脈沈數有力甚則脈體反小而實者大承氣湯主之
暑溫溼溫溫瘧不在此例

陽明之脈榮於面傷寒論謂陽明病面緣緣正赤
火盛必克金故目白睛亦赤也語聲重濁金受火
刑而音不清也呼吸俱粗謂鼻息來去俱粗其粗
也平等方是實證若來粗去不粗去粗來不粗或
竟不粗則非陽明實證當細辨之粗則喘之漸也
大便閉陽明實也小便濇火腑不通而陰氣不化

也口燥渴火爍津也舌苔老黃肺受胃濁氣不化

津也

按靈樞論諸臟溫病獨肺溫病有舌苔之明文餘則無有可見舌苔乃胃中濁氣薰蒸肺

臟肺氣不化而然

甚則黑者黑水色也火極而似水也又

水勝火大凡五行之極盛必兼勝已之形芒刺苔

久不化熱極而起堅硬之刺也倘刺軟者非實證

也不惡寒但惡熱者傳至中焦已無肺證陽明者

兩陽合明也溫邪之熱與陽明之熱相搏故但惡

熱也或用白虎或用承氣者證同而脈異也浮洪

躁甚邪氣近表脈浮者不可下凡逐邪者隨其所
在就近而逐之脈浮則出表爲順故以白虎之金
飆以退煩熱若沈小有力病純在裏則非下奪不
可矣故主以大承氣按吳又可溫疫論中云舌苔
邊白但見中微黃者卽加大黃甚不可從雖云傷
寒重在誤下溫病重在誤汗卽誤下不似傷寒之
逆之甚究竟承氣非可輕嘗之品故云舌苔老黃
甚則黑有芒刺脈體沈實的係燥結痞滿方可用



之

或問子言溫病以手經主治力闢用足經藥之非
今亦云陽明證者何陽明特非足經乎曰陽明如
市胃爲十二經之海土者萬物之所歸也諸病未
有不過此者前人云傷寒傳足不傳手誤也一人
不能分爲兩截總之傷寒由毛竅而谿谿肉之分
理之小者由谿而谷谷肉之分理之大者由谷而
孫絡孫絡絡之至細者由孫絡而大絡由大絡而



通論

着眼

一了百了

經此經卽太陽經也始太陽終厥陰傷寒以足經
爲主未始不關手經也溫病由口鼻而入鼻氣通
於肺口氣通於胃肺病逆傳則爲心包上焦病不
治則傳中焦胃與脾也中焦病不治卽傳下焦肝
與腎也始上焦終下焦溫病以手經爲主未始不
關足經也但初受之時斷不可以辛溫發其陽耳
蓋傷寒傷人身之陽故喜辛溫甘溫苦熱以救其
陽溫病傷人身之陰故喜辛涼甘寒甘鹹以救其

陰彼此對勘自可瞭然於心目中矣

白虎湯 方見上焦篇第十三頁

大承氣湯方

大黃 六錢

芒硝 三錢

厚朴 三錢

枳實 三錢

水八杯先煮枳朴後納大黃芒硝煮取三杯先服一杯約二時許得利止後服不爽再服一杯再不爽再服

解

方論此苦辛通降醎以入陰法承氣者承胃氣也
蓋胃之爲腑體陽而用陰若在無病時本係自然
下降今爲邪氣蟠踞於中阻其下降之氣胃雖自
欲下降而不能非藥力助之不可故承氣湯通胃
結救胃陰仍係承胃腑本來下降之氣非有一毫
私智穿鑿於其間也故湯名承氣學者若真能透
徹此義則施用承氣自無弊竇大黃蕩滌熱結芒
硝入陰軟堅枳實開幽門之不通厚朴瀉中宮之

實滿

厚朴分量不似傷寒論中重用者治溫與治寒不同畏其燥也

曰大承氣者

合四藥而觀之可謂無堅不破無微不入故曰大

也非真正實熱蔽痼氣血俱結者不可用也若去

入陰之芒硝則云小矣去枳朴之攻氣結加甘草

以和中則云調胃矣

②陽明溫病脈浮而促者減味竹葉石膏湯主之

脈促謂數而時止如趨者過急忽一蹶然其勢甚

急故以辛涼透表重劑逐邪外出則愈

溫病傳名二風溫熱溫疫溫寒溫

刻醫學初階

減味竹葉石膏湯方

辛涼合甘寒法

竹葉 五錢

石膏 八錢

麥冬 六錢

甘草 三錢

水八杯煮取三杯一時服一杯約三時令盡

③陽明溫病諸證悉有而微脈不浮者小承氣湯微

和之

以陽明溫病發端者指首條所列陽明證而言也

後凡言陽明溫病者倣此諸證悉有似非下不可



微則未至十分亢害但以小承氣通和胃氣則愈
無庸芒硝之軟堅也

④陽明溫病汗多譫語舌苔老黃而乾者宜小承氣
湯

汗多津液散而大便結苔見乾黃譫語因結糞而
然故宜承氣

⑤陽明溫病無汗小便不利譫語者先與牛黃丸不
大便再與調胃承氣湯

溫病條辨卷二

風溫溫熱溫疫溫毒冬溫

六
刻醫學初階

無汗而小便不利則大便未定成鞭譴語之不因
燥屎可知不因燥屎而譴語者猶係心包絡證也
故先與牛黃丸以開內竅服牛黃丸內竅開大便
當下蓋牛黃丸亦有下大便之功能其仍然不下
者無汗則外不通大小便俱閉則內不通邪之深
結於陰可知故取芒硝之鹹寒大黃甘草之甘苦
寒不取枳朴之辛燥也傷寒之譴語舍燥屎無他
證一則寒邪不兼穢濁二則由太陽而陽明溫病

着服



細微之辨學
者其審之

譏語有因燥屎有因邪陷心包一則溫多兼穢二
則自上焦心肺而來學者常須察識不可歧路亡
羊也

⑥陽明溫病面目俱赤肢厥甚則通體皆厥不瘧癰
但神昏不大便七八日以外小便赤脈沈伏或並脈
亦厥胸腹滿堅甚則拒按喜涼飲者大承氣湯主之
此一條須細辨其的是火極似水熱極而厥之證
方可用之全在目赤小便赤腹滿堅喜涼飲定之

大承氣湯 方法見前第四頁

⑦陽明溫病純利稀水無糞者謂之熱結旁流調胃承氣湯主之

此亦作者獨得處

熱結旁流非氣之不通不用枳朴獨取芒硝入陰以解熱結反以甘草緩芒硝急趨之性使之留中解結不然結不下而水獨行徒使藥性傷人也吳又可用大承氣湯者非是

⑧陽明溫病實熱壅塞爲噤者下之連聲噤者中焦



聲斷續時微時甚者屬下焦

金匱謂噦而腹滿視其前後知何部不利利之卽愈陽明實熱之噦下之裏氣得通則止但其兼證之輕重難以預料故但云下之而不定方以俟臨證者自爲採取耳再按中焦實證之噦噦必連聲緊促者胃氣大實逼迫肺氣不得下降兩相攻擊而然若或斷或續乃下焦衝虛之噦其噦之來路也遠故其聲斷續也治屬下焦



溫病條辨卷二 風溫熱濕疫溫毒發溫

刻醫學初階

⑨陽明溫病下利譴語陽明脈實或滑疾者小承氣湯主之脈不實者牛黃丸主之紫雪丹亦主之

下利譴語柯氏謂腸虛胃實故取大黃之濡胃無庸芒硝之潤腸本論有脈實脈滑疾脈不實之辨恐心包絡之譴語而誤以承氣下之也仍主芳香

開竅法

小承氣湯方 苦辛通法重劑

大黃 五錢

厚朴 二錢

枳實 一錢

溫邪惡燥枳
朴減原方分
數極見斟酌



水八杯煎取三杯先服一杯得宿糞止後服不爽再服

調胃承氣湯 熱淫於內治以鹹寒佐以甘苦法

大黃

三錢

芒硝

五錢

生甘草

二錢

牛黃丸

方論並見上焦篇第二十六頁

紫雪丹

方論並見上焦篇第二十八頁

⑩溫病三焦俱急大熱大渴舌燥脈不浮而躁甚舌色金黃痰涎壅甚不可單行承氣者承氣合小陷胸