

S2653

673<2

十大册

卷貳

卷叁

卷肆

卷伍

肩 腋 乳 胸 肋
部 部 部 部 部

心 肺 氣 咳 吐
部 部 痛 嗽 血

脾 痰 三 積 噎 嘔
胃 疾 消 滯 膈 吐

肚 痞 蟲 鼓 腸 背 腰
腹 疾 疾 脹 部 部

驗方新編

貳



南京中医药大学图书馆版权所有

驗方新編卷二目錄

肩部

擔肩癰癤

肩甲縫中積痛

手部

蛇頭惡毒

生各指頭及足趾頭生者亦是

脫骨疽

甲疽

又名嵌甲

灌甲初起

油灰指甲

指頭麻木痛癢

指頭畏冷

手足指頭羅紋生瘡

指頭生瘡

指甲下生瘡



南京中医药大学图书馆版权所有

十指節斷壞惟有筋連蟲出長數尺遍身綠毛

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍

手了枝痛不可忍

手指觸着衣物痛癢破爛

手指斷落

手被咬傷

手指及掌生黃白膿洩痛癢無時纏綿不已

手指手掌皮厚如鉄

掌中紅絲斷之血流不止

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

鵝掌風

手腕生物如豆紅紫疼痛

手臂生瘡腫大如拳

熱毒攻手腫痛欲脫

四肢節脫但有皮連不能舉動

手足作痛

手足生瘡久不收口

小兒手軟

腋部

肩下即是

腋下腫硬形如鴨蛋

腋下疔瘡

音隔答

腋下癭瘤

腋下狐臭

乳部

乳頭破裂

乳上生瘡

乳頭生瘡痛不可忍

乳癰

乳癰多至二三百頭者

乳癰腫及頭面

乳癰日久腫痛不愈

乳癰久不收口



南京中醫藥大學圖書館版權所有

乳岩

婦人乳忽縮入

婦人乳內吹氣有聲

婦人乳汁不通

乳多發脹

胸部

胸膈閉結不通

胸前生孔

肋部

肋下生瘡久則有聲如嬰兒啼哭

男子乳忽壅腫如婦人乳

婦人產後兩乳長細垂

婦人乳孔塞痛

乳汁自流不止

無子食乳腫痛難消

胸滿腹脹

胸旁生瘡

龜胸



南京中醫藥大學圖書館藏

驗方新編卷之二

肩部

擔肩癰癤

此惟擔夫有之

五倍子

性燒存

爲細末加黃丹

用水飛過

醋調敷之甚效

又方

照癰毒各方治之

肩甲縫中積痛

查中風筋骨各方治之



南京中醫藥大學圖書館版權所有

耳聾

耳聾

耳聾

耳聾

耳聾

耳聾

耳聾

耳聾

耳聾

耳聾

耳聾



南京中医药大学图书馆版权所有

手部

蛇頭惡毒

生各指頭又足趾更生者亦是

此症初起痛甚急用頭髮紮住指根取癩蝦蟆一

個腹無毒

八字文破去腸雜不可破胆胆將瘡頭套任用繩紮好並

將蝦蟆心肝焙枯研末冲酒服以免毒氣攻心約一對時

破口出膿而愈套住之後瘡頭猶如針刺痛更難忍甚至

心中難過遍身發熱或嘔吐惡心不必驚慌急服護心散

見癰毒或服麻油一盞菜子油心自安定蝦蟆能拔極重

惡毒切不可輕易揭去忍耐片時自然破口出膿而愈倘

誤將蝦蟆揭去別藥難醫為害不小去膿後如發昏暈亦



中醫藥大學圖書館版權所有

不必驚慌用高麗參三四錢以砂罐煮濃汁服之自然無
事參不宜蒸一時蒸不出汁其色只如淡茶煎則其色濃
厚易見功效無力者用好黨參一二兩煎服亦可愈後若
再腫痛此毒氣未盡之故再用蝦蟆套上少頃膿盡即不
再發此瘡最爲陰惡此方極屬神效不可輕視又方
鳳仙花下半截連根用水洗和甜酒糟搗融敷有人指頭生瘡
大如李痛不可忍用此敷之半日腫消痛止較蝦蟆方尤
爲神速又方用磁片將瘡刺破查照疔瘡方內蜘蛛
拔毒治之見癰毒諸門止痛消腫最爲神效又方蜈蚣
焙枯猪胆調搽神效又方鷄蛋一個穿一小孔入砒

石壹分套指頭上熱則再換立刻止痛如神真仙方也較

前各方功效更大又方雄黃枯礬各等分研

用麻油或醋敷亦極效驗又方白蘿蔔挖孔入雄黃

叁分蒸半熟套指上或用真烏梅仁嚼融敷之均極效驗

又方如色白者照後脫骨疽陽和湯各方治之

脫骨疽

此症生手足各指或云只生手足第四指者是或生指頭或生指節指

縫初生或白色痛極或如粟米起一黃泡其皮或如煮熟

紅棗黑色不退久則潰爛節節脫落延至手足背腐爛黑

陷痛不可忍古方有截去指頭一法斷不可用宜用頂

大甘草研極細末用香麻油調敷要敷極厚一日一換不

可間斷忌食發物不出十日必愈真神方也再用

金銀花

花

元參

各叁錢

當歸

貳兩

甘草

壹兩

水煎服一連十劑

又方

無後患藥味不可減少減則不效並忌抓擦為要

又方

大人用陽和湯小兒用小金湯重則用犀黃丸

均見陰疽諸方

色紅者照上蛇頭惡毒方治之此林屋山人百發百中之

方也

又方

甘草嚼融厚敷乾則隨換日夜不斷數日

必愈神效

甲疽

又名嵌甲

凡指甲邊生一赤肉突出時常舉發者甲疽也用狼毒壹

兩黃芪貳兩醋浸一宿入猪油五兩微火上煎取貳兩絞

去渣退火氣敷之日換三次神效此林屋山人方也

方乳香胆礬研細時時敷之此病須剔去甲不藥

亦愈若已成瘡久不愈者此方甚效又方皇礬五錢煨

候冷先以鹽湯洗瘡拭乾以礬末敷之舊紬裏定一日一

換神效或用枯礬亦可惟敷之微覺疼痛又方陳皮

濃煎湯浸良久甲肉自相離開輕手剪去肉中爪甲外用

蛇退燒灰雄黃壹錢為末乾糝或香油調敷又方輕

粉乳香沒藥各壹錢黃丹貳錢赤石脂五錢寒水石叁錢

煨其為末濕則乾糝乾則油調最妙又方甘草嚼融

論方新編卷二手部



厚敷乾則隨換數日全愈神效 又方 見頭部頭角太

陽生瘡方

灌甲初起

用磁鋒於甲上刮去一層並用枯礬末敷之其效如神

油灰指甲

每日取鳳仙花

又名指甲花

連根蒂葉搥敷指甲上用布包好

一日一換月餘乃愈此林屋山人方也

指頭麻木痛癢

取蜒蚰

查藥物備要便知

和銀硃其搗擦之若遲延不治必生蛇

頭蛙節等疔痛苦難受初起多擦幾遍決不生矣



中國醫藥大學圖書館版權所有

指頭畏冷

天氣不寒指尖作冷名曰螺瘡用醋和鹽調勻將指頭泡入自愈

手足指頭羅紋生瘡

生橄欖核

有鹽者煮去鹽味用

切兩段醋磨雞毛蘸擦二十日後漸

消

指節生瘡

名曰蛙節生黃豆嚼融敷

須先漱口再嚼即愈

指甲下生瘡

名曰蛙甲治與上蛙節同



十指節斷壞惟有筋連蟲出長數尺遍身綠毛

此名血餘症用

赤茯苓

白茯苓

胡黃連

各錢半

煎服

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍

治即爛全手

大指二指間為虎口又名叉指

生蒲公英搗融敷之數日即愈

又方

生黃豆醬融敷

將口漱淨再嚼甚效

又方

通草為末用鷄蛋清調敷其腫即

消

又方

白芨

參錢末

蟾酥

壹錢

共和雞蛋清搽神效

又方

白芷

滑石

黃丹各等分研極細末敷之神效

手了枝痛不可忍

通草研末生雞蛋白調敷即愈



手指縫觸着紙角衣角痛癢破爛

雖癢極難受斷不可抓擦務必忍住並忌沾水數日自

倘一經抓擦則綿纏難愈用白芷黃丹滑石各等分

研極細末敷之神效或用玉真散見跌打傷門敷之亦極效

手指斷落

方見卷十三跌打損傷門

手被咬傷

方見卷十三人畜蛇蟲咬傷門

手指及掌生黃白濃泡痛癢無時纏綿不已內必有

蟲

馬方新編 卷二
豬肝切片和桃葉搥融敷之神效或用白油膏見腿貼之
更妙

手指手掌皮厚如鉄

苦參酒煎服外用苦參末酒敷極效如神

掌中紅絲斷之血流不止

用燈火燒之自能漸收平愈

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

此名穿掌又曰擎疽又曰托盤用生附子切片貼之或用
生附子煎水泡之更妙數日後不痛者必然作痛作癢切
不可用手抓仍用附子水泡之或附子切片加輕粉壹分



南京中醫藥大學圖書館藏