

增注類證活人書卷十七

五味子湯

二十五

治傷寒喘促脉伏而厥

人參

一分

五味子

半兩

麥門冬

去心一分

杏仁

去皮尖一分

橘皮

去白一分

右剉如麻豆大八生薑十片棗子三枚以水三大

白蓋煎至一蓋半去滓分二服

猧鼠糞湯

二十六

療傷寒病後男子陰易方

萆根

一大把

猧鼠糞

十四枚

右二味以水二升煎取半升去滓再煎三沸溫溫

盡服必有黏汗出爲效未汗再作服亦理諸般勞

復鼠屎兩頭尖者是也

竹皮湯

二十七

療交接勞復卵腫腹中絞痛欲絕

刮竹青皮

一升

右一味以水三升煮一升半絞去滓分服立愈

續添乾薑湯

出百問方

療婦人得溫病雖差平復未

滿一百日不可與交合交合爲陰易之病病必拘急手足拳皆死丈夫病以傷婦人名爲陽易速當療之可差滿一百日不可療也宜令服此藥

乾薑

一分炮

右剉如麻豆大水二盞煎至六分溫服汗出得解

止手足伸遂愈

續添青竹茹湯

出百問方

婦人病未平復因有所動

致熱氣上衝胃手足拘急摘掬如中風狀方

栝樓根

無黃根者二兩

青竹茹

刮半升淡竹者

右以水二升半煮取一升二合去滓溫溫作二三

服喫立有效

續添當歸白朮湯

出百問方

婦人未平復因有所動

小腹急痛腰胯疼四肢不任舉身無熱發者

白朮

一分

當歸

一分

桂枝

一分去皮

附子

一枚破分八片去皮

生薑

半兩

甘草

一分炙

芍藥 一分

人參 一分

黃耆 一分
蜜炙

右剉如麻豆大以水三升煮取一升半去滓通口
服一湯盞食頃再服一湯盞溫服微汗便差

知母麻黃湯

二十八

傷寒差後或十數日或半月二十

日終不惺惺常昏沈似失精神言語錯謬又無寒熱
醫或作鬼祟或作風疾多般治不差或朝夕潮熱煩
赤或有寒熱似瘧都是發汗不盡餘毒在心胞絡之
間所致

知母

半一兩

麻黃

去節

甘草

炙

芍藥

黃芩

各半兩

桂枝

去皮半兩盛暑
可減作一分

右剉如麻豆大每服抄五錢以水一盞半煎八分
去滓溫服半日可相次二三服溫服令微汗若心
煩不眠欲飲水當稍稍與之令胃中和即愈未汗
須再服之

驚甲散二十九傷寒八九日不差名曰壞傷寒不能治

者宜此療之

升麻

前胡去蘆

烏梅去核

枳實麩炒
去白

犀角鎔

黃芩各半
兩

生地黃切兩
合

甘草一分
炙

驚甲去裙米醋炙赤
黃杵碎用半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服

人參順氣散 三十 治傷寒頭疼增寒壯熱四肢疼痛

麻黃

去節秤一兩半

乾葛

一兩

白朮

一兩

甘草

炙一兩

桔梗

去蘆一兩

人參

一兩

白薑

炮半兩

香白芷

一兩

右搗羅爲細末每服三錢水一大盞生薑三片葱

白二寸煎至八分通口服如要出汗連進二服

蒼朮散

三十一

治傷一二日頭疼發熱憎寒身體疼痛

麻黃

過一兩湯洗焙乾秤

蒼朮

半兩米泔浸去皮切

石膏

煨一兩

桔梗

半兩

山茵陳

半兩去梗

甘草

炙半兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至八分連服出汗

麻黃葛根湯

三十二

治傷寒一日至二日頭項及腰脊

拘急疼痛渾身煩熱惡寒

麻黃

用沸湯泡一二次焙乾秤

芍藥

各三兩

乾葛

四分

葱白

七莖

豉

一合

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎一中盞去

滓溫服服了以厚衣蓋覆如人行四五里間再服

良久如未得汗出更煮葱粥少許熱投之取汗

敗毒散

三十三

治傷風溫疫風濕頭目昏眩四肢痛憎

寒壯熱項強目睛疼尋常風眩拘倦風痰皆服神效

羌活

洗去土

獨活

去蘆

前胡

去蘆

柴胡

去苗

芎藭

枳殼

麩炒去穢

白茯苓

去皮

桔梗

去蘆頭

人參

已上一各一兩

甘草

半兩炙

右件搗羅爲末每服三錢入生薑二片水一盞煎

七分或沸湯點亦可老人小兒亦宜日三二服以

知爲度瘴煙之地或溫疫時行或人多風痰或處

卑濕腳弱此藥不可闕也

獨活散

三十四

治傷風溫瘴等疾

羌活

去蘆頭

獨活

去蘆頭

人參

細辛

去灰土華陰者佳

白茯苓

去皮

枳殼

去心麩炒通黃用

防風

去蘆

黃芩

細堅者

麻黃

沸湯泡三次焙乾秤

甘草

細剉炒赤

蔓荊子

甘菊花

已上各一兩

石膏

水飛過二兩

右十三味搗羅爲末每服三錢水一盞生薑三片

薄荷四五葉同煎至七分去滓微熱呷如年高者

以川芎代黃芩

桂枝石膏湯

三十五

治傷寒三日外與諸湯不差脉勢

仍數邪氣猶在經絡未入臟腑者桂枝石膏湯此方可夏至後代桂枝證用若加麻黃去節半兩可代麻

黃青龍湯用之也有汗脉緩爲桂枝證無汗脉緊爲

麻黃青龍證

桂枝半兩 去皮

石膏二兩 碎

黃芩半兩

甘草半兩

梔子四枚 小者 可用八枚

白藥子

升麻三分

乾葛三分

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片水一盞

半煎取八分去滓食頃再服若得汗卽停後服

梔子升麻湯三十六

治晚發傷寒三月至夏爲晚發

梔子十枚 切碎

升麻一兩 半

生地黃半斤 切 碎用

柴胡去蘆

石膏各二兩 半

右劉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至八分去滓頻服病不解更作若頭面赤去石膏用乾葛二兩無地黃用豉代之

橘皮湯

三十七

治傷暑痰逆惡寒

甘草

半兩

人參

一分

陳橘皮

去白二兩

右爲粗末每服五錢用青新季竹輕輕刮上面青茹一團薑四片棗一枚水一盞半煎至八分去滓熱服如不惡寒卽宜竹葉湯

解肌湯

三十八

治傷寒溫病天行頭痛壯熱

葛根

一兩

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草 一分 炙

桂心 一分

麻黃 三分 去節湯泡 一二沸焙乾用

右六味剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半棗子一枚煮取八分去滓日三服三四日不解脉浮者宜重服發汗脉沈實者宜下之

小柴胡加桂湯 三十九 治瘧疾先寒後熱兼治支結

柴胡 八兩

人參

甘草 炙

半夏 湯浸七次切

黃芩

桂 去皮已上 各三兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半生薑七片棗二枚煎至八分去滓取六分清汁溫服日三夜二若渴者去半夏加人參栝樓根同煎服之

白虎加桂湯四十治瘧疾但熱不寒者

知母六兩

甘草炙二兩

石膏一斤

粳米二合

桂去皮秤三兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎八分去滓

服

柴胡桂薑湯四十一

治寒多微有熱或但寒不熱亦治

勞瘧之證

柴胡四兩

黃芩一兩半

桂枝一兩半去皮

枳椇根二兩

牡蠣杵碎炒

甘草炙

乾薑各二兩

右七味剉如麻豆大每服抄五錢水一盞半煎至

一盞去滓溫服初服微煩汗出愈

瘡母煎四十二治久瘡不愈結爲癰疽寒熱

鱉甲十二分黃芩三分烏扇三分
炙
存性用

柴胡六分鼠婦三分乾薑三分
去苗雨
炒
泡三

大黃三分芍藥五分肉桂三分
三分
去皮

葶藶二分石葦二分紫葳三分
炒
去毛

人參一分厚樸三分牡丹皮五分
一分
炙

瞿麥一分蝻蟲五分阿膠炒
一分
炒

蜂窠各四分朴硝十二分蜚螳六分
炒
炙

半夏

湯洗二分

桃仁

二分去皮尖

右搗羅爲末，鍛竈下灰一斗，清酒一斗五升，浸灰候酒盡，一半着鰓甲於中煮令泛爛如膠漆，絞取汁內諸藥煎爲丸，如梧桐子大，空心服七丸，日三服。有一方無鼠婦，朴硝加海藻三分，大戟一分。

祛邪丸

四十三

治瘧疾脉浮大寒熱往來用此吐之，衛

州書云：瘧寒多熱少者，痰多也；然寒多熱少而脉浮則痰無疑矣，可吐之也。若脉遲微者，惡寒瘧耳，宜用柴胡桂薑湯。

恆山

甘草

炙

大黃

知母

各二兩

麻黃

四兩去節湯泡一
二沸焙乾秤用

右搗羅爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十五丸

面向東清淨水吞下

猪膽雞子湯

四十四

治傷寒五六日斑出者

猪膽

二合

雞子

一枚

苦酒

三合

右三味和合煎三沸強人盡服羸人煎六七沸服

汗出卽差

萎蕤湯

四十五

治風濕兼療冬溫及春月中風傷寒發

熱頭眩痛喉咽乾舌強胃內疼痛滿腰背強

萎蕤

三分

石膏

一兩杵碎

白薇

半兩