

午1

1<4

溫熱經緯



溫熱經緯卷第五

海甯王士雄孟英纂

定州楊照黎素園評

烏程汪曰楨謝城閱

錢塘任源殿華參

方論

甘草湯

甘草二兩

水三升煮取一升半去滓溫服七合日三服

王晉三曰。一藥治病。是曰奇方。

徐洄溪曰。大甘爲土之正味。能制腎水。越上之火。

王樸莊曰。自靈素至漢晉宋齊諸古方。凡云一兩者。以今之

七分六釐準之。凡云一升者。以今之六勺七秋準之。

雄按。通凡引。

古方輒改定其分兩而輕重殊未當也。學者審之。

雄按傷寒類要。治傷寒心悸脉結代。聖濟總錄。治舌腫塞口。外科精要。治一切瘡疽諸發。及丹石烟火藥發。兵部手集。治懸癰。直指方。治痘瘡煩渴及蠱毒藥毒。金匱玉函。治小兒撮口。及小兒羸瘦得效方。治小兒遺溺。皆以一味甘草爲方妙。

用雖多。總不外乎養陰。緩急。清熱。化毒也。

桔梗湯

二

桔梗

兩一甘草
兩二

水三升。煮取一升。去滓。分溫再服。

鄒潤安曰。腎家邪熱。循經而上。肺不任受。遂相爭競。二三日邪熱未盛。故可以甘草瀉火而愈。若不愈。是肺竅不利。氣不宣泄也。以桔梗開之。肺竅既通。氣遂宣泄。熱自透達矣。

雄按。雖以桔梗名湯。而倍用甘草。以爲駕馭。後人改稱甘桔湯是矣。但須審證而投。不可泥爲通治咽痛之方也。黃錦芳



北京中醫藥大學圖書館版權所

醫案求真嘗論及之醫者不可不知

豬膚湯 三

豬膚

一斤雄按以豬皮去其肉肥刮如紙薄杭人能造名曰肉鮮可以充饌

水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合

即是米粉熬香和

令相得溫分六服

王晉三曰腎應氣而肺主膚腎液下泄不能上蒸于肺致絡燥而爲咽痛者又非甘草所能治矣當以豬膚潤肺腎之燥解虛煩之熱白粉白蜜緩中俾豬膚比類而致津液從腎上入肺中循喉嚨復從肺出絡心注胸中而上中下燥邪解矣

黃連阿膠湯_四

黃連_{四兩}黃芩_{二兩}芍藥_{二兩}阿膠_{三兩}雞子黃_{二枚}

水五升先煮三物取二升去滓內膠烱盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

鄒潤安曰。尤氏云。陽經之寒。變為熱。則歸於氣。陰經之寒。變為熱。則歸於血。陽經或有歸於血者。惟陰經之熱。則必不歸於氣。故三陰有熱結證。不用調胃承氣。小承氣。而獨用大承氣。諸下利證不已。必便膿血。是其驗也。心中煩不得卧。熱證也。至二三日以上。乃心中煩不得卧。則非始即屬熱矣。始即



屬熱心中煩不得卧者爲陰虛。陰虛則不得瀉火。今至二三日以上始見則爲陽盛。陽盛則宜瀉火。然致此陽盛亦必其陰本虛。故阿膠芍藥雞子黃無非救陰之品。瀉火則惟恃苓連而芩止一兩。連乃四兩。此黃連之任獨冠一方而爲補劑中瀉藥矣。

猪苓湯

五

猪苓

去皮

茯苓

澤瀉

滑石

阿膠

各一兩

水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烱消溫服七合日二周禹載曰熱甚膀胱非水能解何者水有止渴之功而無祛

熱之力也。故用猪苓之淡滲。與澤瀉之鹹寒。與五苓不異。而此易术以膠者。彼屬氣。此屬血也。易桂以滑石者。彼有表。而此爲消熱也。然則所蓄之水去。則熱消矣。潤液之味投。則渴除矣。

鄒潤安曰。松之概挺拔勁正。楓之概柔弱易搖。松之理麤疎。楓之理堅細。松之葉至冬益蒼翠而不凋。楓之葉至冬遂鮮赤而卽落。是其一柔一剛。顯然殊致。茯苓屬陽。治停蓄之水。不從陽化者。猪苓屬陰。治鼓盪之水。不從陰化者。是故仲景以猪苓名方者。其所治之證。曰少陰病下利欬而渴。嘔心煩。

不得眠者。猪苓湯主之。若五苓散則其治有渴者有不渴者。至茯苓入他方。所治之病。則不渴者居多。蓋渴者水氣被陽逼迫。欲得陰和而不能也。與之猪苓。使起陰氣以和陽。化水。譬之楓葉已丹。遂能卽落也。

大承氣湯六

厚朴

去皮炙
一兩

枳實

炙五
兩

大黃

四兩
酒洗

芒硝

三
合

水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內硝更上微火一二沸溫再服得下餘勿服

鄒潤安曰。柯氏云。厚朴倍大黃爲大承氣。大黃倍厚朴爲小

承氣是承氣者在枳朴應不在大黃矣。但調胃承氣湯不用枳朴亦名承氣何也。且三承氣湯中有用枳朴者有不用枳朴者有用芒硝者有不用芒硝者有用甘草者有不用甘草者惟大黃則無不用是承氣之名固當屬之大黃況厚朴三物湯卽小承氣湯厚朴分數且倍於大黃而命名反不加承氣字猶不可見承氣不在枳朴乎。自金元人以順釋承而大黃之功不顯考本經首推大黃通血再以六微旨大論亢則害承乃制之義參之則承氣者非血而何。夫氣者血之帥故血隨氣行亦隨氣滯氣滯血不隨之滯者是氣之不足非氣

之有餘。惟氣滯併波及於血。於是氣以血爲窟宅。血以氣爲
禦侮。遂連衡宿食。蒸逼津液。悉化爲火。此時惟大黃能直搗
其巢。傾其窟穴。氣之結於血者散。則枳朴遂能效其通氣之
職。此大黃所以爲承氣也。雄按此余夙論如此。鄒氏先得我心。

白虎湯七

石膏

一斤

知母

六兩

甘草

二兩

粳米

六合

水一斗。煮米熟湯成。去滓溫服。一升日三服。

方中行曰。白虎者西方之金神。司秋之陰獸。虎嘯谷風冷涼。
風酷暑清。神於解熱。莫如白虎。石膏知母辛甘而寒。辛者金

之味。寒者金之性。辛甘體寒。得白虎之體焉。甘草粳米。甘平而溫。甘取其緩。溫取其和。緩而且和。得伏虎之用焉。飲四物之成湯。來白虎之嗥嘯。陽氣者。以天地之疾風名也。風行而虎嘯者。同氣相求也。虎嘯而風生者。同聲相應也。風生而熱解者。物理必至也。抑嘗以此合大小青龍真武而論之。四物者。四方之通神也。而以命名。蓋謂化裁四時神妙萬世名義兩符。實自然而然者也。方而若此。可謂至矣。然不明言其神。而神卒莫之掩者。君子慎德。此其道之所以大也。

白虎加人參湯八

原方加人參三兩。煮服同前法。

鄒潤安曰。傷寒脉浮發熱無汗。其表不解者。不可與白虎湯。渴欲飲水。無表證者。白虎加人參湯主之。可見白虎加人參湯之治。重在渴也。其時時惡風。則非常惡風矣。背微惡寒。則非遍身惡寒矣。常常惡風。遍身惡寒者。謂之表證。時時惡風。背微惡寒者。表邪已經化熱。特尙未盡耳。謂之無表證可也。然熱邪充斥。津液消亡。用栝蒌根生津止渴可也。何以必用人參。靈樞決氣篇。腠理發泄。汗出溱溱。是謂津津。爲水陰屬也。能外達上通。則陽矣。夫是之謂陰中之陽。人參亦陰中。

之陽惟其入陰故能補陰惟其爲陰中之陽故能入陰使人
陰中之氣化爲津不化爲火是非枯婁根可爲力矣
雄按朱奉議云再三汗下熱不退者以此湯加蒼朮一錢如
神。

黃芩湯九

黃芩

三兩

甘草

炙

芍藥

各二兩

大棗

十二枚

水一斗煮取三升去渣溫服一升日再夜一服

鄒潤安曰或問黃芩湯治何等證其證腹痛與否若腹痛何
以用黃芩若腹不痛何以用芍藥曰其證身熱不惡風亦不



惡熱或下利。或嘔腹則不痛。蓋芍藥甘草大棗桂枝湯裏藥也。以不惡風故不用薑桂。黃芩甘草大棗小柴胡裏藥也。以不往來寒熱故不用柴胡。以其常熱故不用人參。若不嘔則併不用半夏生薑。至芍藥則並不因腹痛而用。以桂枝湯證原無腹痛也。亦不心下痞鞭。故不去大棗也。又厥陰篇云。傷寒脉遲與黃芩湯除其熱。腹中則冷不能食。可知黃芩湯證之脉必數。黃芩所治之熱必自裏達外不治。但在表分之熱矣。然仲景用黃芩有三耦焉。氣分熱結者與柴胡爲耦。血分熱結者與芍藥爲耦。溼熱阻中者與黃連爲耦。以柴胡能開

氣分之結不能洩。氣分之熱。芍藥能開血分之結。不能清。迫血之熱。黃連能治。溼生之熱。不能治。熱生之溼。譬之解鬥。但去其鬥者。未平其致鬥之怒。鬥終未已也。故黃芩協柴胡。能清氣分之熱。芍藥能洩迫血之熱。黃連能解熱生之溼也。

汪按前方人解。不過望文生義。必如鄒氏諸條。始覺有味可咀矣。

黃芩加半夏生薑湯十

原方加半夏半升生薑三兩煮服法同前

鄒潤安曰。嘔而脉數口渴者。爲火氣犯胃。不宜加此。

雄按章杏雲云。生薑性熱。僅能治寒。不可泛施於諸感也。

梔子豉湯十一

梔子

十四枚

香豉

四合綿裹

水四升。先煮梔子得二升半。內豉煮取升半。去滓。分爲二服。溫進一服。得吐止。後服。

徐洄溪曰。此劑分兩最小。凡治上焦之藥。皆然。按此湯加減七方。旣不注定何經。亦不專治何誤。總由汗吐下之後。正氣已虛。尙有痰涎滯氣凝結上焦。非汗下之所能除。雄按溫暑濕熱之證。



南京中醫藥大學圖書館版權所有