

千金方衍義

卷之三

四

孫真人千金方衍義卷二十三

長洲張璐路玉著

南沙席世臣郢客校

痔漏方

凡五類

九漏第一

論一首

灸法十六首

方八十三首

論曰夫九漏之爲病皆寒熱瘰癧在於頸腋者何氣使生此皆鼠瘻寒熱之毒氣堤畱於脈而不去者也鼠瘻之本皆根在於臟其末上出於頸腋之上其浮於脈中而未著於肌肉而外爲膿血者易去去之柰何曰請從其末引其本可使衰去而絕其寒熱審按

其道以予之徐往來以去之其小如麥者一刺知三
刺已決其死生奈何曰反其目視其中有赤脈從上
下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二
脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲死赤脈
不下貫瞳子者可治也

凡項邊腋下先作瘰癧者欲作漏也宜禁五辛酒麵
及諸熱食凡漏有似石癰累累然作瘰癧子有核在兩
頸及腋下不痛不熱治者皆練石散傳其外內服五
香連翹湯下之

二方並見二十卷癰疽門

已潰者治如癰法諸

漏結核未破者火鍼鍼使著核結中無不瘥者何謂

九漏一曰狼漏二曰鼠漏三曰螻蛄漏四曰蠱漏五
曰蚍蜉漏六曰蟻蟪漏七曰浮沮漏八曰瘰癧漏九
曰轉脈漏

空青商陸散 治狼漏始發於頸腫無頭有根起

於缺盆之上連延耳根腫大此得之憂恚氣上

不得下其根在肝一作肺空青主之商陸爲之佐

方

空青

蝟腦各二分

蝟肝一具

商陸

獨活

黃芩

當歸

乾薑

婦人蓐艸

驚甲

蟹螯

地膽

茴香

礬石

芎藭

蜀椒

三十粒

各一分

半分

右十六味治下篩酒服方寸七日三服十五日服之

衍義

嘗讀內經僅有鼠瘻寒熱而無九漏之名詳推受

病之源多由憂患所致屬於肝腎居多再參千金瘰癧一一定名何漏因於何病屬諸何臟言雖鑿鑿不無砭砭混玉之疑如狼漏之毒根於肝而用空青商陸散首取空青利竅通津佐以商陸利水

導氣然在始病元氣未漓者庶爲合宜更取蝟肝
蝟腦入肝追毒蟄蝟地膽攻堅破血礬石滌除腐
穢一皆瞑眩之藥其餘芎歸苓獨蠶甲茴香椒薑
之屬藥雖稍平不過爲空青等味之助力至用蓐
草其義未詳

狸骨知母散 治鼠漏始發於頸無頭尾如鼯鼠
使人寒熱脫肉此得之食有鼠毒不去其根在
胃以狸骨主之知母爲之佐方

狸骨

知母

桂心

鯪鯉甲

山龜殼

雄黃

甘艸

乾薑 等分

右八味治下篩飲服方寸七日三仍以蜜和內瘡中無不瘥者先灸作瘡後以藥傅之已作瘡不用灸

衍義

狸專捕鼠鼠漏用之每效故用狸骨佐以知母龜殼鯉甲薑桂雄黃都是腎家辟除邪毒之藥方下雖言其根在胃而後方之用鼠灰亂髮地黃膏傅並屬腎藥恐是腎字之誤亦未可知以二字形頗相似也

治鼠漏方

用蛇虺所吞鼠燒末服方寸七日二不過三服
此大有驗但難得耳并傳瘡中佳

又方

死鼠

一枚中
形者

亂髮

如雞子
大一枚

右二味以臘月猪脂煎令消盡膏成分作二分一
分稍稍塗瘡一分稍稍酒服之瘡鼠子當從瘡中
出良

地黃膏 治鼠漏瘡瘰復發及不愈出膿血不止

方

以不中水猪脂咬咀生地黃內脂中令脂與地

黃相淹和煎六七沸其瘡先用桑灰汁洗去惡

次以地黃膏傳上日一易

^{衍義}衍義并見狸骨知母散內

荏子桔梗丸 治螻蛄漏始發於頸項狀如腫此

得之食瓜果實毒不去其根在大腸荏子主之

桔梗爲之佐方

荏子 龍骨 各半兩 附子 一兩

蜀椒 百粒 桂心 桔梗

乾薑 礬石 獨活

芍藥 各一分

右十味爲末以棗二十枚合搗醋醬和丸如大豆

溫醬下五丸加至十丸

衍義

荏子芳香遍達肺氣佐以桔梗開提胸膈更兼椒

薑桂附辛溫破結獨活芎藭祛風活血礬石滌垢

龍骨收津使不隨辛溫耗散深得散中寓斂之義

雄黃黃芩散 治蜂漏始發於頸瘰癧三四處俱

相連以潰此得之飲流水中有蜂毒不去其根

在脾雄黃主之黃芩爲之佐方

雄黃

黃芩

各一兩

蜂房

一具

茴香

吳茱萸

乾薑

各半兩

蜀椒

二百粒

鱉甲

一枚

右八味治下篩傳瘡口上日一度十日止

〔衍義〕

蜂漏用雄黃黃芩解毒清熱仍取蜂房助之其餘

椒薑茺菜輔雄黃以破陰毒鱉甲輔黃芩以泄旺

氣此雖外治之方未嘗不可內服

礞石防風散

治蚬蜉漏始發於頸初得之如傷

寒此得之食中有蚬蜉毒不去其根在腎礞石

主之防風爲之佐方

礞石

防風

知母

雌黃

桃白皮

乾地黃

獨活

青黛

盤螯

白芷

松脂

一作柏脂

芍藥

海藻

當歸

各二分

白朮

蝟皮

各四分

蜀椒

百粒

右十七味治下篩飲服一錢七日三

衍義

本經言礪石治寒熱鼠瘻死肌風痺腹中堅癖邪

氣諸臟腑經絡無不達之佐以防風開泄風熱其

外諸味分解各經原不專主腎病若言得之食中

未嘗不傷在胃亦未可確指虵蜉也

礪石白朮散

治瘰癧漏始發於頸下無頭尾如

棗核塊累移在皮中使人寒熱心滿此得之因
喜怒哭泣其根在心礬石主之白朮爲之佐方

礬石

白朮

空青

當歸

各二分

細辛

一兩

蝟皮

蟬蛻

枸杞

地膽

各一分

乾烏腦

三七豆許

右十味爲末以醋醬服方寸七日三病在上側輪
臥在下高枕臥使藥流下

衍義

礬石專除氣分之垢膩佐以白朮專理氣分之津

液餘皆散堅利竅之品惟乾烏腦專於截風然其

病得之喜怒哭泣則肝與肺未必無預則不獨在心矣

地膽甘艸散 治浮沮漏始發於頸如兩指使人

寒熱欲臥此得之思慮憂愁其根在膽地膽主

之甘艸爲之佐方

地膽 雄黃 乾薑

續斷 石決明 菴藷根

龍膽艸 各三分
甘艸 一分
細辛 二分

大黃 半分

右十味治下篩傳瘡日四五度
古今錄驗無雄黃有硫黃

衍義

本經言地膽治鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎其破血辟毒之力最猛甘艸之佐非助其力解其毒耳其餘諸味雖寒熱醋雜不出解散之意以浮沮病不在裏僅用外傳足矣

雌黃芍藥丸 治瘰癧漏始發於頸有根初苦痛

令人寒熱此得之因新沐濕結髮汗流於頭所致其根在腎雌黃主之芍藥爲之佐方

雌黃

芍藥

茯苓

續斷

乾地黃

空青

礬石

乾薑

桔梗

蜀椒

恒山

虎腎

狸肉

烏腦

蟹螯

礬石

各一分

附子

一兩

右十七味爲末蜜丸如大豆酒服十九日二

衍義

新沐中風則爲首風新沐受濕濕著於腦則爲癰

瘕日久不散失其陽和蘊毒而成其漏故用雌黃

陰毒之物以破陰毒之結佐以芍藥除血痺破堅

積此本經主治專取養營之功以和失調之血則

痺自開積自散矣其餘虎腎狸肉烏腦蟹螯截風

解毒礬石空青附子恒山破結開痰專賴芍藥以

固陽根之力

蟹螯白芷丸

治轉脈漏始發於頸濯濯脈轉若

驚惕身振寒熱此得之因驚臥失枕其根在小

腸集驗作心蟹螯主之白芷爲之佐方

蟹螯

白芷

綠青

大黃

各二分

升麻

鍾乳

甘艸

防風

地膽

續斷

麝香

礬石

各一分

人參

當歸

桂心

各二分

白朮

麥冬

各一兩