

同壽錄卷四

外科

外科者。病受於中。症發于外。大則爲腫毒。小則爲瘡疥。痛苦呻吟。有形可指。有迹可見。以其顯明昭著。發露于外。非如內症之纏伏于內者。比故以外名之。然外之所發。必由于中之結積而成。治之之法。固宜合內外以爲功者也。集外科方。

瘍科要方

慈雲丹

一名紫霞丹

治一切無名腫毒。用酒頓化調服。蓋被取汗。

未成者卽消。已成者出毒卽愈。外科第一妙方也。用血竭春碎研

劉寄奴炒磨研天竺黃炒研大戟炒晒研乳香六錢去油研雄精研兒茶

四兩歸尾三兩麝香去皮毛淨真琥珀打碎全燈草水粉研

六錢藤黃八兩右藥照方配足細末篩淨加水銀六錢朴硝二兩全

死水銀用好黃蠟四十八兩銅鍋鎔化去渣煉淨滾湯坐定將

藥入內不住手攪極勻收貯不可出氣如無真天竺黃以九轉

胆星六兩又加醋炙瓦壘子二兩代之為丸每丸重五分

真人活命飲治一切無名腫毒諸般惡瘡及癰疽發背服之神

效用川山甲蛤粉炒黃甘草節真沒藥防風白芷天花粉赤芍川貝

皂角刺各六分當歸尾乳香各一錢陳皮金銀花各二錢用無灰好酒

三碗煎服毒在上食後服在下食前服服後再飲酒數杯

梅花點舌丹 治一切疔毒惡瘡初起。天行瘟毒。咽喉腫痛諸症。

輕者二粒。重者四粒。先用無根水送下。次以一粒噙于舌下化。

之用乳香沒藥各去油三錢珍珠八分京牛黃二錢硃砂雄黃礞砂血竭

苦亭麝蟾酥人乳拌各二錢熊胆六分片腦一錢沉香一兩麝香六分共為末。用

人參汁丸如黍米大。金箔為衣。密貯待用。

萬靈奪命丹 治一切疔瘡毒氣入腹。煩悶惡心。并癰疽發背惡

瘡等症。神效。用硃砂水飛胆礬各五錢血竭銅綠各一兩雄黃枯礬各二

兩輕粉蟾酥人乳製各五錢共為細末。麪糊丸芡實大。每服一九。令病

人先嚼葱白三寸吐在手心。將藥放入裏面。熱湯送下。有汗即

愈

七聖回疔散 治一切疔瘡挑破見血點藥立愈用硃砂雄黃火

硝礪砂青鹽礪砂胆礬各等分研細末點之

拔疔散 治諸疔瘡其硬如石或發寒熱及腐肉不化一切痘疔

不能化漿將銀簪挑破將藥點入外用膏藥貼之其疔卽化爲

水毒氣不入心矣用穿山甲一錢銀硃五錢麝香三釐共研細末收

貯磁瓶內勿令洩氣臨症用之

內消丸 治一切腫毒止痛神效用雄黃研細一兩滴乳香炙去汗研細一兩

蟾酥二分酒煎化和飯研如泥入前藥爲丸如梧子大每服八丸

葱白煎湯送下 又方治一切癰疽發背瘰癧疔瘡漏瘡衛護

心膜驅解諸毒自然內消用徹明礬生用二兩爲末黃蠟一兩

二錢鎔汁。就爐上入礬拌和。衆手丸如梧子大。每服十五丸。溫水或冷酒下。數服覺痛卽止。漏瘡用雞肫內黃皮爲末塞孔。

又方治一切癰疽發背。疔瘡魚口。無名腫毒。諸般惡瘡。但未成膿。一服卽消。活人甚衆。用白礬末三錢。以飯少許同搗爲丸。葱白七根煎湯送下。少頃再吃葱湯一碗服之。將被周身蓋定。立愈。雖味澀難服。其效如神。凡居鄉邨不及請醫者。傳此方服之。屢驗。凡一切腫毒瘡癰。以皮紙蘸礬水頻頻搭患處。立消。

神授衛生湯 治一切腫毒。無論大小已未成膿。癰癰通治俱效。

川羌活

八分 象牙五錢

共爲細末。黃蠟四兩溶開。入魚膠攪勻。再和

入藥末。丸如梧子大。每服三十丸。空心酒下。

鐵箍散

圍諸腫毒神效。用大黃

三兩白芷

二兩川烏草烏南星半夏

黃柏白芨白薇

各一兩

五倍子

一兩五錢

小粉

四兩要酸臭者醋炒

共為細末。米

醋調勻。周圍箍轉。留出頭。

圍毒散

治諸腫毒。圍敷神妙。用大黃

五錢

木鱉子

三錢土炒

共為細末。

真米醋調敷患處。留出頭。

生肌散

寒水石

火煨四兩

加黃丹

一兩水飛過炒之

共為細末。

研至無聲。搽

患處妙。

又方牡蠣

去粗皮淨二兩

水粉

一兩五錢

入牡蠣煮炒乾。加生礬

三分又加水粉

五錢生用

共為末。研極細。瘡口不合者。搽上立效。或外

又加冰片少許。麝香亦可。

生肌玉紅丹

治一切瘡毒不收口者。用黃丹

二錢炒

白龍骨

二錢煨

石羔三錢共研細末。參之。

三仙丹 治一切癰疽毒陷。用火硝研明礬水銀同硝礬和各

一兩。入有耳廣鍋內。先憂火溶化。冷定。用大碗一隻。蓋鍋上。以

石膏鹽泥封固碗口。先以憂火一炷香。次以武火一炷香。次以

文火一炷香。煉畢。取起。冷定。緩緩開封。收取丹藥。加冰片一錢

細研和勻。貯磁瓶內。如欲提膿。參膏藥上貼之。欲收口。參毒上

即愈。凡行外科救世者。必用之。此即昇丹也。煉時忌婦人雞犬。

五虎丹 治毒久不收口。并成管多年。立效。用前方三味。加硃砂

三錢。同研細和勻。煉法如前。用以去管。將紙撚裏藥。打入

提膿。漸漸自愈。

獨將丸 治腫毒不破頭。用黃蠟不拘多少。溶化爲丸。好酒吞服。

過時卽出。又方胆礬不拘多少。研末。飯丸。葉豆大。硃砂爲衣。按膏貼

之。

二將丸 治腫毒護心。用黃蠟兩白礬兩一溶化爲丸。青黛爲衣服。

之保無他虞。

金銀花酒 治一切癰疽惡瘡。不論發在何處。或肺癰腸癰。初起

便服奇效。凡諸瘡毒服之俱妙。用金銀花五兩。乾者亦可。生者力速。甘草兩

水二碗煎一碗。再入酒一碗。畧煎。分三服。一日一夜服盡。服至

大小腸通利。藥力已到外。用生者搗爛。酒調敷毒四圍。妙。

神功急灸法 治發背及一切無名腫毒等症。用乾麩做一條子。

圖在腫毒紅處。約高寸許。其中以白蠟削薄片填滿。用熨斗火烘化蠟。待熱氣入內。如痛灸至不痛住。不痛灸至痛住。俟蠟變黑。則毒盡矣。此法爲治腫毒之妙訣。取效最爲神速。又法治

一切發背癰疽疔腫惡毒。無問陰陽表裏。但初覺赤熱疼腫。或有小瘡作癢之極。或漫腫無頭。但未潰以前。俱宜速灸。多灸拔毒氣。隨手見效。此法不問富貴貧賤。大有起死之功。先將大獨蒜切片。如三文錢厚。安于瘡頭上。用大艾炷放蒜片上灸之。三壯換一蒜片。痛者灸至不痛。不痛者灸至極痛。痛者灸至癢。癢者灸至痛。方住。若不依此法。則反爲大害。切記切記。若漫腫不見毒頭。先以溼綿紙覆腫處。看其紙何處先乾。卽是毒頭。

安蒜灸之。如瘡有數十頭一處者。用蒜搗爛作餅子。鋪瘡頭上。餅上鋪艾灸之。蒜敗再換。如瘡色紫及白而不起發。不作膿之陰毒。不拘日期。尤宜多灸。如隔蒜灸全不知痛癢。卽去蒜于肉上明灸之。必須灸至痛甚爲效。此爲火氣方得入裏。知痛深處方是好肉。蓋艾火引拔鬱毒透通。陰陽使內毒有路而外發。誠爲瘍科第一法也。大概毒輕者灸三四十壯。毒勢深重者以百壯爲度。萬物怠忽。自取危困。灸時如無獨蒜。用大蒜瓣切片。灸亦可。無蒜以生薑切片代之。灸後其瘡卽發腫潰。外以好膏藥貼之。不日而安。見效如神。惟頭上生毒及腎俞穴生毒并元氣大虛之人。慎勿輕灸。不可不知。

癰疽

治癰疽發背欲死。用東瓜去蓋。合瘡上。瓜當爛。削去。又合之。分散熱毒。瓜未盡。瘡已斂小矣。卽用膏藥護之。此法甚妙。又癰疽發背大如盤。臭腐不可近者。用泡桐葉醋蒸貼之。退熱止痛。漸生肉收口。極驗。又發背灸法。用小麥麴作條。圍瘡口。再用杏仁去皮尖。研爛。填滿。熟艾作薄餅。如圍大。四面點火灸之。艾三餅完。黃水出卽消。

治癰疽發背初發腫。便以紙一張。水浸溼。搭腫上。視其上一點。先乾者。卽是正頂。先以水和麴作圈。安于正頂上。卻用大螞蝗一條。安于中。頻以冷水灌之。螞蝗當吮其穴。膿血出毒卽散。如毒

大蝗小。須用三四條。若吮著正穴。蝗必死。用水救活。血不止。以藕節研爛塗之。茅草花亦好。又方用大薊根不拘多少。淨洗切碎。研如膏。塗瘡上。初發者能消散。已成者速潰。又方牛皮膠二兩。酒二斤。同煮候溶化。放溫。令病者徐徐飲盡。未結成者。卽消。已潰易瘥。

治癰疽不消。已成膿不得破。用蠶繭出過蛾兒空殼一箇。燒灰。酒調服。

治背疽用瓜萐一箇。乳香沒藥各五錢。甘草三錢。陳好酒煎服。愈。治便癰用皂角不蛀者。燒過陰乾爲末。酒調服。或用皂莢子十粒。水服之。又用皂莢炒黑。小粉炒等分。和勻。以熱醋調。仍以紙攤。

貼患處頻頻水潤之。又方胡桃仁七粒燒過陰乾爲末酒調服之。

治男子陰頭癰。鷺甲爲末雞子清調敷。

治肺癰吐膿血。用白芨研細末每服三錢調真藕粉內吃。不須三五兩卽愈。或燉蛋膏或入粥中吃俱可。又方芥菜瀝陳埋地

下三年者飲之。或作醬油入菜吃。又綠橘葉洗搗絞汁一盞服之。吐出膿水卽愈。

治婦人乳癰。用赤小豆三合研爛去渣溫服。畱渣敷患處。

研用酒

又方螳螂小脚尖陰陽瓦焙乾爲末每服三錢酒下。盡量飲。蓋被出汗。又方生半夏一箇同連鬚葱白一根搥爛綿紙二層

捲左乳塞右鼻。右乳塞左鼻。重者再換。又方白芥子一兩炒黃研末。白酒沖盡量飲。又方蒲公英三錢。金銀花當歸各二錢。乾葛一錢五分。用頭酒一大鍾。水一大鍾同煎。食後服。服藥後再飲酒一醉出汗。又方用皂角刺燒灰和海蛤粉爲末。熱酒調下。揉散亦可。

治乳癰爛見心者。用貓腹下毛乾鍋內煨。存性爲末。乾糝或清油調入輕粉少許敷之。又方銀杏八兩。一半酒研服。一半水研敷癰上。又方黃瓜蔓一二箇。連反瓢子切碎。以無灰酒一碗。於瓶內煮半碗去渣。時時溫服。

治乳癰外吹內吹。用海螵蛸三錢研細。酒烹盡量飲出汗。又方

半夏熟乳香各等分爲細末。左乳吹右鼻。右乳吹左鼻。又治
吹乳乳癰。立時消散。用葱一握連根搗爛。敷患乳上。用瓦罐盛
炭火。蓋葱上一時蒸熱出汗。卽消。又方金銀花蒲公英各一
兩。酒水煎服。以渣熱敷患上。卽思睡。睡醒卽消。亦治蛇頭瘡。
治吹乳乳癰初起。用鹿蔥花根。蒲公英。金銀花。防風。酒水各一碗。
煎八分。空心服出汗。

治乳勞乳癰。已成者化膿爲水。未成者卽消。用瓜蒌二箇。大而紅
活者搗碎。甘草當歸酒洗各五錢。另研乳香沒藥各一錢。作二
劑。酒三碗。煎二碗。飲以渣乘熱敷患處。亦治癰瘰。

治乳硬作痛。用嫩桑葉左採研細。米飲調攤紙上貼病處。此症四

十以下可治。五十以下不可治。治之則死。不治則得終天年。

治兩乳黑頭陷頂。用升麻葛根連翹當歸身黃柏各二錢。黃芪三錢。肉桂五分。炙甘草牛蒡子各一錢。水一鍾。酒半鍾。煎一鍾。食後服。

治乳頭裂。取秋後冷露茄子裂開者。陰乾燒存性爲末。水調敷。

疔毒

治疔神驗方。凡瘡腫以針刺之。不痛無血者。疔也。或嚼生黃豆。不覺腥臭者。卽是疔毒。急用針刺破。擠出惡血。更令一人吃飽。再飲火酒數杯。口含涼水。吮盡惡血。水溫再換。吮至痛癢皆住。卽愈妙法也。又方取蒼耳草根葉搗爛。入童子小便絞汁。冷服。

一鍾。日三次。仍以根莖苗葉任取一束燒灰存性爲末。用醋泔藍靛和如泥。先將瘡中心及四邊刺破。令血極出。拭盡敷之。不過十次。卽拔根出。爲諸方第一。又方用生蜜與隔年葱一處同研成膏。先將瘡周圍以竹針刺破。然後用藥敷于瘡上。以絳帛盡覆。如人行二十里時覺疔出。然後以熱醋湯洗之。又方用白梅肉荔枝肉同搗成膏。捻作餅子。依瘡大小安上。其根卽出。

治疔瘡惡腫。用荔枝五箇。或三七箇。不用雙數。以狗糞中米淘淨爲末。與糯米粥同研成膏。攤紙上貼之。畱一孔出毒氣。又方用紫花蒂丁一大劑。水煎熱服。