


33

4

長沙方歌括

長沙方歌括



南京中医药大学图书馆版权所有

長沙方歌括



中国中医大学图书馆版权所有

醫病順其自然說

病人之吉凶禍福寄之於醫。醫者之任重。然權不操諸醫。而操諸用醫之人。何也。人有未病。庸醫束手無策。始求救於名醫。名醫入門診畢。告以病從何來。當從何去。得那一類藥。而增劇者。何故。得那一類藥。除去那一病。而此外未能盡除者。何故。病勢雖豐。稍愈。一二日。仍作或逾一二日。而更甚於前者。又何故。一一為病家說明。定其如此。救誤。如此。溫清攻補。如此。按法立方。服藥後。必見出何證。又見出何證。則向愈。預斷其愈於何日。何時。病家能一一信其言。而不疑。且架中不藏本草。備要。醫方。集解。萬病回春。本草綱目。東醫寶鑑。馮氏錦囊。赤水元珠。薛氏醫按。景岳全書。石室秘錄。辨證奇聞。臨症指南之類。又無強不知以為知之親友。與依阿兩可。素稱果子藥之先生。朱紫不亂。則名醫得以盡其。所長。傷寒卒病。二三日可愈。最遲亦不出十八日之外。風癆臌膈。一月可愈。最遲亦不出三月之外。否則。病家疑信參半。時醫猶可勉強從事。俟其病氣衰而自愈。若以名醫自命者。斷不可肩此重任。反致取怨敗名。余因熱腸而備嘗其苦。凡我同志可以鑒。此前車。今之方技家。恃在口給。見有同我者。引之互相標榜。遜我者。亦不却之。臨深為高。至於窮本草經。讀靈素法。仲景其立論為耳。所未聞其治效。又目所僅見。遂謙讓曰。我不能如此之神。亦不如此之偏。以取勝也。若輩造此偏之一字。任令法高一丈。其奈魔高十丈。且謂古書不可以今用。即於多讀書處。謂其偏起死證。而生之。即以出奇入險。目其偏以致病家先。

人為主廣集不偏之醫歷試罔效不得已始延為破釜沉舟之計究竟終疑其偏麻桂硝黃則曰汗下之太過也薑附芩連則曰寒熱之太峻也建中理中陷胸十棗則曰補瀉之不留餘地也滋水之地黃補元之人參用應多而反少日食之棗子至賤之甘草用應少而反多此等似是而非之言更甚於恣肆不論於理之言知幾者正可以拂衣而去乃猶曰病尚可為不忍恝然而舍之此雖活人無已之心而疑事無功未能活人且以誤人蓋藥之所以流行於經絡藏府內外無有不到者氣為之也氣不自到心氣主之胆氣壯之也彼既疑我為偏一見我之用藥又出於意想之外則心氣亂內經云心者君主之官也神明出焉又云主不明則十二官危是也不獨心氣亂而且膽氣亦因之而怯內經云膽者中正之官決斷出焉又云十二經皆取決於膽是也藥乃草根樹皮及一切金石之鈍物原藉人之真氣以流行今心氣亂而妄行膽氣怯而不行如芩連入口其熱性隨其所想而行旋而皮毛鼓慄而寒狀作矣薑附入口其熱性隨其所想而行旋而心煩面赤而熱狀作矣凡此之類不過言其大畧不必淋漓痛切而再言之其中之所以然者命也我亦順其自然而已矣又何必多事為凡我同志者能以余為前車之鑒則適愈彰而活人愈衆

徵引一

傷寒論平脈法第十三節問曰脈有災怪何謂也師曰假令人病脈得太陽與形證相應

因為作湯比還送湯如食頃病人乃大吐下利腹中痛師曰我前來不見此證今乃變異是名災怪。問曰何緣得此吐利答曰或有舊時服藥今乃發作故為災怪耳程郊倩注曰望聞固醫家之事亦湏病家毫無隱諱方能盡醫家之長因復出此條為病家服藥瞞醫之成災因自作而反怪及醫故曰災怪然更有怪災病不可不知得仲景法處仲景方病家大怪以示諸醫益頭腦吐舌而大怪乃從其不怪者治之輕者劇重者死而災及其身終不解其病謂何病此病近日竟成疫沿門漸染仲景却未言及想仲景時祇有怪怪病尚無怪災病耳。一喙 按程郊倩謂怪災病孽不在庸醫之好造謠言而在病家之貴毋賤目執俗本之本草查對名醫之處方執俗本之妄語敗駁名醫之治法以致名醫難息而不與辨決然而去豈非災由自取耶憶戊辰春李太守名符清患氣短病余主以桂苓甘朮湯與腎氣丸間服許以半月必效旋有所聞驚怪而阻另延津門陶老醫服葶苈杏仁枇杷葉木通之類二十餘劑脹腫瘡閉而逝候補知縣葉名鈞偶患咳嗽微發熱小便不利余曰小青龍湯一服可效渠怪而不服另延姑蘇葉天士之族姪診之說水不制火大氣刑金日以也黃兩許麥冬阿膠枇杷葉貝母之類為佐二十餘日後與余相遇於北關官廨自言咳嗽已愈惟早起氣覺短促餘無他病余察其面部皮裏膜外伏青黯之色圓口尤甚按其脈數而弦芤重按之散而無神遂直告之曰此羣陰用事陽光欲熄之候宜拋去前藥以白朮附子濃煎調生姜自然汁半杯六七服尚可急救葉公以余言太激

而不答。是晚自覺倦怠異常。前醫仍用熟地一兩。黨參五錢。枸杞麥冬阿膠各三錢。杜仲酒芍當歸各二錢。炙甘草一錢。服之次早。神昏不語。痰涎如湧。渠胞弟驚告余曰。前言
綫殘陽扶之尚恐不及。況以熟地等助其陰靈之氣乎。今陰靈之氣上瀉天際。痰涎湧盛。
狀如中風。蓋以肝為風木之臟人。當東方生氣將脫之頃。往往外呈此象。其實與少風無
與也。診其脈弦數散亂。三五不調。余直辭不治。次日未刻果歿。庚午秋七月。前任天津尹
丁名攀龍過余旅寓。見其面上皮裏黧黑。環唇更甚。卧蚕微腫。鼻上帶些青色。余直告之。
曰。君有水飲之病。根挾肝氣而橫行無忌。此時急療可愈。若遲至二十日。病一發作。恐醫
日多方日雜總不外氣血痰鬱四字。定出搔不着癢之套。方即有談及水飲緩治以六君
二陳加減峻治以滾痰黑錫專行此敷衍題面而題理題神則盡錯矣。以藥試病試窮而
變計。雖盧扁莫何。丁君心怪言之過激。弗聽至七月下旬病作。中秋後漸重。九月下旬邀
診。余告之曰。向者所陳之弊。今一一蹈之前。說明病發後毋庸用藥。非自今推謾然無中
生有之治法。惟金匱咳嗽篇用十棗湯云。放家其脈弦者有水此主之。又云。支飲家效滿
胸中痛者不卒死。至一百日及一歲亦宜用此湯。推病根成於舊歲。冬初未及一歲且病
發止六十餘日。尚在百日之內。喻嘉言醫門法律。放嗽續論篇言之甚詳。俟有識有膽者
用之而余則不能坐中有一老醫力爭不可。余姑擬龍牡甘苓行水化氣等藥而去。遂不
復延嗣。余奉委到高陽辦理振務。間渠延醫滿座。日以熟地杜杞葉炮姜附子肉桂人參。

服之不斷漸至大喘腫脹吐血大衄耳目俱出血小水全無而歿此皆怪災病之新案

徵引二

張隱菴曰順治辛卯歲予年四十有二八月中生一胃脘癰在鳩尾斜下右寸許微腫不紅按之不痛隱隱然如一雞卵在內姚繼元先生視之曰此胃脘癰也一名捧心癰遠宣解散否則有性命之憂與一大膏藥上加沒藥二三錢午間烘貼至暮手足蘇軟漸至身不能轉側仰卧於書齋心煩意亂屏去家人至初更時癰上起一毒氣從左乳下至肋下脇入於左腎入時如燒錐刺入眼中一陣火光大如車輪神氣昏暈痛楚難言火光漸搖漾而散神昏始蘇過半時許其氣復起其行如舊痛楚如前如此者三四次予思之此戊與癸合也然府邪入藏自分必死妄想此毒氣不從脇下入腎得從中而入於腸胃則生矣如此靜而行之初次不從二次即隨想而仍從于左乳下入于腸中腹中大鳴無從前之痛楚矣隨起隨想因悟脩養之道氣隨想而運用者也運起法大能起鼓膈之証勞怯亦妙至天明大泄數次胸膈寬疎繼元先生復視之曰毒已散解無妨事矣至次年中秋復發仍用膏藥末藥毫無前番之狀而腫亦不消予因想運氣之妙經行坐卧以手按摩意想此毒氣仍歸腸胃而出如此十餘日而散按讀此案知病家不能深信斷斷不可勉強相從且不必言及治當何法應用何方恐後到之醫矯吾言而走入錯路又恐其從吾言而還致生疑不如三緘其口之為得

徵引三

卷一 徵引三

喻嘉言寫意草云王岵翁深知醫理投劑咸中肯綮所以長年久世然苦耳嗚不樂對醫其左右侍從誰能究心醫藥之事前病獲安競以為人參之力而却禍者反得居功謂其意中原欲用參但不敢專主姑進余商榷以示詳慎耳於是善後之宜一以謾之曾不顧夫一誤再誤也前所患虛風症余用甘寒藥二劑稍效俄焉更醫而致危不得已又召余視之雖用旋覆花代赭二劑回天然則此虛風本症尚無暇于驅除而主家及醫其時反競誇人參之力謂調理更宜倍用無俟參酌獨不思虛風醞釀日深他日更求良治不能及矣余向為岵翁視病言無不聽獨患此大病竟不樂與交談且日來喜食羊肉河豚以召風然亦不自由也蓋風煽胃中如轉丸之捷食入易消不得不借資于厚味而不知胃中元氣久從暗耗設虛風止熄即清薄之味尚不易化況於肥甘乎今之醫家全不究病前病後消息明語以虛風之證竟不知虛風為何物奈何言醫耶奈何言調攝耶彼時余適有浙遊旋日復得重恙召診時語余云一病幾危今幸稍可但徹夜撰改本章不輟神亂奈何余對曰胃風久熾津液乾槁真火內燔宜用知母一兩人參甘草各一錢日進二劑自安衆議方中用參太少且無補藥佐之全無取義竟置不用連進參朮大劑不效越三日劑中人參竟加一兩服後頃刻氣高不返而逝 按讀此案以自知醫理與平時心服之人忽為時醫蠱惑侍從尼阻竟至不能用而死可知命之所定非人力所能主也嘉

言既盡其道可告無罪於王岐翁而人言不足卹也余因之有感焉天下事事後易為智大病一愈邀功者議補議溫紛紛不一以致既愈之後仍留遺患者有之垂成忽敗者有之夫大病自我愈之而善後之計不復一商者其故有二一以勝任有人也一以酬謝可免也偷薄之風適以殞命堪發一歎

致二章

錢天來云漢之一兩即今之二錢七分也一升即今之二合半也汪苓友云古云銖者六銖為一分即二錢半二十四銖為一兩也云一升者即今之大白盞也古方全料謂之丸劑三分之一謂之一服凡用古方先照原劑按今之碼子折實若干重古方載三服者只取三分之一遵法煎服載兩服者宜分兩次服之頓服者取一劑而盡服之只要按今之碼子折之至大棗烏梅之類仍照古方枚數以碼子有古今之不同而果枚古今無異也程扶生云古以二十四銖為一兩一兩分為四分六銖為一分計二錢五分則所謂十八銖者蓋三分之重古之七錢半也然以古今量度及秬黍致之以一千二百黍之重實於黃鐘之龠得古之半兩今之三錢也合兩龠為合得古之一兩今之六錢也十銖為一千泰之重今之二錢半也一銖為百泰之重今之二分半也或又謂古今量度惟漢最小漢之一兩惟有今之三錢半強故千金本草以古三兩為今一兩古三升為今一升然世有古今時有冬春地有南北人有強弱大約古用一兩今用一錢足矣宜活法通變不必膠

柱而鼓瑟則為善法仲景者矣

愚按諸說頗有異同大抵古之一兩今折為三錢不泥於古而亦不離於古也



南京中医药大学图书馆版和所有
南京中医药大学图书馆

勸讀十則

一凡積重難反之勢。聚奪其所好。世必驚疑。今且淺而商之。明藥性始於神農本經。論病情始於靈樞素問。以藥治病。始於伊尹湯液。迨漢仲師出。集伊聖及上古相傳之經方。著傷寒論及金匱玉函經二書。外臺謂又有小品一書。今失傳。方諸舉業家與四子書無異。而猶有疑之者。豈四子之書亦不可讀乎。則以讀仲師書為第一歟。

一仲師書文義古奧難讀。即劉張朱李四家。

明時以張長沙與劉河間李東垣朱丹溪爲四家。此李士材之誤也。張石頤云：張是張文

和當知相沿之誤雖尊仲聖之名。鮮有發揮。更有庸妄者。顛倒是非。謂仲師專工於傷寒。其桂枝麻黃只行於西北。宜於冬月。以芍蘇羌獨荆防等劑為感冒切用之品。以補中歸脾八珍六味等方。為雜病平穩之方。百病不究根由。只以多熱為陰虛。多寒為陽虛。自誇為挈領提綱之道。究竟僞術相師能愈一大病否。夜氣猶存。舉平生所治之證。平心自問。當亦知所變計也。則以知過必改為第二勸。

一經方效如桴鼓。非若後世以地黃補陰。以人參補陽。以香砂調氣。以歸芍調血。籠統浮汎。待病氣衰而自愈也。內經云。一劑知。二劑已。又云。覆杯而卧。傷寒論云。一服愈。不必盡劑。可知古人用藥除宿病痼病外。其效只在半劑一二劑之間。後世如薛立齋醫案云。服三十餘劑。及百劑效。李士材云。備參五斤。期於三月奏效。此豈果服藥之效哉。乃病氣衰而自愈。若輩貪天之功而為己力也。余閱其案。深憫病人之困。於藥甚於桎梏。

也則以經方之療效神速為第三勸

一傷寒論一百一十三方以存津液三字為主試看桂枝湯和平解肌無一非養液之品即麻黃湯輕清走表不加薑之辛熱棗之甘壅從外治外不傷營氣亦是養液之意故統製一劑分為三服不必盡劑可愈愈後亦無他病近醫芍蘇羌獨荆防蒼芷苦燥卑烈大傷陰氣最陋是吾閩習氣謂二陳湯為發汗平穩之劑方中如陳皮之耗氣半夏之耗液性濤如血出不止以此藥生搘敷之則止血即止汗之驗茯苓滲利太早致邪陷入少陰皆所以涸其源此二年方悟十留邪生熱以致變成煩躁大渴譖語神昏等症所謂庸醫誤人者此也至於金匱一百四十三方大旨是調以甘藥四字後世之四君子湯補中益氣湯及四物八珍十全歸脾逍遙等劑頗得甘調之意而偏駁不馴板實不靈又不可不知則明經方之有利無害為第四勸

一仲景為醫中之聖人非至愚孰敢侮聖所疑者其方也方中無見證治證之品且銖兩升斗畏其大劑不敢輕試不知本草亂於宋元諸家而極於明之李時珍能讀本經洞達藥性者自知其三四味中備極神妙況古人升斗權衡三代至漢較之今日僅十之三每劑分三服一服亦不過七八錢與兩零而已較之時方之重者乃更輕今以古今之碼子折算又為之淺淺解釋俾知經方道本中庸人與知能為第五勸
一先人為主人之通患也桂枝湯小柴胡湯無論傷寒雜病陽經陰經凡營衛不和者得

桂枝而如神。邪氣不能從樞而外轉者得柴胡而如神。今人惑於活人春夏忌桂之說。又惑於前醫邪在太陽誤用柴胡反致引入少陽之說。及李時珍虛人不可多用。張景岳製五柴飲列於散陣。遂致應用不用。誤人無算。而不知二藥神農列之上品。久服可以却病延年。今之信各家而不信神農誠可怪也。閩醫習見余用桂枝湯萬無一失。此數年來自三錢亦用至八九錢而效者咸知頌予創始之德。至於柴胡不過四錢而止。而浙江省江蘇每用必以蠶血拌蒸。最多不過二錢。皆先人之說誤之也。不知長沙亦柴胡用至八兩。取其性醇。不妨多服。功緩必須重用也。本經崇原云柴胡出於銀州者佳。今肆中另有一種銀柴胡。不知何草之根害人不淺。推之細辛五味用不過一錢。大棗不過二枚。生姜不過二片。種種陋習。皆違經旨。吾願同事者先進去市中徇人惡習。而以愈達愈上為第六勸。

一起死回生醫之道也。如醫家束手。病家待斃。察其為雜法所誤。先與病家說明。璧其方資。愈不受謝。照仲師法。四逆白通以回陽。承氣白虎以存陰。助其樞轉。運其針機。臟腑調和。統歸胃氣。危急拯教。不靠人參。此一句為病家之腦後下一針也。經方無用參為救急法。惟霍亂有理中丸湯方然汗厥脈微欲絕以通脈四逆加猪膽湯為主。又無取乎人參第不可與讀薛氏景岳等書人說也。力肩其任。亦可救十中二三。余自臨証三十餘年。知經方之權。奪造化為第七勸。

一經方愈。讀愈有味。愈用愈神奇。凡日間臨症立方。至晚間一一於經方查對。必別有神。

悟則以溫故知新為第八勸

一醫門之仲師即儒宗之宣聖凡有闡揚聖訓者則遵之其悖者則砭之障川東流殊在吾輩如四家中劉河間書雖偏苦寒尚有見道之言朱丹溪雖未究源頭却無支離處張子和瑕瑜參半最下是李東垣豎論以脾胃為主立方以補中為先徇其名而亡其實燁然刲陰毫無法度嘗致醫論中載其人富而好名巧行其術邪說流傳至今不息正與仲師養津液及調以甘藥之法相反不可不知至于李時珍王宇泰之雜李士材之淺薛立齋之庸趙養葵之妄張景岳陳遠公馮楚瞻之浮誇影響不使一字寓自方可入於精微之奧坊刻汪認庵等本雖云耳食却有一二道得着處但於仲師方未雜引陶節庵諸輩臆說不無朱紫之亂入門時始參其說終為鄉愿矣則以專一不雜為第九勸

一亞聖有云予豈好辯哉不得已也今醫學各成門戶所藉乎明先聖之功溯委窮源不絕於口貽陷溺未久及穎慧過人者自必悔而就學道不孤矣若言之過激則怨而生謗位置太高則畏而思避躊躇獨行濟人有幾凡我同人務宜推誠相與誠能動物俾此道日益昌明則以有言無隱和氣可親為第十勸

長沙方歌括目錄

卷之一

序文

醫病順其自然說

攷二章

徵引三條

勸讀十則

目錄

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

卷之二

太陽方

白虎加人參湯

桂枝二越婢一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

四逆湯



葛根加半夏湯

麻黃湯

葛根芩黃連湯

桂枝加厚朴杏仁湯

小青龍湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

乾薑附子湯

桂枝甘草湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

芍藥甘草附子湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

五苓散

茯苓四逆湯

卷之三

太陽方

梔子豉湯

梔子生薑豉湯

梔子乾薑湯

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯

梔子甘草豉湯

梔子厚朴湯

真武湯

小建中湯

桃仁承氣湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝加桂湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

抵當湯

抵當丸

大陷胸丸

大陷胸湯

文蛤散

白散

卷之四

太陽方

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

十乘湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋覆代赭湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

黃連湯

桂枝附子湯

