

御纂醫宗金鑑

土部
卷六十三



御纂醫宗金鑑卷六十三

編輯外科心法要訣目錄

頭部

百會疽

透腦疽

侵腦疽

佛頂疽

額疽

勇疽

鬢疽

天疽銳毒

耳後疽

耳發

耳根毒

玉枕疽

腦後發

腦鑠

油風

白屑風

禿瘡

蝨蛄癬

髮際瘡

面部

顴瘍

顴疽

顴疔

面發毒

面遊風

疔腮

頰瘍

骨槽風

發頤

時毒

鳳眉疽

眉心疽

龍泉疽

虎髭毒

燕窩瘡

雀斑

黑痣

鰲黑肝點



南京中醫藥大學圖書館藏

御纂醫宗金鑑卷六十三

編輯外科心法要訣

「會」字在頂中央且面側觀之正對鼻尖

百 會 疽 圖



南京中醫藥大學圖書館版權所有

頭部

百會疽

百會疽在巔頂結經屬督脈百會穴初如粟米漸如錢甚
苟堅似鐵高腫熱實清毒火平塌陽虛溫補怯腫連耳項動
聲七日不潰命必絕

註

此百會疽又名玉頂發生在巔頂正中屬督脈經百會穴
由膏粱太過火毒凝結而成初起形如粟米漸腫根大如
錢甚則形似葡萄堅硬如鐵高尖紅腫焮熱疼痛瘡根收
束憎寒壯熱大渴隨飲隨乾口苦唇焦便秘煩躁衄見洪
數者此屬氣實宜服黃連湯清毒飲以清毒火外敷冲和膏



北京中医药大学图书馆版权所有

若漫腫平塌紫暗堅硬舉痛根散惡寒便瀉脈見細數
此屬陽虛宜服十全大補湯以溫補之外敷回陽玉
若面赤過煩口乾不渴脣潤者此屬陽虛浮泛宜服
地黃丸引火歸源更用生附子餅置兩足心涌泉穴
五壯以洩其毒初起貼琥珀膏已潰慘黃靈藥太乙膏
貼腐盡再易生肌之藥治之若腫連耳項痰如拽鋸七日
無膿不潰神昏者命必絕矣

黃連消毒飲

蘇木

二分

甘草

三分

陳皮

二分

桔梗

五分

黃芩

五分

黃蘗

五分

從集醫案全錄 卷之十一

人參 三分

藁本 五分

防已 五分

防風 四分

知母 四分

羌活 一分

獨活 四分

連翹 四分

黃連 一錢

生地黃 四分

黃耆 二錢

澤瀉 二分

當歸尾 四分

水煎食遠溫服

方歌黃連消毒清毒火諸般火證服最良蘇木甘草陳皮枯

藥人參藁二防知母羌活獨活等連翹黃連生地黃黃耆

澤瀉當歸尾服後最忌飲寒涼

中和膏



回陽玉龍膏

俱見腫瘍門

生肌散

十全大補湯

黃靈藥

大乙膏

俱見潰瘍門

桂附地黄丸

附子餅

見前炙法

琥珀膏

見後髮際瘡



北京中医药大学图书馆版权所有

透腦侵腦疽圖

透腦疽生在百會穴前額穴入前

侵腦疽生在透腦疽前側下五穴



透腦疽

透腦疽生百會前形如雞子痛而堅軟漫膿稀虛塌陷紅硬

稠實腫尖

註

此證生於百會穴之前額門之際亦由督脈經火毒而成
初如粟米漸如雞子堅硬疼痛瘡頂塌陷根腳漫腫色暗
者屬虛若色紅腫硬頂尖膿稠者屬實速潰者順遲潰透
腦髓者逆其腫潰內外治法俱按百會疽

侵腦疽

侵腦疽生透腦旁濕火攻發屬太陽穴名五處知其位紅順紫

逆要審詳

註

此疽生於透腦疽側下由太陽膀胱經濕火而成穴各

處紅腫高起焮熱疼痛膿色如蒼蠅者屬氣血俱實

易治若紫陷無膿根脚散大者屬氣血兩虛逆而難

起宜服制防敗毒散汗之次服內疎黃連湯下之將潰

托裏透膿湯已潰服托裏排膿湯外貼琥珀膏圍敷中和

膏其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

托裏透膿湯

人參

白朮
土炒

穿山甲

炒研

白芷
各一錢

升麻

甘草節

各五分

當歸
二錢

生黃耆
三錢

皂角刺

一錢五分



青皮

五分

水三鍾煎一鍾病在上部先飲煮酒一鍾後熱服此

在下部先服藥後飲酒瘡在中部藥內兌酒半鍾熱

方歌

托裏透膿治癰疽已成未潰服之宜參朮甲芷升麻

歸黃耆刺青皮

荆防敗毒散

見項部腦疽

內疎黃連湯

中和膏

俱見腫瘍門

托裏排膿湯

見項部魚尾毒

琥珀膏

見髮際瘡內

口鼻瘡

三編外科選錄



佛頂疽圖

佛頂疽生在透腦頂之前上星穴



佛頂疽

佛頂疽屬督上星陰陽不調毒熱成不論虛實皆險證潰爛

陷必然凶

註

此證一名頂門疽生於頭頂顙門之前屬督脈經上星

由藏府陰陽不調熱毒上壅而成色紫堅硬腫痛膿洪大
而數者爲實脈微細而數者爲虛皆屬險證若潰爛黑陷
六脈散大神昏譫語二便閉結者爲逆首尾內外治法俱
按百會疽

額

疽

圖

疽 額

傍額疽

傍額疽



額疽

額疽生額火毒成左右膀胱正督經頂陷焦紫無膿重高

收紅腫輕

註

此證生前額正中者屬督脈經或生左右額角者屬膀胱

經總由火毒而成初起瘡頂塌陷乾焦色紫不王太膿者其勢重而屬險也若紅腫高聳瘡根收束者其勢輕而屬順也初服荊防敗毒散汗之次服仙方活命飲消之將潰氣虛者宜服托裏透膿湯氣實者宜服透膿散外敷中和膏已潰宜服托裏排膿湯外貼琥珀膏其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

