

本草匯卷十一目次

草部三

甘菊花

八一

茵陳蒿

八三

菴藷子

八五

夏枯草

八七

旋覆花

卽金沸草
八九

鷄冠花

九一

大薊

九三

艾葉

八二

青蒿

八四

菴蔚

卽益母草
八六

劉寄奴

八八

青箱子

卽草决明
九十

紅花

九二

小薊

九四

續斷 九五

漏蘆 九六

葫蘆巴 九七

牛旁子 卽鼠粘子又名惡實 九八

苧根 九九

葉耳實 卽蒼耳子 一〇〇

天名精 卽土牛膝 一〇一

鶴虱 一〇二

猓簽 一〇三

蘆根 一〇四

麻黃 一〇五

麻黃根節 一〇六

木賊 一〇七

燈心 一〇八

生地黃 一〇九

熟地黃 一〇十

牛膝 一〇十一

紫苑 一〇十二

麥門冬

三百十

萱草根

四百十

淡竹葉

五百十

冬葵子

六百十

款冬花

七百十

敗醬

八百十

決明子

九百十

地膚子

一百二十

瞿麥

一百廿一

葶藶子

二百廿二

王不留行

三百廿三

車前子

四百廿四

連翹

即連翹
百廿五

青黛

百廿六

蒺藜

百廿七

穀精草

百廿八

海金沙

百廿九

獨金少
百廿

燕燕
百廿

蜂林草
百廿

王

豐泰
百廿

火地
百廿

煤冬并
百廿

財計
百廿

麥門冬
百廿

常
百廿

泉
百廿

類
百廿

公
百廿

草
百廿

本草匯卷十一

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯

男 樹晚芳谷

叅閱

姪 維均梅在

紫藤陳陸坤白筆校訂

草部三

甘菊花

八一

苦甘微寒可升可降陰中微陽入肺心

肝脾胃大小腸散風熱上注之頭眩止兩目欲脫之

淚出除胸中煩熱毆膝風疼痛養肝血退翳膜甘者

陰血兼補。苦者胃氣反傷。本經治風頭眩腫目脫淚。出皮膚死肌惡風濕痺者。諸風掉眩皆屬肝木。風藥先入肝。肝開竅于目。風爲陽邪。勢必走上。血虛則熱。熱則生風。風火相搏故也。別錄治腰痛去來陶陶縱緩者。乃血虛氣滯之候。苦以泄滯結。甘以益血脈。又兼辛平以散虛熱也。其除胸中煩熱者。心主血。血虛則病煩。陰虛則熱收于內。故熱在胸中。血益則陰生。陰生則煩止。苦辛能泄熱。故煩熱並解。按菊花發生于春。長養于夏。秀英于秋。而資味乎土。歷三時之氣。

得天地之清。獨稟金精。善制風木。高巔之上。惟風可到。故主用多在上部。昔人謂其能除風熱。益肝補陰。蓋不知其得金水之精英尤多。能益金水二臟也。惟其益金。故肝木得平。而風自息。惟其補水。故心火有制而熱自除。同地黃黃蘗枸杞白茯苓五味子山萸當歸羚羊角羊肝。治肝腎俱虛。目痛。加決明子木賊。穀精柴胡。可以去外膜。同黃連玄參甘草生地荆芥穗。決明子連翹。桔梗柴胡川芎羌活。童便。可治風熱。目痛。與枸杞子相對蜜丸。久服。則終身無目疾。如眼

目昏花甘菊一斤紅椒去目六兩爲末用新地黃汁和丸臨臥茶下疔腫垂死菊花一握搗汁入口卽活冬月採根菊有二種紫莖葉香而味甘者陰血兼補青莖而大作蒿艾氣味苦者大傷胃氣黃者入金水陰分白者入金水陽分治頭風治頭風白者爲最紅者行婦人血分苦菊但可理癰忌火去蒂漿過晒乾乘燥入磨花葉俱可作枕明目白木枸杞桑白皮爲之使

艾葉

入二苦辛氣溫時珍云生溫熟熱可升可降陽也元素曰陰

中之陽

入足厥陰太陰少陰經溫中氣祛寒濕除腹痛

理下痢安胎氣治崩帶辟鬼邪殺諸蟲療蠱瘡于下

部

病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒或下痢宜急治下部不曉此者但攻其上而下部生蟲食其

肛

爛見五藏便死也燒艾于管中

散發背于初先

未成

熏

下部冷烟入或少加雄黃更妙

散發背于初先

未成

熱腫以濕紙搗上先乾處是頭著艾灸之不論壯數

痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒即散不散亦免

內攻

驚掌風病熏之即愈

真蘄艾四兩灸五六滾入大口瓶內盛之川麻布二

層縛

上將手心放上

賺瘡疥癩熏傳皆良作炷灸諸

熏之冷再易神効

經之穴百病藉之而即祥

按艾葉生則微苦太辛

熟則微辛太苦善辟風寒濕氣及非時邪氣芳烈燥

熱純陽之劑也可以取太陽真火可以回垂絕元陽

服之則走三陰而逐寒濕轉肅殺爲融和煎服宜新

達灸火宜陳久氣乃下行灸之則透諸經而治百病起沉痾爲康

泰其功亦甚大矣但其性辛熱有毒僅可施于暫時

耳若以溫煖作常服之反致熱火上衝狂躁不禁矣

丹溪云婦人無子多由血少不能攝精耳世謂子宮

虛冷投以辛熱不知艾性入火灸則氣下行入藥則

氣上行豈可以此如素有虛寒痼冷婦人濕鬱滯漏

之人以艾和歸附諸藥治之夫何不可老弱虛人下

元畏冷者以熟艾堯其臍腹妙不可言寒濕腳氣亦

宜以此夾入襪內大抵多功于外治之物也火眼腫

痛者以艾燒煙用盥蓋之刮燥以溫水調化洗之入黃連更妙。蘄州產者獨莖圓葉背有白芒稱爲艾之精英揀取淨葉揚去塵屑入石臼杵搗熟去渣滓搗至如綿細軟謂之熟艾若生艾灸火則傷人肌脉用時焙燥則灸火得力若入丸散須用醋煮乾搗成餅子烘乾再搗爲末入白茯苓三五片同碾即可作細末或大米三五合亦好苦酒香附爲之使。

茵陳蒿

八三

味苦微寒陰中微陽入足太陽經通膀胱

理主黃疸怫熱于肌表利小便主傷寒結熱于腹中

因上下分消之妙故有專治濕熱之功 按茵陳專

理洩便本為膀胱之劑又何以治疸蓋疸之為病脾

受傷也而脾之所惡濕乘土也得茵陳以利水則濕

去土安而疸自愈然亦須五苓之類佐助成功用之

者中病即已過用則元氣受賊矣第發黃有陰陽二

種茵陳同梔子黃蘗以治陽黃同乾薑附子以治陰

黃總之茵陳為君隨佐使之寒熱而理黃症之陰陽

也仲景茵陳梔子大黃湯治濕熱也梔子藥服湯治燥熱也二藥俱治陽黃李思訓用茵陳附子湯治

陰黃也各隨寒熱佐使可耳古方用茵陳同生薑搗爛于胸前四

肢日日擦之。則黃退矣。疥瘡煎汁洗之立愈。

青蒿

八四

味苦。氣寒。入足少陰厥陰經。主真陰不足。

伏熱骨蒸。殺鬼疰。傳尸久瘧。久痢。本經治疥癬。癰瘰。皆由于血熱所致。留熱在骨間者。是伏熱于陰分也。肝胃無熱。則目明。苦能泄熱。苦能殺蟲。寒能退熱。熱去則血分平和。陰氣日長。前證自愈。按青蒿得春獨早。其發生在羣草之先。故治少陽厥陰血分之證。獨著奇功。雖能治骨蒸勞熱。然性頗陰寒。胃虛者不可投也。止宜于血虛有熱之人耳。用葉童便浸一

日夜晒乾用根莖子葉不可同使同使則翻成痼疾
伏硫黃

菴藺子

入五

苦辛微寒

別錄微溫

味厚氣薄降也陰中微

陽入足厥陰經血分治腰脚重痛療骨節煩疼主女
人經澀不通扶男子陽痿不舉理閃挫氣痛益打撲
折傷按菴藺子得土之烈氣而微感天之陰氣以
生行血散結之藥也然散中有補補而能行故本經
列爲上品婦人月事不以時至併瘀血病見之不審
者不可輕試善辟蛇蛇着之卽爛故人家多種之以

辟之也。陰乾用。薏苡爲之使。

芫蔚

卽益母草。八六

甘辛。微溫。可升可降。陰中陽也。入手足

厥陰經。主欲產胎滯而不行。療新產血滯而不利。行
血活血而不傷。已產未產之良劑。通爲治血之需。更
有調氣之義。本經言其明目者。蓋包絡生血。肝藏血。
目爲肝之竅。此物能治血補陰。血滯病目。用此益肝
行血而目明。若瞳神散太血不足也。豈可用哉。又治
血逆者。肝臟有火也。肝涼則降而順矣。別錄主大熱
頭痛心煩者。皆血虛而熱之候也。清肝散熱和血。則

頭疼心煩俱解。按茺蔚一品有活血行氣補陰之功。白花者入氣分。紫花者入血分。爲調胎產諸疾之要藥。故云益母。主安胎。去死胎。行瘀血。生新血。婦人所恃者。氣血也。胎前無滯。產後無虛。以其行中有補也。故時珍常以之同四物湯。香附諸藥。治人甚効。熱血欲貫瞳人者。可與涼血藥同用。若其莖葉花根。可浴癰瘡。擣傳蛇傷。蓋根莖花葉實皆可同用。如治手足厥陰血分風熱。女人經脉。則單用子。若治胎毒瘡瘍。消水行血。婦人胎產諸病。則宜並用。蓋其根莖花

葉專于行而子則行中有補也。子微炒去殼或蒸晒用制硫黃雌黃砒石。

夏枯草

八七

苦辛氣寒。獨入足厥陰經。破癥堅癭瘤。

結氣散癰癰鼠瘻頭瘡療脚腫濕痺止目珠羞痛。

按夏枯草稟純陽之氣。夏至後得陰氣卽枯。故名夏枯。大治癰癰散結氣。有補養厥陰血脉之功。又治目疼。以沙糖水浸一宿。取其能解內熱。緩肝火也。婁全善云。此草治目珠疼。至夜則甚者。神効。或用苦寒藥反甚者。亦神効。蓋目屬厥陰之經。夜甚。及點苦寒藥。