

包氏醫宗

第二集 第二卷

雜病方法



包氏醫宗第一集目錄

▲內科傳染病學

卷之一

傷寒論章節

一冊

卷之二

傷寒方法 附歌括

一冊

卷之三

傷寒表 附表式

一冊

卷之四

傷寒論講義

二冊

卷之五

傷寒方講義

一冊

(第一集售銀陸圓)

◀版權有所不准翻印▶

中華民國十九年一月出版

包氏醫宗第一集第五卷

傷寒方講義

冊

著作者 閻杭包識生

出版者 包氏醫宗出版部

總發行 包氏醫宗出版部

上海北泥城橋新開路
口鴻祥里二一四五號

代售處 各大書局



傷寒方講義目錄

第一章 緒言

第二章 傷寒方之主藥

第三章 主方

第四章 單方

第五章 偶方

第六章 複方

第七章 合方

第八章 加減方

第一節 芍藥甘草湯

第三節 桂枝湯

第二節 桂枝甘草湯

第四節 柴胡湯



第五節 麻黃湯

第六節 越婢湯

第七節 承氣湯

第八節 抵當湯

第九節 陷胸湯

第十節 瀉心湯

第十一節 四逆湯

第十二節 理中湯

第十三節 真武湯

第十四節 白虎湯

第十五節 五苓散

第十六節 梔子鼓湯

第九章 六經方

第十章 六淫方

第十一章 陰陽表裏寒熱虛實方

第十二章 方義

傷寒方講義目錄終



傷寒方講義

閩杭包一虛識生氏著

男天白孫應申校字

第一章

緒言

傷寒論一百十有二方。雜病論一百四十三方。統稱之爲經方。乃仲聖所著。爲方書之鼻祖。功效奇著。迥非後人所作時方可與比倫。數千年來。習醫者莫不奉爲金科玉律。其採用藥品。雖取材於本經。然間亦有爲本經所未錄者。且其性格又自成一家。治病效能。往往與本經藥性不符。各藥經其配成方劑。施之於病。功效捷如影響。其分兩更神妙不可思議。如桂枝湯治有汗中風之太陽病也。加重芍藥。則變爲治腹痛下利之太陰病矣。加桂則治奔豚病矣。加芍飴則爲補中之品。加芍黃則爲攻腐之方。又如四逆加重薑附。則變爲通脈。去甘草則爲乾薑附子湯矣。藥味之增減。分兩之輕重。差之毫釐。失之千里。誠神乎其神矣。後世方書。多有不註分兩者。醫生臨證處方。亦任意填寫。藥肆售藥。更輕重不符。如大承氣本四黃八樸五枳三芒。時俗竟有用六分川樸。錢半枳實。三錢元明粉。二錢大黃。而敢大誇其口曰。今日某姓病。某用大承氣矣。其實調胃之不若也。桂枝湯本桂芍同等。乃有已用白芍三錢。復用桂枝三分者。愈病



南京中醫藥大學圖書館藏

乎。增病乎。又今之所謂讀仲景書。用經方者。大黃、石膏、黃芩、潞黨、附子、乾薑。竟有用二三兩。而至於一二斤者。請問古戰。如是乎。古方如是乎。人乎。獸乎。是固一則不及。膽小如鼷。一則太過。心狠如狼。嗚乎。草菅人命。誰之過歟。吾中醫藥之退化。有江河日下之勢者。未始非若輩有以致之也。識生幼承庭訓。改儒習醫。十一齡卽讀經方歌括。繼而傷寒雜病。而內難各書。至廿歲。遂出而問世。迄今近三十年。所處方藥。莫不謹遵成法。若方與證符。則投之厥疾頓瘳。捷如桴鼓。從不敢減少。加多於其間。偶或隨意加減。而試驗結果。總不若原方之靈。而且速。此則學問粗淺。初未窺得仲聖立方之堂奧也。故作傷寒章節時。對於經方。未敢著一字。作傷寒講義時。雖粗知經方門徑。間一論評。然猶恐學術未精。一字之差。殺人無數。講義之編輯。仍未敢率爾操觚也。今也年將半百。精力日衰。時不我待矣。益以傷寒諸著。皆已殺青。獨經方講義。尙付闕如。常耿耿胸臆間。不得已乃秉其歷年教授諸生之所得者。再事推敲。日夜思維。三月始胸有成竹。二旬而初稿粗具。乃以諸務紛繁。無暇刪易。倉卒付印。錯誤難免。還希海內外賢達。有以教正之。則不但識生之幸。亦中國醫界前途之幸也。

第二章 傷寒方之主藥

甘草

川椒

飴糖

竹葉

石膏

連翹

梔子

桂枝 半夏 茵陳 梓白皮 白頭翁 秦皮
白芍 龍骨 牡蠣 薏苡仁 赤小豆 葛根 花粉
人蔘 阿膠 雞子黃 蜜糖 豬膚 桔梗 貝母
肉桂 厚樸 枳實 知母 黃柏 旋覆花 代赭石
麻黃 細辛 蟲蟲 水蛭 桃仁 天冬 麥冬 葱白 薤白
大黃 芒硝 甘遂 大戟 玉竹 粳米 豬膽汁 人尿
猪苓 澤瀉 萆花 芫花 當歸 熟地 鉛丹
滑石 木通 商陸 海藻 赤石脂 禹餘糧 巴豆
甜瓜蒂 淡豆豉 附子 乾薑 五味子 烏梅 苦酒 升麻
柴胡 蜀漆 黃芩 黃連 瓜蒌實 火麻仁 文蛤
生姜 大棗 茯苓 白朮 杏仁 葶藶 槭櫨

傷寒論一百十有二方。其藥味祇八十八種。最常用者。不過十份之二三。治療各證。不以本草主治爲範圍。而以內經辛甘發散爲陽。酸苦湧泄爲陰。陰味出下竅。陽氣出上竅。味厚者爲陰。薄爲陰之陽。氣厚者爲陽。薄爲陽之陰。味厚則泄。薄則通。氣薄則發泄。厚則發熱。壯火之氣衰。少火之氣壯。壯火食氣。氣食少。



火壯火散氣。少火生氣。寥寥百數十字。包含諸方之效能。合以本草溫平寒熱四氣之作用。及氣血藏府攻補升降各主藥。錯綜變化。可統治百病。若以本草之主治。證之經方。則不啻張冠李戴。風馬牛不相及矣。故醫者當知經方自有經方之妙用。散見於傷寒雜病論之間。萬不可以本草之主治。強合經方之主治也。

觀上所表。各藥之性。極其簡單。且每一主治。藥味有二。亦有數藥單用者。如甘草緩中和百藥。桂枝之扶陽益衛。芍藥之斂陰調營。合而用之。爲調營益衛。且爲衆方之主腦。人稜之養陰生津。肉桂之回陽補火。麻黃細辛之發汗。大黃芒硝之通大便。猪苓澤瀉滑石木通之利小便。瓜蒂豆豉之取吐。柴胡蜀漆之和解。生姜大棗川椒飴糖之溫中。半夏吳萸之降逆。龍骨牡蠣之潛陽。阿膠雞子黃之養血。厚樸枳實之破氣。蟲蟲水蛭桃仁之攻血。甘遂大戟藁花芫花商陸海藻之攻水。附子乾薑之驅寒。黃芩黃連之瀉火。茯苓白朮之制水。竹葉石膏之清熱。茵陳梓皮苡仁赤豆之除溼。蜜糖猪膚之潤燥。知母黃柏之滋水。天冬麥冬玉竹粳米之生津液。當歸熟地之補血。赤石脂禹餘糧之固澇。五味子烏梅苦酒之收斂。瓜蒌實火麻仁之潤腸。杏仁葶藶之瀉肺。連翹梔子之清三焦熱。白頭翁秦皮之瀉肝熱。葛根花粉之清肌熱。桔梗貝母之開肺氣。旋覆花代赭石之平肝氣。葱白薤白之通陽。猪膽人尿之潛陰。鉛丹之鎮。巴豆之通。升麻之和。文蛤之發汗。梔檳之利尿是也。何等簡切。然而配合成方。則千變萬化矣。上者能使之下。內者能使

之外。或數味共一方。或一味而數用。治病之功效。靈而且速。傷寒雜病之方。皆以此等藥為基礎。神乎。神。非望人誰能若是也。

第三章 主方

傷寒。病在六經之營衛表裏。故其方以陰陽汗下為主體。變化莫測。雖藥同而分兩異者。有差之毫釐。失之千里之慮。雜病。病在藏府寒熱之虛實。故其方以溫涼攻補為主體也。各方有各方之專長。各藥有各藥之效用。不能假借者也。方以傷寒為主。雜病副之。故雜病每引用傷寒之方。傷寒則無須雜病之方輔佐也。

芍藥甘草湯

麻黃湯

陷胸湯

真武湯

桂枝甘草湯

越婢湯

瀉心湯

白虎湯

桂枝湯

承氣湯

四逆湯

五苓散

柴胡湯

抵當湯

理中湯

梔子豉湯

傷寒之主方。概別之為十六種。其宗旨以陰陽表裏寒熱虛實八字定之。夫病證多端。治法不一。揆其訣要。莫不以此八字為綱領。按芍藥甘草。桂枝甘草。陰陽之主方也。桂枝。柴胡。麻黃。越婢。承氣。抵當。陷胸。瀉



南京中醫藥大學圖書館

心。表裏之主方也。四逆理中、眞武、白虎、寒熱之主方也。五苓、梔子、虛實之主方也。推而廣之。陰陽中有寒熱。表裏虛實。表裏中有陰陽。寒熱虛實。寒熱中有陰陽。表裏虛實。虛實中有陰陽。表裏寒熱也。千變萬化。不離此陰陽表裏寒熱虛實八字。醫者能成竹在胸。則統治萬病之道。如斯而已矣。又按芍藥甘草湯。陰虛養陰之方也。桂枝甘草湯。陽虛扶陽之方也。桂枝湯。調營衛之虛熱。柴胡湯。和氣血之實熱也。麻黃湯。表實散寒之方也。越婢湯。表實清熱之方也。承氣湯。陽氣實破氣之方也。抵當湯。陰血實破血之方也。陷胸湯。爲攻寒水之良方。瀉心湯。爲瀉熱火之妙藥。四逆治裏寒之實。理中治裏寒之虛。眞武治表熱之虛。白虎治表熱之實。五苓散宣三焦之陽實。梔子豉清三焦之陰虛。此又爲陰陽表裏寒熱虛實之變化者也。更有變不盡。變化不勝化。則在醫者聰慧博學矣。

第四章

單方

諺云。單方一味。氣煞名醫。誠哉。單方治病之靈而且速也。按上古時代。概以單方治病。其後醫術日進。藥味日增。漢唐以迄明清。藥味之日增也。班班可考。今之西醫。猶在單方時代。合方甚尠也。觀其每治一病。藥瓶紙盒。累累几案間。竟有多至十餘種藥味者。較之中醫之時代。當在秦漢間也。故西醫治單純證。往往有特效之處。與中醫之單方效力等。然六經之寒熱病。非單純之方可治。試觀經方之配合。其理便明。

瞭也。

甘草湯

甘草

文蛤散

文蛤

燒棍散

燒棍

一物瓜蒂湯

瓜蒂

皂莢丸

皂莢

訶黎勒散

訶黎勒

雞屎白散

雞屎白

紅藍花酒

紅藍花

蜜煎導方

蜜

猪膽汁方

猪膽

【甲】

【乙】

甘草乾薑湯

乾薑

甘草

芍藥甘草湯

芍藥

甘草

桂枝甘草湯

桂枝

甘草

大黃甘草湯

大黃

甘草

甘草麻黃湯

麻黃

甘草

藜蘆甘草湯

藜蘆

甘草

桔梗湯

桔梗

甘草

紫葳湯

紫葳

甘草



經方中內服單方凡八。外用凡二。皆一味也。且不用甘草。棗蜜等和緩其性。單刀直入。功力尤勝。如甘草之歛陰潤燥。文蛤之通陽發汗。燒棍之利尿。瓜蒂之清暑取吐。皂莢之化痰。訶黎勒之固塞。雞屎白之疎肝。紅藍花之活血。以單純之藥。治單純病者也。至蜜煎導猪膽汁二方。則外用通大便之方也。因液涸體

虛不能攻。故用外導之法也。

乙種八方。傷寒雜病各四。亦單方也。甘草不過和味而已。與西藥加糖漿。同一意義。又與飲食時加糖。隨配味一樣。按傷寒諸方。與雜病有異。雜病見病治病。用甘草者不多。傷寒則有陰陽變化。多有甘草加入也。如甘草乾薑之回陽。芍藥甘草之救陰。桂枝甘草之扶陽。大黃甘草之瀉火。甘草麻黃之發汗。藜蘆甘草之吐痰。桔梗甘草之宣肺氣。紫葳甘草之清肺血也。雖各方皆有甘草。不以甘草治病。而以各藥主治為君。且各方之配合。又多以此種單方為主藥也。

第五章

偶方

四逆湯

調胃承氣湯

芍藥甘草附子湯

梔子甘草淡豉湯

半夏散及湯

麻黃附子甘草湯

乾薑

大黃

芍藥

梔子

半夏

麻黃

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

附子

芒硝

附子

淡豆豉

桂枝

附子

杏子湯

甘草粉蜜湯

甘麥大棗湯

赤石脂禹餘糧湯

瓜蒂散

苦酒湯

猪膚湯

桃花湯

麻黃

白粉

小麥

赤石脂

甜瓜蒂

生半夏

猪膚

赤石脂

甘草

甘草

甘草

禹餘糧

赤小豆

苦酒

蜜

粳米

杏子

白蜜

大棗

禹餘糧

赤小豆

苦酒

白粉

乾薑

右列凡十四方。皆所謂偶方也。或一方一性。或一方二性。得甘草之緩和。則二藥之功力。不致各走極端。合成一氣。無先後緩急之弊。如軍旅之有司令。或合力攻邪。或分頭擊敵。戰無不勝。病無不治矣。如四逆之驅寒。內外之陽回矣。調胃之瀉熱。內外之陰復矣。芍藥甘草附子。扶陽又救陰。梔子甘草淡豉。清熱又催吐。半夏散及湯。升陽兼破水。麻黃附子甘草。之溫陽扶正。發汗驅邪。杏子湯之發汗消腫。甘草粉蜜之殺蟲止痛。甘麥大棗之培土生金而潤肺。藥雖一二味。功力却不遜也。按赤石脂禹餘糧湯。瓜蒂散。苦酒湯三方。不用甘草之偶方也。或二味同功。或二味異治。至猪膚湯。桃花



湯雖不用甘草之和緩而換以蜜米。其理亦猶甘草耳。

第六章

複方

桂枝湯

越婢湯

真武湯

小青龍湯

麻黃連軹赤豆湯

小柴胡湯

大承氣湯

大陷胸丸

烏梅丸

麻黃升麻湯

桂枝 生薑 甘草 大棗 芍藥

麻黃 生薑 甘草 大棗 石膏

附子 生薑 白朮 茯苓 芍藥

細辛 桂枝 乾薑 甘草 半夏 芍藥 五味

杏仁 連軹 生薑 甘草 大棗 赤豆 梓皮

柴胡 黃芩 生薑 甘草 大棗 人蔘 半夏

大黃 川樸 枳實 芒硝

大黃 葶藶 杏仁 芒硝 白蜜

當歸 烏梅 細辛 黃連 黃柏

蜀椒 桂枝 附子 乾薑 人蔘

麻黃 升麻 桂枝 甘草 芍藥



南京中醫藥大學圖書資料部版權所有

黃芩 玉竹 知母 石膏 天冬

當歸 茯苓 白朮 乾薑

奇方偶方之外。又有複方。奇方單味也。偶方雙味也。複方多味也。然藥雖多味。而其方藥同一功效者。亦可稱單方。藥雖多味。而其方藥祇二種功效者。亦可稱偶方也。又藥雖二三味。而其功效有二三功效者。亦複方之類也。按複方不論藥味之多少。必具有三種以上之功效者。方可稱為複方也。但傷寒之複方。少。雜病之複方。多。上例十方。略舉大概而已。不過吾人欲明瞭配方之法耳。又按雜病之複方甚多。今不多論。能明白烏梅丸。麻黃升麻二方之意義。則雜病之制方大概然也。

桂枝湯。藥雖五味。功力在桂芍二味也。以桂枝甘草之辛甘益衛。芍藥甘草之苦甘調營。大棗生薑。不過引藥出表。為太陽頭項皮膚之主藥耳。越婢適得其反。除桂芍而換麻膏。桂之扶陽者。而變為石膏之清陽矣。芍藥之調營者。而變為麻黃之攻營矣。虛變實。補變攻。至生薑大棗。仍是出表也。故越婢治溼治水。與桂枝之治熱治汗。立於反對地位也。按桂枝名陽旦。是童子也。越婢童女也。婢而曰越。是不甘雌伏。而作雄飛。對外服務。治表上溼病水腫之功。他方力莫與京矣。先師製方。諸多類是。深奧難測也。眞武。青龍。水神也。赤地千里。草木焦枯。必藉青龍之騰雲致雨。而得春回甘露。洪水橫流。泛濫中國。必假眞武之左龜右蛇。而始海不揚波。夫寒水之內藏也。表實無汗。故青龍能發汗。寒水之外溢也。表虛多汗。



故眞武能止汗也。然眞武之制方。亦猶桂枝之意。不過升降各異耳。桂枝芍藥功在營衛。能驅由表內侵之邪風。附子芍藥功在陰陽。能納由裏外逃之正氣。桂枝有生薑大棗之溫中助汗以驅邪。眞武有生薑苓朮之培土制水以安正。桂枝之用草。欲其甘味合化之機。眞武不用草。取其淡味宣通之義也。小青龍治藏府之寒水。與大青龍治軀壳之寒水者有別。故其制方不走表而走裏。故不用生薑大棗之太陽主藥。而用酸苦爲陰之芍味也。復用桂甘之佐衛。芍甘之扶營。乾薑之驅寒。半夏之降水。再以麻黃細辛散表裏之邪水。得芍藥五味之斂陰。則其藥內降。而可治胸腹之飲水。寒邪從小便而出也。是則眞武小青龍。雖同治寒水之證。從裏而解。但其一虛一實。則大相徑庭矣。

麻黃連軹赤小豆湯。治表上之溼熱者也。故用生薑大棗之皮膚主藥。復用麻杏宣肺氣以利水道。而邪從汗尿而出。更有梓白皮赤小豆之除溼。但溼已挾熱。有連軹之清三焦。始面面俱到。完成一方也。柴胡有大小。半表裏病之有從表從裏解也。小柴可使樞邪從表而解。不汗而能汗之方也。大柴可使樞邪從裏而解。非下而可下之方也。不過棧草換枳芍而已。二方俱用薑棗者。樞邪之往寒。當以外散。二方俱用柴芍者。樞邪之來熱。必以內消也。木鬱作嘔逆。有半夏之降逆舒鬱。一則用人棧之救陰養營。甘草之甘緩培土。增重辛甘化陽之力。使內侵之邪。仍從外轉。一則用枳實之瀉陽破衛。芍藥之苦泄疎木。增重苦甘化陰之功。使內侵之邪。當從裏解也。且炎炎相火。最易傷陰。所以二方之棧芍。不能不未雨綢繆。

也。

承氣陷胸抵當瀉心四方。皆裏證之方也。四方皆同一制法。論二則知其四。論此必兼其彼。承氣氣病也。抵當血病也。陷胸水病也。瀉心火病也。氣血水火俱結在裏。裏病又當從裏解。故以通大便爲主。所以大黃芒硝皆必用之藥也。惟瀉心則少用。或可不用何也。因心火內結之瀉心證。多大便溏薄也。故六瀉心中祇三用之而已。按承氣氣病也。配以厚樸枳實。抵當血病也。配以蟲蟲水蛭。陷胸水病也。配以甘遂。半夏葶杏仁。瀉心火病也。專以黃芩黃連爲主。而可見證加減。或加薑。加附。加夏。加草。加大黃。故又有五瀉心也。

烏梅丸。厥陰肝藏專主之方也。厥陰爲絕陰之地。中含少陽。母子相連。互相利害。故厥陰方多寒熱互用。職是故耳。已用附子乾薑蜀椒之熱。復用黃連黃柏之寒。熱厥陰所欲也。寒少陽所喜也。更用桂枝之升陽益衛。人獲之納陰扶營。有細辛之驅風。有烏梅之斂氣。當歸引藥入肝。則陰者陰。陽者陽。散者散。收者收。熱者熱。寒者寒。而木火之氣血調矣。火藏矣。風平矣。

麻黃升麻湯。治厥陰血分傷寒之方也。方以麻名。發汗可知矣。其證多端。故其藥亦駁雜。法類麻黃。則缺杏。方似桂枝。則除棗。藥如白虎。又無粳。湯若理中。又少棗。是則假麻黃之發汗驅邪。桂枝之調營和衛。白虎之清熱生津。理中之驅寒培土。而木邪之升降出入。錯亂不明者。全靠四方之發汗也。止利也。清熱也。