

婦人良方

十七、十八、十九

卷十四、十五



臨川陳自明編

吳郡薛已註

新都閔道政校

妊娠中風方論第一

論曰四時八方之氣為風也常以冬至之日候之若從其鄉來者長養萬物否則名為虛邪賊害萬物體虛中之客於皮膚則頑痺不仁入於筋脈則變急喝僻若濕熱則弛縱痿軟若入臟腑氣隨所傷經絡而為諸病妊娠中之必須早治庶免墮胎之患

愚按病機要云風木為熱熱勝則風動宜以靜勝其燥是亦養血也治法須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮雖有汗下之戒而有中藏中腑之分中腑者多着四肢則脈浮惡寒拘急不仁中臟者多着九竅則唇緩失音耳聾鼻塞目昏便秘中腑者宜汗之中臟者宜下之表裏已和宜治在經當以大藥養之此中風之要法妊娠婦患之亦當以此施治而佐以安胎之藥仍參三卷首論主治防風散治妊娠中風卒倒口噤肢強或痰氣上升

防風

桑寄生

葛根各五

家菊花

細辛

防己

秦艽

當歸

桂心

茯神

甘草

羚羊角各三分

石水煎入竹瀝半合服

白朮酒 治妊娠中風口噤不語

白朮

半兩

獨活一兩

黑豆各一

右酒煎四分服灌之得汗即愈

神遺治妊娠中風排風湯續命湯參蘇湯活加羌活

引風湯皆可選用方見第三卷中風類

妊娠風痙方論第二

論曰妊娠體虛受風而傷足太陽經遇風寒相搏則口噤背強甚則腰反張名之曰瘧須臾自醒良久復作又名子癰子當察其因而治之

愚按前症若心肝風熱用釣藤湯肝脾血虛加味道遙散肝脾鬱怒加味歸脾湯氣逆痰滯紫蘇飲肝

大風熱釣藤散脾鬱痰滯二陳薑汁竹瀝若兼症相雜當參照子煩門

附治驗

一妊婦出汗口噤腰背反張時作時止此忽動肝火也用加味逍遙散漸愈又用釣藤散而愈更以四君加釣藤山梔柴胡而安一妊婦因怒忽仆地良久而甦吐痰發搐口噤項強用羚羊角散而愈

用釣藤散治瘥又用歸脾湯而安

羚羊角散

治妊婦冒悶角弓反張名曰子癇風瘥

獨活

獨活

酸棗仁 炒 五加皮

薏苡仁 炒 防風

甘草 炙 各二分

右薑水煎

當歸 酒浸

附方

釣藤湯

方見十二卷第四論

加味逍遙散

釣藤散 方見四卷第四論

二陳湯 方見二十四卷第五論

紫蘇飲

方見十二卷第八論

四君子湯

方見二十四卷第六論

妊婦瘥方論第三

竊謂瘥者筋脈急而縮也瘥者筋脈緩而伸也一縮一伸手足相引搐搦不已大抵與嬰孩發搐相似謂之瘥瘥也此症多屬風蓋風主搖動駱龍吉云心主脈肝主筋心屬火肝屬木火主熱木主風風火相熾則為瘥瘥也治法若因風熱用釣藤湯加柴胡山梔黃芩白木以平肝木降心火養氣血若風痰上湧加竹瀝南星半夏若風邪急搐加全蝎殭蠶腐損氣血用八珍湯加釣藤山梔為主若無力抽搐戴眼反折汗出如珠者肝氣絕也皆不治

附治驗 方藥

一妊婦四肢不能伸服祛風燥暴之劑遺尿痰甚四肢抽搐余謂肝火血燥用八珍湯加炒黑黃芩為



主佐以釣藤湯而安後因怒前症復作小便下血寒熱少寐飲食少思用釣藤散如山梔柴胡而血止用加味道遙散寒熱退而得寐用六君子湯加芍藥釣藤飲食進而漸安

八珍湯

方見二十四卷第四論

六君子湯

方見二十四卷第六論

姙鬼胎方論第四

夫人臟腑調和則血氣充實精神健旺若榮衛虛損精神衰弱妖魅之類乘之亦如懷妊之狀故曰鬼胎也

愚按前症因七情脾肺虧損氣血虛弱行失常道衝任乖違而致之者乃元氣不足病氣有餘也若見經候不調就行調補庶無是症治法以補元氣為主而佐以雄黃丸之類行散若脾經鬱結氣逆者用加味歸脾湯調補之若脾虛血不足者用六君子湯培養之肝火血耗者用加味道遙散滋抑之肝膽鬱怒者用加味歸脾道遙二藥兼服腎肝虛弱者用六味地黃丸

附治驗

一婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎症之藥不應余診視之曰面青脈澀寒熱往來肝經血病也面黃腹大少食體倦脾經血病也此鬱怒傷脾肝之症非胎也不信仍用治胎散之類不驗余用加味歸脾道遙二藥各二十餘劑諸症稍愈彼欲速效別服通經丸一服下血昏曠自汗惡寒手足俱冷嘔吐不食余用人參炮姜二劑漸愈又用十全大補湯五十餘劑而安

雄黃丸 治鬼胎瘀血腹痛

雄黃

鬼白

去毛

莽草

丹砂

細研

巴豆

去皮油

獺肝

炙黃各半兩

蜥蜴

炙黃一枚

右為末

蜜丸桐子大每服二丸空心溫酒下日二服或下如蛇蟲之類其病乃除

治鬼胎及血氣痛不可忍

班猫

去頭翅足製

延胡索

炒各等分

右為末以溫酒調下半錢以下穢物為度

附方

加味歸脾湯

加味道遙散

十全大補湯

方見二十四卷第四論

六君子湯

方見二十四卷第六論

六味丸

方見二十四卷第十一論

妊娠傷寒方論第五

夫時令嚴寒體虛所傷即成傷寒輕者洒淅惡寒氣急發熱微咳鼻塞數日而愈重者頭疼體痛寒交作久而不愈者多致傷胎也

愚按前症為害匪輕當審經絡表裏而治之不可輕忽

加減四物湯 治妊娠腹痛或月事不調胎氣不安產後血塊或亡血過多或惡露不下

當歸

川芎

白芍藥

炒 熟地黃各一兩

右每服四五錢水煎日二三服下血加艾葉

阿膠虛熱口乾加括翼根麥門冬惡血腹痛加當歸芍藥血崩血淋加熟地蒲黃因熱生風加川芎柴胡頭暈項強加柴胡黃芩大便秘結加大黃桃仁嘔吐惡心加白木人參虛煩不眠加竹葉人參煩燥大渴加知母石膏水停吐逆加楮冷茯苓虛煩傷寒加人參柴胡防風

阿膠散 治時氣先服此以安胎却以主藥間服

阿膠

白木

桑寄生

人參

白茯苓

右為末等分每服一錢用糯米飲調

下日三服

前胡湯 治傷寒頭痛壯熱肢節煩疼

石膏

前胡

甜竹茹

梔子

黃芩

大青

知母

右用葱

白水煎服

蘇木湯 治傷寒時行洒淅寒振或兼噉者

赤芍藥

橘紅

黃芩

黃連

甘草

蘇木

右水煎服汗出即罷

如胎不安服阿膠湯

黃龍湯 治妊婦寒熱頭疼嘔嘔不食脇痛嘔痰及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧或經水適來夢復熱不解散

柴胡 二錢 黃芩 炒 人參 甘草 各一錢 右用水煎服

柴胡石膏湯 治頭痛惡寒身熱拘急口乾

柴胡 二錢 甘草 一錢 石膏 三錢 右用薑水煎服氣虛加人參

枳實散 治傷寒四日至六日腹脹少食腰疼體重

枳實 炒三錢 陳皮 一錢 麥門冬 半錢 右用生薑葱白水煎服

旋覆花湯 治傷寒頭目旋疼壯熱心躁

旋覆花 赤芍藥 甘草 各五分 前胡 石膏 各一錢 白朮 人參

麻黃 去根 黃芩 各三分 右用薑水煎服

麥門冬湯 治傷寒壯熱嘔逆頭疼胎氣不安

人參 石膏 各半錢 前胡 黃芩 各五分 葛根 麥門冬 各一錢 右薑棗竹茹一分

用水煎服

梔子大青湯 治發斑變黑尿便血

升麻 梔子 各一錢 大青 店仁 黃芩 各一錢 右用葱白三寸水煎服

白朮湯 治傷寒煩熱頭痛胎動或時吐逆不食

白朮 橘紅 麥門冬 人參 前胡 赤茯苓 川芎

甘草 半夏 各分 右用生薑竹茹一分水煎服

良方白朮散 治傷寒



南京中醫藥大學圖書館藏

白木

黃芩少各二錢

右用薑棗水煎服若四肢厥逆陰症也不可用

芍蘇散 外感風寒壯熱頭疼心胸煩悶

紫蘇葉

川芎

白木

白芍藥

麥門冬法

陳皮

乾葛

各五

甘草

分三

右用生薑葱白水煎

參蘇飲

去木香

治證同前方見六卷第十二論

妊娠時氣方論第六

論曰四季之間非其時而有其氣謂春寒夏冷秋熱冬暖之不正也所感者不拘長少其症相類故云時氣妊娠患之重者多致傷胎

愚按前症與前傷寒互相主治

秦艽散 治時氣五六日不得汗口乾飲水狂言嘔逆

秦艽

柴胡各五

石膏一錢

犀角

赤茯苓

前胡

甘草

葛根

升麻

黃芩各四

右用淡竹茹一分水煎服

葛根飲子 治時氣煩熱口乾頭痛

乾葛

麻黃

去節根各半兩

石膏一兩

豉一合

白米半合

梔子

二七

葱白

二莖

右用水

煎分三服汗出為效

消熱飲子 治時氣六七日大小便不利

芒硝

一兩

葵子二兩

右如前煎服以利為效芒硝即朴硝

人參敗毒散

方見二十四卷第十論

妊娠熱病方論第七

冬時觸冒嚴寒即病為傷寒藏於肌膚夏至發為暑病即熱症也妊娠患之多致墮胎熱病與中暑相似

但熱病者脈實中暑者脈虛治當審察不可藥施

愚按此症與前後三症同治

治妊娠熱病頭痛嘔吐煩悶

人參無一方

竹茹

葛根各一兩

蘆根二兩

知母二兩

麥門冬去心兩半

右每服四錢連根

葱白三寸水煎

梔子仁散 治熱病發斑黑色小便如血氣喘急胎欲落

梔子

升麻

石膏

生地黃各二兩

黃芩

大青各一兩

右每服半兩葱白七

寸豆豉四十九粒水煎

大黃飲 治熱病六七日大小便秘澀

大黃微炒

石膏各一兩

知母

前胡

赤茯苓各三兩

甘草

黃芩各半兩

右每服五錢生地黃一分煎服

又方伏龍肝細研每服一錢水調下外用水塗臍下

又方葛根煮汁時服一盞

補遺蘆根湯 治熱病頭疼心煩嘔吐

知母四兩

青竹茹二兩

右每服五錢生蘆根一握糯米一撮水煎

梔子五物湯 治妊婦傷寒壯熱頭痛

梔子

前胡

知母

黃芩一兩

石膏四兩

右每服五錢用水煎服

升麻六物湯 治傷寒斑黑溺血

升麻

梔子各三兩

杏仁

黃芩

右每服五錢葱頭水煎

妊婦傷寒熱病防損胎方論第八



論曰非節之氣傷於妊娠熱毒侵損胞胎若不早治多致墮胎漏血則子母之命亦不能全矣

愚按前症當分察六經為主而參於前後方論

治妊娠傷寒身痛壯熱
葱白升切一 前胡 葛根 石羔各一分 青黛六分 升麻八分 梔子十

煎分三服

治妊娠傷寒大小便秘結

前胡十分 大黃 石膏各十分 梔子仁十枚 知母 黃芩 茯苓

生薑各八分 右用水煎分三服

治妊娠傷寒發斑忽黑小便如血胎欲落

梔子 升麻各四兩 青黛二兩 生地黄二十枚 石膏八兩 葱白升切一 黃芩三兩 右水煎

分三服忌熱物

又用井中泥塗心下乾則易二方出本事

補遺治妊娠熱病先以白朮散安胎方見前

妊娠熱病胎死腹中方論第九

論曰熱病以致胎死不能出者但服黑神散胎自下矣

愚按陳無擇先生云前症當視產母右面赤舌青知其子死面青舌赤知母死子生唇青吐沫子母俱

死若雙胎一死一活用黑神散竊謂前症宜補助產母使其胎自下黑神散恐其大熱不宜輕用果一

胎已死者用平胃散朴硝水銀下之最為穩當庶不併傷生者平胃散方見

黑神散又名烏金散靈死一方名肉桂散

桂心 當歸 芍藥 甘草炙 乾薑炒 生地黄各一兩 黑豆炒去皮



附子

炮去皮
臍半兩

右為末。每服二錢。空心用溫酒調下。

補遺胎死用紅花酒煮汁飲二三碗

又方伏龍肝為末溫酒調下二錢白湯亦可

又方朴硝末童子小便和熱酒調下三錢立出

姪娠瘧疾方論第十

論曰姪娠病瘧乃夏傷於暑客於皮膚至秋而發陽盛則熱陰盛則寒陰陽相雜寒熱俱作其發暴者由風邪客於風府循脊而下衛氣至一日一夜常大會於風府故發日晏與早者衛氣之行風府日下一節二十一日下至尾骶二十二日入脊內上注於伏衛之脈其行九日出缺盆其氣既止故發更早其間因發者風邪內搏五臟橫連募原其道遠其氣深其行也遲不能日作也姪娠而發多傷於胎

愚按前症因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲食停滯用六君子加桔梗蒼朮藿香外邪多而飲食少用藿香正氣散外邪少而飲食多用人參養胃湯勞傷元氣用補中益氣湯若鬱怒所傷用小柴胡兼歸脾湯若木侮土久而不愈用六君子為主佐以安胎藥仍參三陰三陽經而治之

附治驗

一婦人因怒患瘧舉發無期久而不已胸腹不利飲食少思吞酸吐痰用六君子湯加山梔柴胡二十餘劑尋愈嘔熱少食又用四君子加柴胡升麻為主佐以逍遙散而痊○一婦人瘧久不已嘔氣下氣胸腹膨脹食少欲嘔便血少淋此屬肝脾鬱怒用歸脾湯加柴胡山梔漸愈又用六君子湯加柴胡山梔升麻而愈一婦人患瘧已愈但寒熱少食頭痛嘔熱內熱此脾虛血弱也用補中益氣湯加蔓荊子頭痛頓止又用六君子湯加芍藥飲食頓進再用逍遙散加參朮而寒熱愈

七寶散治瘧疾一日一發或二日兩發或間日一發

常山 厚朴姜製 青皮 陳皮白去 甘草炒 檳榔 草果等分 右每服

半兩酒水各一碗煎至一碗去粗露一宿發時面東溫服良久再服一妊婦先寒後熱六脉浮緊用前散一劑而愈

人參養胃湯 治妊娠瘧疾寒多熱少或但寒不熱頭痛惡心身痛面色青白脉弦遲者又有驅邪散治證亦同方見卷第十八論

清脾湯 治妊婦瘧疾寒少熱多或但熱不寒口苦舌乾大便秘澀不進飲食脉弦數者

青皮 厚朴姜製 白木炒 草果 茯苓 半夏炒 黃芩

柴胡 甘草炙各五分 右用薑水煎

附方

交加散 治食瘧神效

肉豆蔻二枚生一煨 草豆蔻二個生一煨 甘草二錢半炒半生 厚朴二錢半炒半生 生薑二兩半生半煨 右用薑水煎發日五更服

仲景白虎加桂枝湯 治溫瘧

知母六錢 桂枝 黃芩各一錢 栝蒌根二錢 甘草炙 牡蠣 乾薑各一錢 右用水

煎服汗出即愈此少陽經藥也

桂枝薑活湯 治瘧處暑以前頭痛脉浮惡風有汗

桂枝 羌活 防風 甘草各一錢五分 右水煎發服吐加半夏麴

麻黃羌活湯 治症如前但惡寒無汗

麻黃去節 羌活 防風 甘草各半兩 右如前服加法同二方太陽經藥也

白芷湯 治瘧身熱目痛熱多寒少脈長先以大柴胡下之微利為度餘熱不盡當服此湯

白芷一兩 知母一兩上錢 石膏四兩 右粗末依前服陽明經藥也



桂枝芍藥湯 治瘧寒熱不論先後此太陽陽明合病寒熱作則必戰經曰熱甚而動也發熱則必汗泄

發熱經曰汗出不愈知內熱也乃陽風陰虛之證此湯主之否則久而傳於陰經矣

桂 五分 黃芪炒 知母 石膏 芍藥各二

桂枝黃芩湯 如服前藥轉甚三陽合病也宜此和之

柴胡 一錢 五分 黃芩 人參 甘草 各八分 半夏 石膏 知母 各五分 右每粗

末依前服如外邪已解而內未已再服下藥從卯至午發大柴胡下之從午至酉發邪氣在內也太陽

氣下之從酉至子發或至寅發邪氣在血也桃仁承氣湯下之微利後更以小柴胡湯徹其邪氣按此

太陽陽明少陽經藥也以上諸方並係發風寒暑熱之氣自外而入中於三陽之經者也

桂枝石膏湯 治瘧疾隔日先寒後熱寒少熱多

桂枝 五錢 石膏 一兩 五分 知母 一兩 五分 黃芩 一兩

邪氣所舍深者也

麻黃黃芩湯 治瘧疾如前症而夜發者

麻黃 一兩 去節 甘草 二錢 桃仁 二十個 黃芩 五錢 桂 二錢

血驟則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深透而入血故夜發乃陰經

有邪此湯發散血中風寒治風暑深入陰分乃血受病邪氣所含尤深者也麻黃桂枝桃仁等乃太陽

經血藥非三陰經藥也

附方

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯 三方見二十四卷第六論

藿香正氣散 方見二十四卷第十論

人參養胃湯 方見七卷第十八論

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

逍遙散

加味歸脾湯 二方見二十四卷第四論



妊娠霍亂方論第十

夫飲食過度觸目風冷陰陽不和清觸相干謂之霍亂其間或先吐或腹瀉吐利是因於熱也若頭痛體痛發熱是挾風邪也若風折皮膚則氣不宣通而風熱上衝為頭逆冷此陽氣暴竭謂之四逆妊娠患之多致傷胎也

愚按前症若因內傷飲食外感風寒用藿香正氣散若因飲食停滯手足逆冷者須用溫補之劑治當詳審毋使動胎也

附治驗

一姓婦霍亂已止但不進飲食口內味酸多行消導寬中余曰此胃氣傷而虛熱也當用四君子湯彼不信乃服人參養胃湯嘔吐酸水其胎不安是藥復傷也仍與四君子湯俾煎熟令患者先嗅藥氣不作嘔則呷少許恐復嘔則胎為釣動也如是旬餘而愈

人參散 治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不入

人參

厚朴 姜製

橘紅 各一錢

當歸

乾薑 炮

甘草 炙各五分

右用薑水煎服

人參白朮散 治脾胃虛弱吐瀉或吐瀉作渴不食

白朮

茯苓

人參

甘草 炒

木香

藿香 各五分

乾葛 一錢

右用水

煎服吐甚如生薑汁頻服之

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐瀉宜涼冷頻服

草薢仁

四兩 烏梅肉 三兩 甘草 炒 三兩

右每服半兩用薑十片水煎

木瓜煎 治吐瀉轉筋悶絕

吳茱萸

湯炮 生薑 切各一分

木瓜

木刀切 兩半

右每服二三錢用水煎

治霍亂其效神速一方有黃連無扁豆仍與第二論通用姓婦霍亂腹痛四肢逆汗脈細理中湯治之



傷食加陳皮寒甚脈欲絕陰症悉具加炮附子方見二十卷

竹茹湯治霍亂熱渴脈數見上卷嘔吐門

附方

藿香正氣散方見二十一卷第十論

人參養胃湯方見七卷第十論

香薷飲方見七卷第二論

平胃散方見七卷第十論

五苓散方見二十一卷第十論

四君子湯方見二十四卷第六論

理中丸方見二十一卷第八論





妊娠泄瀉方論第一

論曰妊娠泄瀉或青或白水穀不化腹痛腸鳴謂之洞泄水穀不化喜飲嘔逆謂之協熱下利並以五苓散利小便次以黃連阿膠丸或三黃熟艾湯以安之若瀉黃有沫腸鳴腹痛脈沉緊數用戊己丸和之暖腐不食胃脈沈緊用感應丸下之後調和脾胃若風冷水穀不化如豆汁用胃風湯寒熱臍下陰冷動泄用理中湯治中湯伏暑心煩渴瀉水用四苓散傷濕泄瀉小便自利用不換金正氣散胃冷渴此四證之大畧也仍參第八卷第八論主之

愚按米食所傷用六君加穀蘖麵食所傷用六君加麥蘖肉食所傷用六君加山查若兼寒熱作嘔及肝木侮脾土用六君加柴胡生薑兼嘔吐腹痛手足逆冷乃寒水侮土六君加薑桂不應錢氏益黃散若元氣下陷發熱作渴肢體倦怠用補中益氣湯若泄瀉色黃乃脾土之真色用六君加木香肉果若作嘔不食腹痛惡寒乃脾土虛寒用六君加木香薑桂若瀉在五更侵晨飲食少思乃脾腎虛弱五更服四神丸日間服白朮散如不應或愈而復作或飲食少思急用八味丸補命門火以生脾土為善

附治驗

邊太常側室妊娠泄瀉曾用枳木黃連之類腹悶吐痰發熱惡飲食到口即欲作嘔強匙許即吞酸不快欲用祛痰理氣余曰此因脾胃傷而痰滯中脘若治痰氣復傷脾胃矣遂以參朮炮薑為末丸如黍粒不時含嚥二五丸漸加至三日後日進六君子湯而尋愈進士王繼徵之內懷妊泄瀉惡食作嘔余曰脾氣傷也其君憂之強進米飲余謂飲亦能傷胃且不必強俟脾胃醒宿滯自化飲食自進不信別用人參養胃湯飲之吐水酸苦又欲投降大寒藥余曰若然則胃氣益傷也經云損其脾胃者調其飲食適其寒溫後不藥果愈

厚朴九 治洞泄寒中

乾薑炒

厚朴去皮

右水拌炒為末。水糊丸。梧子大。每服五十丸。米飲下。

草薢散 治虛寒泄瀉腹痛無度

厚朴

姜汁拌炒二兩

肉苳蔻

十個

草薢

十個

右每服三錢。用薑水煎。

附方

附子理中湯

方見二十一卷第八論

六君子湯

四神九

方見八卷第八論

妊娠下痢黃水方論第二

論曰。妊娠飲食生冷。脾胃不能消化。致令心腹疼痛。若血分病。則色赤。氣分病。則色白。血氣俱病。則赤白相雜。若熱乘大腸。血虛受患。則成血痢也。

愚按。治痢之法。當參前篇。其下黃水。乃脾土虧損。真色下陷也。當升補中氣。若黃而兼青。乃肝木剋脾土。宜平肝補脾。若黃而兼白。乃子令母虛。須補脾胃。若黃而兼黑。是水反侮土矣。必溫補脾胃。若黃而兼赤。乃心母益子。但補中益氣。若腸胃虛弱。風邪客之。用胃風湯。或胎氣不安。急補脾胃。而自安矣。凡安胎之藥。當臨病制宜。不必拘用阿膠艾葉之類。

附治驗

地官胡成甫之內。妊娠之劑。自用消導理氣之劑。腹內重墜。胎氣不安。又用阿膠艾葉之類。不應。余曰。腹重墜下。元氣虛也。胎動不安。內熱盛也。遂用補中益氣湯。安。又用六君子湯。全愈。

治妊娠利黃水

厚朴

薑汁炙

黃連

二兩

肉苳蔻

五個

連皮

右用水煎。

徐徐服。

忌如前。

已上六方並出產寶

