

臨証醫案傷寒辨證錄卷二

山陰陳士鐸敬之甫號遠公又號朱華子著述

會稽陶式玉尚白甫號存齋彙號

參訂

中風門

人有入室向火一邊熱而一邊寒遂致左頰出汗偶爾出
戶為賊風所襲覺右頰拘急口喎於右人以為中風之
症也而余以為非中風也乃向火而火逼其熱以併於
一邊耳若作風治而中實無風和其氣血而佐之以解
火之味則火平而喎斜自正也方用和血息火湯并麻

小病以全

不汗之自

易取效



北京中医药大学图书馆版

雖是火逼

逆熱亦由

氣血皆虛

所致故以

歸芪為君

佐以升麻

提右邊清

氣上升餘

用陽明輔

之方無下

者也

一錢當歸五錢黃芪三錢防風三分秦艽一錢白芷五

分桂枝三分天花粉二錢甘草一錢麥冬三錢玄參五

錢水煎服一劑輕二劑而喎斜正矣方中以補血補氣

為先而佐輔之藥多用陽明之味者何居蓋陽明之脈

起於鼻交於頰中循鼻外入上齒中是兩頰與齒正陽

明之部位也升麻白芷乃陽明經藥也故用之以引入

於齒頰而秦艽能開口噤防風能散風邪桂枝實表而

固營衛與歸芪玄麥同用自善通經絡而活臟腑使真

有風邪亦於何處存活矧原無大風之犯不過些小之



風乎自然效應如桴鼓也

此症亦可用

偏解散

當歸炒 梔子 生地 各三錢 烏藥 防風 白芷 各二錢 芩 一錢 黃芪 茯苓 各一錢 白芍 五錢 秦艽 一錢 水煎服

服

人有久痢之後一旦昏仆手撒眼瞪小便自遺汗大出不

止喉作拽鋸之聲人以爲中風之症也而余獨以爲不

然蓋此病乃下多亡陰陰虛而陽暴絕也本不可救然

急灸其氣海之穴而陽氣得續亦有生者雖然陽氣回

而不用補氣之藥陽氣隨回而隨絕也方用獨參湯人



參三兩附子三分煎湯灌之而人不死矣夫氣海之穴前與丹田相通乃生氣之原也故灸之而陽回非助之以人參則氣回於無何有之鄉而不能生生於無盡徒為接續又何益乎此人參所以為奪命之藥歟

此症亦可用參木加桂湯

人參二兩白木二兩肉桂一錢水煎灌服

人有兩手麻木而面亦麻者人以為中風將現之症也誰知乃氣虛而不能運化夫血乎夫頭乃六陽之經而面尤陽之外見也氣旺則陽旺氣衰則陽衰陽旺則氣行夫血而面乃和陽衰則氣滯於血而面乃木矣

厚...
中...
也...
不...
風...
氣...
中...
矣

大而陽氣之衰可知何能運動於臂指間母怪兩手

指盡麻也治法宜補其氣之虛通其陽之閉方用助陽

迴氣湯人參三錢白朮五錢黃芪五錢防風五分當歸

三錢葳蕤五錢廣木香三分附子二分烏藥二錢麥冬

二錢茯苓三錢天花粉二錢水煎服連服二劑而手之

麻木解矣再服二劑而面之麻木亦解矣更服二劑不

再發此方大補其氣氣旺而血行又何麻木之有

此症亦可用助

氣解麻湯

人參三錢白朮黃芪麥冬各五錢當歸荆芥各二錢
烏藥八分附子一分柴胡八分半夏一錢水煎服



人有身忽猝倒兩目緊閉昏暈不識人卽子孫亦不相識
人以爲中風之危症也誰知絕非中風乃心氣之乏絕
乎夫身中未有不痰盛者也痰盛則直走心經而心氣
乏絕則痰涎壅住於膻中而不能開矣雖膻中爲心君
之相痰來侵心膻中先受所以障心而使痰之不能入
也然則膻中本衛心以障痰何反壅痰以害心乎不知
心氣旣虛而膻中亦虛矣膻中旣虛僅可障痰以衛心
力難祛痰以益心也况痰氣過盛犯心甚急膻中堅閉
夫膜隔使痰之不入而心氣因之不通不能上通於人



風邪即世
人治風而
於著此也
也請遠公
大可勝痛
與

皆故目緊閉而不識人也治法急補其君相之火而佐

之祛痰之味心氣一通目自開而人自識也方用四君

子湯加減引之人參一兩白朮二兩茯苓三錢附子一

錢竹瀝一合薑汁一合菖蒲三分水煎服一劑而目開

再劑而人識矣此方用參朮以救心氣之絕然非假附

子之力斷不能破圍而直入即用附子而不用竹瀝薑

汁則痰涎間隔恐附子孤軍難於斬殺耳又佐之菖蒲

者借其向導引附子羣藥徑達心宮易施其祛除之力

也



此症用加味三

生飲亦神效

人參白朮各一兩附子南星半夏菖蒲遠志各一錢生棗仁三錢水煎服

人有素性好飲兩臂作痛服祛風治痰藥更加麻木痰涎

愈盛體軟筋弛腿膝拘痛口噤語澀頭目暈重口角流

涎身如蟲行搔起白屑人以爲中風之症已成也誰知

是脾氣之不足乎凡人後天全藉飲食之補益若飲食

過多反傷脾氣何能受益况酒能散人真氣少飲則益

多飲則損日日貪杯臟腑之間無非糟粕之氣欲真氣

之無傷得乎故體軟筋弛脾虛不能運也痰涎加盛脾



大甲

多身腰氣

虛寒故一

作風治重

耗胃氣胃

虛而脾益

虛為得而

不死乎

虛不能化也腿膝拘痛脾虛不能行也口禁語澀脾虛

氣難接也頭目暈重脾虛氣難升也至於流涎起房

則脾虛而不能攝一則脾虛而不能潤也以上諸症總

皆脾氣虧損之故方用六君子湯加味治之人參五錢

白朮一兩甘草一錢半夏二錢陳皮五分附子三分茯苓

苓三錢連服十劑而愈六君子湯耑補脾氣之藥也而

又兼善治痰然非加入附子則不能走經絡而通血脉

或疑白朮太多不知白朮健脾而夏善去濕多用始能

利腰臍而升陽氣則陽不下陷而脾得建其運化之功



中醫大學圖書館版

也

此症用參朮去

濕湯亦妙

人參白朮各五錢甘草半夏附子各一錢

山藥一兩薏仁三錢砂仁三粒水煎服

人有怒後吐痰胸滿作痛服四物二陳之湯加芩連枳壳

之類杳無一應更加祛風之味反致半身不遂筋漸攣

縮四肢痿軟日晡益甚內熱口乾形體倦怠人以爲風

中於腑也誰知是鬱怒未解肝氣未舒所致本無風症

治風而反爲風藥所損損氣傷血以成似中風之病也

治法必須仍解其鬱怒而佐之補氣補血之劑益陰益

中風得於

肝木之旺

者居多得

於肝木之

鬱者猶少

遠公之論

論症之全



也不可執
以標治

精之味庶幾可救耳方用舒怒益陰湯熟地一兩當歸

五錢茯苓二錢甘草五分白芍一兩陳皮五分麥冬三

錢丹皮三錢柴胡一錢白朮二錢人參一錢水煎服十

劑而筋不攣縮矣再十劑而四肢不痿軟矣後純用六

味湯大劑煎飲二月而半身皆遂矣此方即逍遙散加

味者也用參熟麥丹於逍遙散中實有妙義蓋逍遙散

為解鬱之聖藥鬱散而得補則補始有功而方中全在

用白芍至一兩以平肝氣肝平則木不尅土而土有生

氣况又有健脾開胃之品以輔佐而相成所以能反敗



為功也

此症用加減道

遙散亦驗

柴胡二錢 白芍五錢 白朮當歸生地各三錢
甘草炒 梔子半 夏各一錢 青皮五分 水煎服

人有懷抱鬱結筋攣骨痛喉間似有一核結住不下服焉

藥順氣散等藥口眼歪斜兩臂不能伸舉痰涎愈甚內

熱瞞熱人以爲偏枯之漸也誰知是肝木之不舒乎夫

木最喜水木鬱則耗水矣水耗而木更難舒木既不舒

而木中之火又安得而舒乎自然木來尅土而脾胃兩

傷脾熱胃燥內自生風而現風象正不必外來之風入

以方國上
醫推廣
之也



始見歪斜之症也治法自必補脾胃之士矣然而徒補脾胃之氣而肝來尅土脾胃仍不舒也必須攄肝以扶脾胃之爲得耳方用舒木生土湯白芍五錢茯苓三錢山藥一錢生棗仁二錢遠志一錢甘草五分白朮三錢熟地五錢鬱金一錢人參一錢麥冬二錢當歸二錢玄參三錢水煎服此方心脾胃肺肝腎兼治之藥也何以謂之舒木生土湯不知方中雖是兼治之藥而實爲專治肝經也治心者不耗肝氣也治腎者所以生肝也治肺者使其不來尅肝也治脾胃者使其不來仇肝也故



用羣藥無非滋肝以舒木木舒矣而脾胃有不得其天者乎此舒木生土之名實有微意耳

此症用疏木

飲亦佳

柴胡薄荷甘草蒼朮白芥子各一錢白芍五錢
茯苓三錢丹皮生地各二錢青皮五分水煎服

有人一時猝倒口吐痰涎發狂號叫自坐自起自立自行

目不識人身中發斑數日後變成瘡癩者此謂真正中

風蓋其人元氣未虛一時爲風邪所中正氣旣盛而邪

氣又不弱正與邪相戰兩不肯負於是而痰涎生於是

而狂叫起心中如焚坐立不安行止不定目不識人內



熱既盛必由內而發於外故紅斑燦爛於皮膚火毒鬱
消於肌肉因變爲瘡爲癰譬如人家門戶既牢土伯重
旅又健突來強盜劈門而入兩相格鬪因而火攻焚殺
反成焦頭爛額之傷矣治法不必助正而惟事祛邪掃
蕩賊風而正氣已安方用掃風湯荆芥五錢防風三錢
半夏三錢陳皮一錢天花粉一錢五分茯苓三錢黃芩
二錢蘇葉一錢水煎服一劑而狂定二劑而痰消三劑
而斑化瘡癰亦尋愈矣此等之症萬人中生一者也人
亦不知是中風之真症吾獨表而出之使人知真中風

之如此而類中風可照症而治之也

此症用排風

飲殊效

大黃酒蒸三錢丹皮五錢甘草防風天麻天南星各一錢玄參一兩柴胡三錢頃芩蘇葉荆芥各二錢當

歸三錢水煎服

人有素多內熱一旦顛仆目不識人左手不仁人以為中

風之症誰知此乃腎水不足以養肝肝木太燥木自生

風而自仆非真中風也若作風治鮮不立亡即作氣虛

治亦陽旺而陰愈消非恰中病情之法必須仍補腎水

以生肝本則木得其養而左手之不仁可以復愈方用

木自生風

補水而風

恬淡靜誰

人知之



六味地黃湯加味治之熟地一兩山茱萸五錢山藥四錢茯苓三錢丹皮三錢澤瀉一錢白芍一兩當歸五錢白芥子三錢柴胡一錢水煎服一劑而目能識人四劑而手知痛癢十劑全愈矣夫六味地黃丸料非治中風之藥也今用之以滋其腎水又用芍藥當歸以平其肝木柴胡白芥子以疏通肝氣而消其兩脇之痰水足而木自條達痰去而氣自流通內熱頓除外體自適亦何至左手之不遂哉

此症用潤燥丹亦效

熟地二兩白芍一兩柴胡五分天花粉三錢水煎服