

图 15
6

松心堂医案經驗抄



松心望殿紫經臨針

吳門繆直亭先生著

思慮傷心脾故心中為物蒙蔽善條件之故動
汗的食稍安歸脾的對方也用張氏方

歸脾方加淮麥 玫瑰花 南棗 熟地

勞心太過心火下吸腎水不能上供故至口渴其舌
苔之右白者脾不司運也左脈既沉右關尺大虛軟
不耐按中之下陽已衰故是冷因噤食不磨等沙
蜂起矣此證難治一味壘補是鈍根人以為若一

味滿通又其心嘈為害一證有礙脾胃之氣全
在神而明之耳

與前方加益智 以連 鹽水炒肉桂

每服歸脾加肉桂以連益智淮麥南粳辰砂而酒
足冷思嘔食不運化等症悉除矣今在脾胃緩軟
無力直搥坐真氣不鼓而胃脘已滿再另力一法
以益氣而生血

炙芪 杜仲 丹參 續斷
焦朮 牛膝 當歸 紅花

按述服人復熟地血濁少益中不適是由氣伏
之以得補而不以降也試觀服生地黃版等後藥便
納達而下血尤多其理尤曉然而易明則前方壯
服柏杞沙苑大非既宜以其助龍雷之火也即壯
塤一味於淋濁似有益終空火鬱而不宣有阻寒之
患人復雖有益氣之功而肺氣還傷肺亦不可不
慮斟酌損益必須於臟真無此碍方稱穩當要
方固非易也

生地 血餘末 丹皮炭 線魚膠



人中的 藕節炭 煨山藥 料豆皮

十大功勞 里殼連連

尿血莖中痛如刀割 係伏暑為患

導赤散合黃連阿膠湯去白芍加丹皮

尿血未已又白色小塊此從四月中遠來必受暑者
濕熱以成病

大埔陰后導赤散加丹皮山梔生地川連黃

芩 藕節炭

氣雖逆左乳傍跳動而自浮上行於背若阻



而不以此衝脈之逆也夫脈挾臍上以至胸中而散
何以於背考之靈樞血者五味篇謂衝脈任脈
皆起于胸中上行於背是衝脈有行于背矣蓋古
又有謂以督脈為衝者其源一源三歧雖起于
陰而同歸于太衝則一也今病之最不遺者在于
背不以此為督脈病故特為之論以明之

炒鐵地

紫石英

甘菊

牡蠣

阿膠

石決明

以石斛

丹艾

天冬

鴨肝

診脈左弦而右濡肝強而脾弱蓋之腎陽不振少陰

之樞不利無以鼓動中州之氣木乘土虛而益於
為紫此其顯然者也宜用仲醇脾腎雙補丸
味以調之

製本

車前子

巴戟天

五味

煨礬

蓮肉

肉豆蔻

補骨脂

小茴

兔絲

砂仁

波附子

毛鹿角

橘紅

右為末人參末銖花湯拌飯搗

爛為丸每服四錢米湯送下飯用

南粳煮湯



濁症淋瀝莖中微痛法用導赤茯苓小兒
丸三方先入加減

生地 生叶稍 生芫花子

木通 白茯苓 白荷花露

冷脉右尺不振天施地生以陽用事生之之概此
今其陽已衰大失所以生之之具鼓舞而作興
之不得資與藥力矣

毛鹿角 鯉魚膠 生芫花 遠志炭 鴿涎

北細辛 補骨脂 金鈴子 沒夜藥 海馬



北京中醫藥大學圖書館版權所有

雄神虫螯

鹿胃

沉香末

沙苑子

黄狗外肾

蛤蚧

柏子

青金

穿山甲

白茯苓

紫河车

杜仲

羊腰子煮熟为末入鸽蛋为丸服之

精摇手梦心肾同治

炒熟地

远志

山茱

杜仲

黄鱼胶

生茯苓

酥骨

莲花

茯苓

沙苑

病患恒多

细撈用酒自煎

饅鯉

三條斤許殺勿盡熟中微帶一塊先鋪落荷叶上置罌口上
於建建百部炙片丹炙桂三年取去但用里蓮共炙打粉



為錠煅條麝末

紫河車

自漂煮加入砂以柏身全煮取用河車去以柏力未

大蟹

殺之泥塗煨研末

猫取鷹

去毛煨而丸上桑研細

啄木巷鳥

以鷹煮炙

鎮地

人中白

血餘炭

獺肝

山藥藕汁製長漿為丸每服四

丸

形足如冰心中如焚坎中之水不升離中之火不降

此之謂至

肉桂七味丸加川連牛膝炭青鹽

氣易上逆脈即見結此奔豚善治也治在下焦

七味加沉香紫石英赤石脂子桐杞炭



任前腹痛當作營虛欲空氣滯治若用溫營
法與任後週身之痒不貫矣治肝宜涼宜靜與
一法正自中合

細生地 丹皮

甘菊

杜仲

白薇

龜腹版

料豆皮

桑附

青蒿

川柏

山查炭

夏枯草

牛角腮

椿槲

白螺蛳壳

經事淋漓不止

歸脾加枸杞杜仲沙苑蓮房炭

氣不下潛上攻胸脘

六味加沉香砂仁

診脈不惟脾胃之陽虛而腎陽亦不充惟火生土衰
則中州之氣不振食少便溲

焦木

山藥

巴戟肉

砂仁

扁豆

麥冬

陳皮

蓮蓬肉

米粉
力丸

失血之後咳不止至晚必嘔是由氣逆火升既經

述既服之藥多用附桂豈陰寒之體既宜寒不可

漂凌藥

北沙參

霞天膠

料豆史

腎陽衰微濁陰上泛疫喘氣逆改由求也

附子又味加童便胆汁牛膝葱白



咳而有痰右脇下有痰咳痰多則癰形小痰少則癰
形大是病在痰

製夏

杏仁

白芥子

瓦楞子

妙歸

牡蠣

楊紅

桑白

海浮石

妙歸

咳多痰微惡寒而脈數便溏頭眩力而栗三
焦俱病非易治也

猪脊

丹沙參

茯苓

煨藥

川貝

霞天

虎子

十大功勞

脈數失血咽痛失音金枯水竭之象姑用升



法此從來未有者也

濃後調入珠粉末分

海參

人中白

麥冬

好生地

當歸 豆 苡湯代水

夜咳更盛不能臥口中乾明是淺分之

炒松花也

水梨汁

冲服

真陰不足故不受辛燥蓋之時有咳血更難進久服
流降藥熱味頗投但脾土以痢而傷今痢尚未止耳
進流膩江河有日下之勢其能患乎現在飲食頗
少脾傷及胃理既必然直於理脾中參用活法庶



为近之

霞天胶

防风

白芍

藜蘆

炙甘草

秦皮

黄蘗

芩下不止

炒生地

绵鱼胶

杜仲

枸杞

料

沙蒺藜

椿根皮

白薇

牡蛎

牛角腮

疫飲射肺致咳

二陳加桑皮杏仁苏子

咳嗽每在春夏之交寒暖不时之候也至天热则



已其為害因可知矣法宜溫但前曾見血不可
用辛燥傷肺又脾土容易湧泄而不用流脈傷脾
於此最宜斟酌耳

欬冬

炒以貝

扁豆

海石

枳實

水薤白

薤白

此證苦無精氣精而欲取精以實之則小便自不患
其不利矣

炒熟地

猪脊髓

胖海參

黑亮建蓮

生杜仲

鯢魚膠

為丸



身止自利咳嗽噁心呃逆时邪有潜伏之患
寒在上而下痢未除舌红而渴疫粘腻又难出邪
有陷象

紫胡

茯苓

羌

参

枳壳

桔梗

独

活

前胡

邪^又陷入裡用通流挽舟之法而邪究不能透
则陷者恐有一入而不复出之虞太陰主開折
反合故胸痞自利則^亡津液故口燥升清所以
救液而建中所以祛濕是或一道

