

重刊萬方類纂

四

汗出止

杜蒺藜當歸等分爲末米飲每服三錢

巴豆去油如綠豆大三丸以烏金石末一錢調

湯送下卽通

虎杖三兩凌霄花沒藥一兩爲末

熱酒每服一錢

腹大如甕氣短欲死虎杖一斤

去頭暴乾切土瓜根汁牛膝汁二斗水一斛浸虎

杖一宿煎取二斗入二汁同煎如餳每酒服一合

日再夜一宿血當下

虎杖煎治女人月經不通

腹內積聚虛脹雷鳴四肢沉重亦治丈夫積聚取

高地虎杖根剉二斛水二石五斗煮取一斗半去

滓入醇酒五升煎如餳每服一合以知爲度

結成癥塊腹脹大欲死牛旁根二斤剉蒸三遍以

生絹袋盛之以酒二斗浸五日每食前溫服一盞

又馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓

熬成膏每服半匙熱酒化下日二服

心腹滯悶一日二服

四肢疼痛用赤馬肝一片炙碾每食前熱酒服一

錢通乃止

臍腹積聚疼痛硇砂一兩皂角五挺

去皮子剉爲末以頭醋一大盞熬膏入陳橘皮末

三兩搗三百杵丸梧子大每溫酒下五丸宿有

風冷留血積聚月水不通菴蕘子一升桃仁二升

酒浸去皮尖研勻入瓶內以酒二斗浸封五日後

酒浸去皮尖研勻入瓶內以酒二斗浸封五日後

酒浸去皮尖研勻入瓶內以酒二斗浸封五日後

酒浸去皮尖研勻入瓶內以酒二斗浸封五日後

酒浸去皮尖研勻入瓶內以酒二斗浸封五日後

酒浸去皮尖研勻入瓶內以酒二斗浸封五日後

每飲三合日三服

帶下少腹滿或經一月再見

者土瓜根散主之土瓜根

芍藥桂枝蠆蟲各三兩

爲末酒服方寸七日三服

或兩三月或半年一

年者用麻子仁一升桃仁二兩研勻熟酒一升浸

一夜日服一升不行至一年臍腹痛腰腿沉重

寒熱往來用芥子二兩爲末每服二錢熟酒食前

服數年不通面色痿黃唇口青白腹內成塊肚

上筋起腿脛或腫桃根煎

主之用桃樹根牛旁根馬鞭草根牛膝蓬蘽各一斤剉以水三斗煎一斗

去滓更以慢火煎如餳狀收之每以熱酒調服一

匙萬應丸治女人月經瘀閉不來繞臍寒疝痛

徹及產後血氣不調諸癥瘕等病用乾漆一兩打

碎炒烟盡牛膝末一兩以生地黃汁一升入銀石

器中慢熬俟可丸丸如梧子大每服一丸加至三

五丸酒飲任下以通爲度

月經不利血氣上攻

欲嘔不得睡用當歸四錢乾漆三錢炒烟盡爲末

煉蜜丸梧子大每服十五丸空心溫酒下

女人

月水不通臍下堅如盃時發熱往來下痢羸瘦此

爲血瘕若生肉瘕不可治也乾漆一斤燒研生地

黃二十斤取汁和煎至可丸丸梧子大每服三丸

高  
方  
貞  
養  
四  
調  
經  
二

空心酒下 月經久閉蠶沙四兩砂鍋炒半黃色  
入無灰酒一壺煮沸澄去沙每溫服一盞卽通

龍胎治產後餘疾並治女人經閉積年不通同瓦  
松景天各少許以水兩盞煎一盞去滓分二服少

頃腹中轉動便下 經脈不通積血不散用烏鵲  
散主之烏鵲去皮毛炙三分當歸焙好墨各三分

延胡索炒蒲黃炒水蛭以糯米炒過各半兩

茺青糯米炒過一分爲末每服一錢酒下

月經不調

血臟冷痛此方平易捷徑熟附子去皮當歸等分每服三錢水煎服

阿膠一錢蛤粉炒成珠研末熱酒服卽安一方入辰砂末半錢

久而無子乃衝任伏熱也熟地黃半斤當歸二兩黃連一兩並酒浸一夜焙研爲末煉蜜丸梧子

大每服七十九米飲溫酒任下 產後月水往來

乍多乍少白狗糞燒

末酒服方寸七日三

月信澀滯

囊荷根細切水煎取二升空心入酒和服

月經逆行

從口鼻出先以京墨磨汁服止之次用當歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分溫服

其經卽通

魚膠切炒新綿燒

灰每服二錢米飲調下卽愈

五旬行經

婦人五十後經水不止者作敗血論用茜根一名過山薑一兩阿膠側柏葉炙黃芩

各五錢生地黃一兩小兒胎髮一枚燒灰

分作六帖每帖水一盞半煎七分入髮灰服之

芩心丸

治婦人四十九歲已後天癸當住每月都行或過多不止用條芩心二兩米醋浸七日炙乾又浸如此七次爲末醋糊丸梧子大每服七十丸空心溫酒下日二次

通經破血

舊屋陰處五花活者五兩熬膏當歸鬚乾漆一兩燒烟盡當門子二錢爲末棗肉和

丸梧子大每服七

十丸紅花湯下

經閉驗胎

經水三個月不行驗胎法川芎生爲末空心煎艾湯服一匙腹內微動者是胎不動

者非  
也

室女經閉

當歸尾沒藥各一錢爲末紅花浸酒面北飲之一日一服凌霄花爲末每服二錢

食前溫酒下

類纂四

三

茜根一兩煎酒服之一日卽通甚  
用酢榴根東生者一握炙乾水二大盞濃煎

一盞空心服之未通再服

心溫酒服二錢恍惚煩熱者鉛霜半兩生地黃

汁一合調下日三服血結成塊心腹攻痛質汗

薑黃川大黃炒各半兩爲末每服一錢溫水下

月水不止阿膠炒焦爲末酒服二錢羊前左腳脰

分每服一錢溫酒服之牡蠣煅研米醋搜成團

再煅研末以米醋調艾葉末熬膏丸梧子大每醋

湯下四十九側柏葉炙芍藥等分每用三錢

水酒各半煎服室女用側柏葉木賊炒微焦等分

爲末每服二錢米飲下拒霜花蓮蓬殼等分爲

末每用米飲下二錢青竹茹微炙爲末每服三

錢水一盞煎服船茹一斤淨洗河水四升半煮

二升半分二服瑞蓮散用陳蓮蓬殼燒存性研

末每服二錢熟酒下五靈脂炒烟盡研每服二

錢當歸兩片酒一盞前六分熱服三五度取效

紅鷄冠花一味曬乾爲末每服二錢空心酒調下

忌魚腥猪肉箬葉灰蠶紙灰等分爲末每服二

錢米飲下

木賊炒三錢水一盞煎七分溫服日

一次

一服

生地黃汁

每服一盞酒一盞煎服日二次

梅葉焙

白芍藥香附子熟艾葉各一錢半水煎服之

每次

烏龍尾炒

櫟皮灰各等分爲末每服二錢酒調下

每次

勞損黃瘦

暫止復發小勞輒劇者槐耳炒黃

每次

赤石脂

各一兩爲末食前熱酒服二錢桑黃亦可

每次

日二服桑黃須

研不必加赤石脂來無時者

每次

案紙二十張燒

灰清酒半升和服頓定冬月用緩

每次

酒服之日漸黃瘦者紫鉤末二錢空心

白湯下

每次

用黑驢屎燒

存性研末麪糊丸梧子大每空心

每次

酒下五七十九

神效並治血崩炒豆紫湯服

每次

之佳方載

產後門

經水過多

赤石脂

破故紙一兩爲末每服二錢米飲下

婦人月水論

女子陰類也以血爲主其血上應太陰

每次

月一行與之相符故謂之月水月信月經經者常

也有常軌也天癸者天一生水也邪術家謂之紅

萬方彙編四調經四

鉛謬名也女人之經一月一行其常也或先或後  
或通或塞其病也復有變常而古人並未言及者  
不可不知有行期只吐血衄血或眼目出血者是  
謂逆行有三月一行者是謂居經俗名按季有一  
年一行是謂避年有一生不行而受胎者是謂暗  
經有受胎之後月月行經而產子者是謂盛胎俗  
名垢胎有受胎數月血忽大下而胎不墮者是謂  
漏胎此雖以氣血有餘不足言而亦異于常矣女  
子二七天癸至七七天癸絕其常也有女年十二  
受孕者有六十餘生二男一女者此又異常之尤  
者也學醫者  
亦宜留心焉

婦人血氣

紫荆皮爲末醋糊丸

櫻桃大每酒化服一

丸

木通濃煎三五盞飲之卽通

血氣

刺痛五靈脂生研三錢酒

一盞煎沸熱服

又荔枝核燒存性半兩香附子炒

一兩爲末每服二錢鹽

湯水飲任下名蠲痛散

血氣心痛數年不愈用

人言半分茶末一分白湯調下吐瘀血一塊而愈

血氣遊走作痛及腰痛蓬莪茂乾漆二兩爲末

酒服二錢腰痛核桃酒下

腹中刺痛經候不調

酒服二錢腰痛核桃酒下

腹中刺痛經候不調

用立胡索去皮醋炒當歸酒浸炒各一兩橘紅二兩爲末酒煮米糊丸梧子大每服一百九空心艾  
醋湯下 血氣作痛及下血無時月水不調用革  
茭鹽炒蒲黃炒等分爲末煉蜜丸梧子大每空心  
溫酒服三十九兩服卽止名二神丸 脾下氣脹  
月經不利血氣上攻欲嘔不得睡當歸四錢乾漆  
燒存性二錢爲末煉蜜丸梧子大每服十五九溫  
酒下 血氣冷痛攻心鉛二兩石亭脂二兩木香  
一兩麝香一錢先化鉛炒乾入亭脂急炒焰起以  
醋噴之傾入地坑內覆住待冷取研粟飯丸芡子  
大每用二九熱酒化服取汗或下或通氣卽愈如  
大便不通再用一丸入玄明粉五分服 婦人不  
會生長血氣疼痛不可忍二聖丸濕漆一兩熬一  
食頃入乾漆末一兩和丸梧子大每服三四丸溫  
酒下怕漆人不可服並治丈夫疝氣小腸氣撮痛  
者 血氣刺痛紅藍子一升搗碎以無灰酒一大  
升拌子暴乾重搗篩蜜丸梧子大空心酒下四十  
丸 又心痛門失笑散 血氣攻心痛不可忍蓼  
根洗剉浸酒飲又沒藥末二錢水一盞酒一盞煎  
服 血氣脹滿劉寄奴穗實爲末每服三錢酒煎

服不可過多令人吐利此破血之仙藥也

一切

血氣腹痛天仙藤五兩炒焦爲末每服溫酒調服

一切

婦人久冷血氣攻心痛不止以葉子雌黃二兩

一切

細研醋一升煎濃和丸小豆大每服十五九醋湯

一切

下婦人血病用白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸七

一切

七日三夜一血化爲水也

補血破氣

追氣丸治婦人血刺小腹痛不可忍亦可常服補血虛破氣塊甚效用雲臺子微炒

桂心各一兩

高良薑半兩爲末

糊丸梧子大每淡醋湯下五丸

婦人血塊

土牛膝根洗切焙搗爲末酒煎溫服極效

福州人單用之

血癬作痛大黃一兩酒

二升煮十沸頓服取利

癥瘕門有血癬一條

婦人血塊

吃力伽散用白朮白茯苓白芍藥

各一兩甘草半兩爲散薑棗煎服

婦人勞熱心忪

地黃煎用生乾地黃熟乾地黃等分

爲末生薑自然汁入水相和打糊丸

梧子大每服三十九用地黃湯下或酒醋茶湯下  
亦可日二服覺臟腑虛冷則晨服入味九地黃性  
冷壞脾陰虛則發熱  
地黃補陰血故也

婦人發熱

欲成勞病肌瘦食減經候不調地髓煎用  
乾地黃一斤爲末煉蜜丸梧子大每酒服

五十

婦人骨蒸

載發熟門

婦人夜熱痰嗽

月經不調形瘦者用爪藶仁一兩青  
黛香附童尿浸曬一兩五錢爲末蜜

調噙化之

婦人五心發熱

水仙花乾荷葉赤芍藥等分爲  
末白湯每服二錢熱自退也

女子少腹痛

女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰  
中切痛連脊間如刀錐所刺不可忍者

疑是鬼疰服諸藥無益其疾轉增審察前狀卽用  
此藥其藥用夏五月積雪草正放花時卽采曝乾

搗篩爲粉每服二方寸七和好醋二小合攬勻平  
旦空腹頓服之每日一服以知爲度如女子陰冷  
者卽取前藥五兩加桃仁二百枚去皮尖熬搗爲  
散以蜜爲丸如梧子大每日空腹以飲及酒下三  
十九日再服以愈

爲度忌麻子蕎麥

### 乾血氣痛

蝙蝠一箇燒存性每酒服一錢卽愈

血

氣不行上衝心膈變爲乾血氣者用絲瓜

一

枚燒存性空心溫酒服

錦紋大黃浸酒曬乾

四兩爲末好醋一升熬成膏丸芡子大卧時酒化

一丸服大便利一二行紅漏自

下乃調經仙藥也或加香附

### 婦人血厥

平居無疾苦忽如死人身不動搖目閉口噤或微知人眩冒移時方寤此名血厥亦

名鬱冒出汗過多血少陽氣獨上氣塞不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤婦人尤多

此證宜服白薇湯用白薇當歸各一兩參半

兩甘草一錢半每服五錢水二盞煎一盞溫服

### 血枯

有病胸脇支滿者妨于食病至則先聞腥臊臭清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名

曰血枯得之年少時有所大脫血或醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以四烏賊骨一蘆茹爲末丸以雀卵大如小豆每服五丸飲以鮑魚汁飯後藥先所以利腸中及傷肝也三藥並不治血枯而經法用之是攻其所生所起耳

血結婦人小腹滿如敦狀小便微難而不渴此爲水與血俱結在血室大黃二兩甘遂阿膠各一兩水一斗半煮半升頓服其血當下

血奔舊敗蒲席燒灰酒服二錢

血運沒藥末一錢酒服

血勞憔悴困倦喘滿虛煩喿少氣發熱多汗口乾舌溢不思飲食名血風勞油煎散用五加皮牡丹皮赤芍藥當歸各一兩爲末每用一錢水一盞用青錢一文蘸油入藥煎七分溫服常服能肥婦人

**血黃**

黃茄子竹刀切陰乾爲末每服二錢溫酒調下

**婦人血風**

虛冷月候不勻或手腳心煩熱或頭面浮腫頑麻用川烏頭一斤清油四兩鹽四兩

鎰內同熬令裂如桑椹色爲度去皮臍五靈脂四兩爲末搗勻蒸餅丸如梧子大空心溫酒鹽湯下

二十九丸亦治丈夫風疾血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事者用喝起草嫩心陰乾爲末以酒服一大錢其功甚效此物善通頂門連腦蓋卽蒼耳也烏荊丸並治婦人血風見諸風門頭

痛門女人頭痛條下有血風證一條

**婦人惡血**

攻聚上面多怒牡丹皮半兩乾漆燒烟盡半兩水二鍾煎一鍾服琥珀和大黃罇

甲作散酒下方寸七下惡血婦人腹內血盡卽止

**婦人氣盛血衰**

變生諸證頭運腹滿皆宜抑氣散主之香附子四兩炒茯苓甘草炙各一兩橘紅二兩爲末

每服二錢沸湯下

**男女血虛**

麥門冬三斤取汁熬成膏生地黃三斤取  
汁熬成膏等分一處濾淨入蜜四之一再

熬成瓶收每日白

湯點服忌鐵器

**婦人勞復**

病初愈有所勞動致熱氣衝觸手足搘搘  
拘急如中風狀淡竹青茹半斤栝樓二兩

水二升煎一

升分二服

**婦人百病**

諸虛不足者當歸四兩地黃二兩爲末  
蜜丸梧子大每食前米飲下十五丸

**女人諸病**

四制香附丸治婦人女子經候不調兼諸  
病大香附子擦去毛一斤分作四分四兩

醇酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩童子小便  
浸春三秋五夏一冬、七日淘洗净曬乾搗爛微焙

爲末醋煮麪糊丸梧子大每酒下七十丸瘦人加  
澤蘭赤芍芩末二兩氣虛加四君子料血虛加四

物料 香附濟陰丸治婦人月經不調久成癥積  
一切風氣用香附子一斤分作四分以童洩鹽水

酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊和作餅  
曬乾晚蠶沙半斤炒莪茂四兩酒浸當歸四兩酒

浸各焙爲末醋糊丸梧子大每服七十丸米飲下  
日二 醋附丸治婦人室女一切經候不調血氣  
漏帶下便血癥瘕積聚及婦人數墮胎由氣不升  
降服此尤妙香附子米醋浸半日砂鍋煮乾搗焙  
石臼爲末醋糊爲丸醋湯下又艾附丸治同上香  
附子一斤熟艾四兩醋煮當

歸酒浸二兩爲末如上丸服

婦人狐瘕

因月水來或悲或驚或逢疾風暴兩被濕

腰背痛引陰中小便難嗜食欲嘔如有孕狀其瘕  
手足成形者殺人未成者可治用新鼠一枚以新  
絮裹之黃泥固住入地坎中桑柴燒其上一日夜  
取出去絮入桂心末六銖爲末酒服方寸匕不過

二服當

自下

鬼胎癥瘕

經候不通芫花根三兩剉炒黃爲末每服

一錢桃仁煎湯調下當利惡物而愈 婦人經脈不通癥塊脹滿腹有鬼胎用葛上亭長五枚以糙米和炒去翅足研末分三服空心甘草湯

下須與覺臍腹急痛  
以黑豆煎湯服當通

婦人無子

立春雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有  
子神效二月丁亥日取杏花桃花陰乾爲末戊子日和井華水服方寸七日三服白狗

骨煎汁同米煮粥補婦人令有子上元盜取當  
家燈盞置床

下令人有子

子宮虛寒

婦人無子由子宮虛寒下元虛月水不調或閉或漏或崩中帶下或產後敗血未盡

內結不散用紅娘子六十枚大黃芩桑白皮一百二十枚爲末棗肉爲丸如彈子大以  
綿裹留繫用竹筒送入陰戶一時許發熱渴用熟湯一二盞解之後發寒靜睡要安三日方取出每  
日空心以鷄子三枚胡椒末二分炒食酒下以  
補之久則子宮暖矣女陰門有婦人陰冷條

婦人黃疽

見黃疸門

婦人嘈雜

按陳自明云皆血液渙汗變而爲痰或言是血嘈多以猪血炒食而愈蓋以血導血