

保嬰撮要

保嬰撮要卷十三

續集

薛氏醫按

吳郡薛已著

江都吳中珩校

喉痺

一附五臟虛羸傳變喉間內潰或鼻中垂出息肉或鼻外患瘡

一小兒喉痺因膏粱積熱或稟賦有熱或乳母七情之火飲食之毒當分其邪蓄表裡與症之輕重經之所主而治之若左腮色青赤者用膽經風熱也用柴胡梔子散右腮色赤者肺經有熱也用瀉白散額間色赤者心與小腸經熱也用導赤散若兼青色風熱相搏也用加味逍遙散鼻間色黃脾胃經有熱也用

瀉黃散若兼青色木乘土位也用加味逍遙散兼赤
色心傳土位也用柴胡梔子散顏問色赤腎經有熱
也用地黃丸凡此積熱內蘊二便不通者當踈利之
風邪外客而發寒熱者當發散之外感風邪大便秘
結煩渴痰盛者當內踈外解若因乳母恚怒肝火者
母服東垣清胃散若因乳母恚怒肝火者母服加味
逍遙散稟賦陰虛者兒服地黃丸大槩當用輕和之
劑以治其本切不可用峻利之藥以傷真氣也

一小兒喉間腫痛驚悸飲水服驚風降火之藥益甚
仍欲攻風痰余曰驚悸飲水心經虛症也蓋腎爲五

臟之本先用五味異功散以補胃加桔梗甘草以消
毒諸症頓退後用牛蒡子湯加柴胡而愈

一小兒喉間腫痛左腮色青赤此心肝二經之熱也
用柴胡清肝散而愈後因驚服至寶丹吐痰發搐手
足指冷此肝木虛而肺金乘之用補中益氣湯以補
脾肺六味地黄丸以滋肝腎而痊

一小兒發熱飲冷大便秘黃色手足竝熱不能吮乳視
口內無患捫其喉間則哭此喉內作痛乃脾胃實熱
也用瀉黃清胃二散各一劑母子竝服而愈後因乳
母飲酒兒躁不安口內流涎仍用前二散而愈

一小兒喉間腫痛口角流涎手足並熱用瀉黃清胃
二散母子服之而愈後因母大怒兒憎寒發熱仍復
流涎用柴胡清肝散加漏蘆母子服之而愈

一小兒喉間腫痛發熱咳嗽大便秘結此肺與大腸
有熱也先用牛蒡子湯加硝黃一服大便秘通乃去
消黃再劑頃愈審其母有肝火發熱用柴胡清肝散
母子並服而痊

一小兒嗜膏粱之味喉間腫痛痰涎壅盛服巴豆丸
前症益甚口鼻出血唇舌生瘡大便秘不實余用犀角
地黃湯解膏粱之熱用東垣安胃散解巴豆之毒又

用甘桔湯而愈

一小兒喉腫作渴大便乾實右腮赤色此肺與人腸經實熱也用柴胡飲子一服而愈後因飲食停滯服峻厲之藥喉間仍腫腹中脹痛此脾氣復傷也用異功散加升麻當歸而痊

一小兒因母忿怒患前症兼咬牙可欠余謂肝經虛熱之症子用甘桔湯加柴胡山梔牛蒡子母服加味逍遙散而愈

一小兒肌體瘦弱嗜土炭煤灰後鼻間不利恪服清熱之劑肌體愈瘦食少熱甚善驚善怒小便良久變

白鼻中出息肉二寸許耳下頸間結小核隱於筋肉之間余謂肝脾虛羸之變症不信乃內清肺火外用腐蝕喉間亦腐余先用五味異功散加升麻柴胡蕪荑爲主更用四味肥兒丸爲佐脾氣漸健夕用九味蘆薈丸爲主以五味異功散爲佐而愈

一女子六歲喉間腫痛鼻中息肉寒熱往來小便頻數良久變白此肝疳之症先用加味逍遙散加炒黑焦龍膽草熱痒漸退乃去龍膽草佐以四味肥兒丸而愈

一女子七歲鼻生息肉搽攻毒之藥成瘡腫痛外以

黃連甘草黃柏末付之以解熱毒更以加味逍遙散清肝火佐以四味肥兒丸而愈

一女子鼻中及下部常出息肉屢用毒藥蝕之各挺出一條三寸許先與龍膽草湯爲主以加味逍遙散爲佐而愈

一小兒額間赤足心熱喉中常痛服清胃敗毒之藥余謂稟腎水不足而心火熾甚也當用地黃丸壯水之主以制陽光不悟口舌赤烈小便如淋而歿

一女子十四歲患前症雜用清熱敗毒等藥前症益更患陰挺詳見下疳瘡

牛蒡子湯 治風熱上壅咽喉腫痛或生乳蛾

牛蒡子炒并 玄參 升麻

桔梗炒 犀角鎊 黃芩

木通 甘草各等分

右每服一二錢水煎服

拔萃桔梗湯 治熱腫喉痺

桔梗炒 甘草炒 連翹

梔子炒 薄荷 黃芩各等分

右爲末每服一二錢水煎服

柴胡飲 解肌熱積熱或汗後餘熱脉洪實弦數大

便堅實者

黃芩 七分

薑 四分

大黃 八分

芍藥 炒土分

柴胡

人參 各五分

當歸 一錢

右每服一錢薑水煎

東垣人參安胃散治脾胃虛熱口舌生瘡或傷熱乳

食嘔吐瀉痢

人參 錢

黃芪 炒二錢

生甘草

炙甘草 各五分

白芍藥 七分

白茯苓 四分

陳皮 三分

蒼朮 炒二分

右爲末每服二錢水煎

三因玉鑰匙治風熱喉閉及癰喉風

焰硝半一兩

鵬硝半一兩

犀腦一字

白殭蠶一錢

右研勻用半錢吹入喉中立愈

九味蘆薈丸治肝經積熱咽喉口舌生瘡或牙齦蝕

爛兩目生翳耳中出水或肝積癰瘰下疳陰腫或

莖出白津拘中結核或小便良久變白大便不調

肢體消瘦等症

胡黃連

宜黃連

蘆薈

木香

白蘼蕪

炒

青皮

白雷丸

鶴虱草

各一兩

麝香

三錢

右各另爲末米糊丸麻子大每服半錢空心米湯下仍量兒大小用

甘桔湯治風熱上攻咽喉疼痛及喉痺妨悶

苦梗

一兩

甘草

炒二兩

右每服二錢水煎

濟生犀角地黃湯治膏粱積毒脾胃有熱喉咽腫痛

或口舌生瘡

犀角

牡丹皮

各一兩

生地黃

八錢

赤芍藥十錢

右每服一二錢水煎

五味異功散

方見敗毒之藥

六味地黄丸

方見作渴不止

柴胡清肝散

方見脇癰即柴胡梔子散

補中益氣湯

方見肌肉不生

瀉黃散

方見頭面瘡

腮癰

二附耳症

腮屬足陽明胃經其生癰者多因兒食甘甜味脾胃積熱所致亦有乳母鬱怒兒受其患者若因熱積

於內二便不通者用涼膈散風邪相搏二便如常者
用漏蘆湯胃經風熱或兼咽喉腫痛用升麻防風湯
若稟賦陰虛火動頰間或兩耳內生瘡或出膿不止
者宜用地黃丸若因乳母肝火乘脾用加味逍遙散
脾經鬱熱用加味歸脾湯膏粱積熱用東垣清胃散
脾胃風熱用清咽利膈湯仍叅口瘡治之

一小兒腮腫肉色不變大便不實屬胃經虛熱用五
味異功散加升麻柴胡而愈又乳母飲酒兼怒兩腮
赤腫憎寒發熱用加味清胃散二劑加味逍遙散一
劑治其母兒亦飲數滴而愈

一小兒嗜炙煇腮腫發熱作渴飲冷用加味清胃散而消後仍不戒厚味腮腫赤痛歛連舌本先用瀉黃散而退次用加味清胃散而消

一小兒腮患瘡作渴飲湯飲食少思服敗毒散益甚余謂此胃經虛熱先用七味白朮散次用五味異功散而渴止後因母怒兩腮赤腫作渴發熱用加味逍遙散治其母兒患亦愈

一小兒十六歲腮患此二年不愈色黯下疳此胃經症也宜滋化源以生腎水外散寒邪以接陽氣不信妄用雜方元氣益虛七惡蜂起始信余言後用前藥

果驗

一小兒頰腫敷寒涼之藥色白腫硬久而不愈此胃氣虛而寒邪凝滯也用葱熨法以散寒邪異功散以助元氣遂愈若用攻毒之劑則誤矣

一小兒酷嗜甘味藥餌惟甘者乃服後患腮腫余知其胃症也經曰酸能勝甘當用酸味之藥遂以烏梅肉作丸甘草末爲衣服至二兩許始惡甘味腮腫漸消

一小兒腮腫痛外敷鐵箍散內服寒涼藥日久堅硬其色不變夫藥之寒涼者外敷則氣色凝滯內服則

脾胃有傷故氣血有虧而肉不潰色不赤也用四君子加柴胡升麻白芷當歸外散寒邪內補脾氣更用葱熨法不數日膿潰而愈

一小兒顙頰常焮腫服清熱敗毒之藥更口渴足熱面色微黑余謂腎疳症用六味地黃丸與子服母服加味逍遙散而愈後因別服伐肝之藥前症復作寒熱面青小便頻數此肝火血燥耳用柴胡梔子散以清肝六味地黃丸以滋腎遂痊

一小兒顙頰腫痛後耳內出膿久而不愈視其母兩臉青黃屬鬱怒所致朝用加味歸脾湯夕用加味逍