

增輯傷寒類方



南京中醫藥大學圖書館版權所有

增輯傷寒類方目錄

卷二

梔子湯類五

方七

承氣湯類六

方十二



梔子豉湯歌

山梔香豉治何爲。煩惱難眠胸室宜。十四枚梔四合豉。先梔後豉法煎奇。按此湯舊本有得吐止後服等字。故相傳爲涌吐之方。高明如柯韻伯亦因其說。唯張隱菴張令韶極辨其謬。曰瓜蒂散二條。本經必曰吐之。梔子湯六節。並不言一吐字。且吐下後虛煩。豈有復吐之理乎。此因瓜蒂散內用香豉二合而誤傳之也。愚每用此方。服之不吐者多。亦或有時而吐。要之吐與不吐。皆藥力勝病之效也。其不吐者。所過者

梔子湯類五

梔子豉湯

一

梔子

十四枚

香豉

四合綿裹

右二味以水四升

先煮梔子得二升半。內豉煮取升半。去

滓。分爲二服。溫進一服。得吐止後服。

此劑

分兩最小。凡治

上焦之藥皆然。



化。卽雨露之用也。一服卽吐者。戰則必勝。卽雷霆之用也。方非吐劑。而病間有因吐而愈者。所以爲方之神妙。梔子色赤。象心。味苦。屬火。性寒。導火熱之下行。豆形象腎。色黑入腎。製造爲豉。輕浮引水液之上升。陰陽和水火濟。而煩熱懊懣。結痛等證俱解矣。原本列於太陽。主解煩。非吐劑。而有時亦能涌吐也。韻伯移入陽明。只知爲吐劑。泄陽明之煩熱。卽此爲仁者見仁。知者見知也。梔子氣味苦寒。無毒。主治五內邪氣。胃中熱氣。面赤酒皸。鼓鼻白癩。赤癩。瘡瘍。

發汗吐下後

諸法俱用。未必皆誤。而正氣已傷矣。

虛煩不

得眠。

虛爲正氣虛。煩爲邪氣擾。發汗吐下。實邪雖去。而其餘邪。因正氣不

充。留於上焦。故陽氣

擾動而不得眠也。

若劇者。必反覆顛倒。心中懊懣。

反覆顛倒。身不

得甯也。心中懊

懣。梔子豉湯吐之。

此非汗下之所

能除者。吐之而痰涎結氣。無不出矣。

按汗吐下之後。而邪未盡。則不在經。而

在肺胃之間。爲有形之物。故必吐而出之。反覆顛倒。心中懊憹。摩寫病狀。何等詳切。凡醫者之於病人。必事事體貼。如若身受之。而後用藥無誤。

發汗若下之。而煩熱胸中窒者。

煩熱且窒較前

虛煩等象爲稍實。

梔子豉湯主之。

傷寒五六日。大下之後。

誤治。

身熱不去。心

中結痛者。未欲解也。

外內之邪俱未解。結痛更甚於窒矣。

梔子豉湯主之。

按胸中窒結痛。何以不用小陷胸。蓋小陷胸症。

乃心下痛。胸中在心之上。故不得用陷胸。何以不用瀉心諸法。蓋瀉心症乃心下痞。痞爲無形。痛爲有象。故不得用瀉心。古人治病。非但內外不失釐毫。卽上下亦不踰分寸也。

陽明病。脈浮而緊。咽燥口苦。胸滿而喘。

發熱汗出不惡寒。反惡熱。身重。

以上皆陽明本

症。非因誤

治而得者。若發汗則躁。心憤憤反嚴語。

汗多。

若加燒鍼。必怵惕煩躁不得眠。

以火逼汗亡。

陽驚狂之意。若下之。則胃中空虛客氣。

動膈。心中懊憹。

以前因用三法。未必合度。故病不解。各有現症。

如舌上胎者。

此句乃要訣。舌上有白胎。則胸中有物。而可用吐法。

否則邪尚未結。

梔子豉湯主之。恐無物可吐也。

陽明病下之。其外有熱。表邪未盡。手足溫。不

結胸。無實邪。心中懊憹。飢不能食。痰涎停結。但

頭汗出。陽邪在上。梔子豉湯主之。

下利後更煩。按之心下濡者。濡者溼滯之象。非窒

非痛也。爲虛煩也。宜梔子豉湯。

梔子甘草豉湯二

梔子生薑豉湯歌

梔豉原方效可誇氣羸二
兩炙甘加若加五兩生薑
入專取生薑治嘔家按梔
豉解見上汗吐下後中氣
虛不能交通上下故加甘
草以補中嘔者汗吐下後
胃陽已傷中氣不和而上

梔子湯原方加甘草二兩炙右三味以

水四升先煮梔子甘草取二升半內豉

煮取升半分二服溫進一服得吐便止

梔子生薑豉湯三

梔子湯原方加生薑五兩先煮梔子生

姜餘俱如前法得吐止後服

逆故加生姜煖胃解穢而止逆也。

凡用梔子湯。病人舊微溏者。不可與服。

之。此服梔子湯之戒。按梔子清越上焦之火。與腸胃亦無大害。微溏者即

不可服。未知何義。想因大腸之氣滑脫者。肺氣不宜更洩也。

若少氣者。梔子甘草豉湯主之。甘草能補中氣。

若嘔者。梔子生薑豉湯主之。此二條言凡遇當用。

梔子湯之病。見此二症。則加此二味也。按無物為嘔。有物為吐。欲止其嘔。反



梔子乾姜湯歌

十四山梔二兩薑以丸誤
下救偏方微煩身熱君須
記辛苦相需盡所長張令
韶曰梔子導陽熱以下行
乾姜溫中土以上達上下
交而煩熱止矣。

令其吐。吐之而嘔反
止。眞匪夷所思也。

梔子乾姜湯

四

梔子

十四枚

乾姜

二兩

右三味以水三升

半煮取一升半去滓分二服溫進一服

得吐止後服

傷寒醫以丸藥大下之

下未必誤以丸藥大下則誤矣



梔子厚朴枳實湯歌

朴須四兩枳四枚十四山
梔亦妙哉下後心煩還腹
滿止煩泄滿效兼該柯韻
伯曰心煩則難臥腹滿則
難起起臥不安是心移熱
於胃與反覆顛倒之虛煩
不同梔子治煩枳朴洩滿
此兩解心腹之妙劑也

身熱不去

外有微邪

微煩

下後而煩
即虛煩也

此湯主

之

下後故
用乾姜

梔子厚朴枳實湯

五

梔子

十四枚

厚朴

四兩
姜朮

枳實

四枚水浸
去穰炒

煮

服法同前

傷寒下後心煩

即微煩

腹滿臥起不安者



煩而加之腹滿則臥起俱不甯矣。厚朴枳實以治腹滿也。

梔子厚朴

湯主之。

梔子檨皮湯

六

梔子

十五枚

甘草

一兩

黃檨

二兩

右三味。

以水四升煮取升半去滓分溫再服。

傷寒身黃發熱者梔子檨皮湯主之。

草本

梔子檨皮湯歌

裏鬱業經向外驅。身黃發熱四言規。草須一兩二黃藥。十五枚檨不去皮。黃蘗氣味苦寒無毒。主治五藏腸胃中結熱黃疸。腸痔止洩痢。女子漏下赤白陰傷蝕瘡。



槩皮散藏府

結熱黃疸。

枳實梔子豉湯歌

枳實梔子豉湯 七

枳實

三枚

梔子

十四枚

豉

一升

右三味以

清漿水七升空煮

又一煮法。漿水即淘米之泔水。久貯味酸

為佳。取四升。內枳實梔子。煮取二升。下豉

更煮五六沸。去渣。分溫再服。覆令微似

一升香豉。枳三枚。十四山。梔復病。該漿水法煎。微取。汗。食停還。藉大黃開。張隱。菴曰。大病瘥後。則陰陽水。火始相。交會。勞其形體。則。氣血內虛。其病復作。其證。不一。故不著其病形。只以。此方統治之。方中梔子清。上焦之煩熱。香豉啓下焦。之。水。津。枳實炙香。宣中焦。之。土。氣。三焦和而。津液生。津液生而。氣血復矣。若有。



宿食則三焦未和。加大黃以行之。令燥屎行而三焦氣血自相和合矣。今之醫輩。凡遇此證。無不以補中益氣湯誤之也。

汗。此不取吐而取汗。

大病差後勞復者。

勞復乃病後之餘症。不在吐法。故取微汗。

枳實梔子湯主之。

勞復因病後氣虛邪氣又結於上焦。其症

不一。故不著其病形。惟散其上焦之邪足矣。後人以峻補之劑治勞復。則病變

百出矣。

若有宿食者。加大黃如博棋子大。

五六枚。

此指勞復之有宿食者。治食復之法。亦在其中矣。可吐篇云

宿食在上脘。當吐之。○按梔子湯加減
七方。旣不注定何經。亦不專治何誤。總
由汗吐下之後。正氣已虛。尙有痰涎滯
氣。凝結上焦。非汗下之所能除。經所云
在上者。因而越之。則不動經氣。而正不
重傷。此爲最便。乃不易之法也。古方梔
子皆生用。故入口卽吐。後人作湯。以梔
子炒黑。不復作吐。全失用梔子之意。然
服之於虛煩症。亦有驗。想其清肺除煩
之性。故在也。終當從古法生用爲妙。

大承氣湯歌

承氣湯類六

大承氣湯一

大黃 四兩 厚朴 半斤 枳實 五枚 芒硝

三合 右四味以水一斗先煮厚朴枳實取

五升去滓內大黃煮取二升去滓內硝

更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿

大黃四兩朴半觔枳五硝
三急下云朴枳先熬黃後
入去渣硝入火微熏按承
氣湯有起死回生之功唯
善讀仲景書者方知其妙
俗醫以滋潤之脂麻油當
歸火麻仁郁李仁肉蓯蓉
代之徒下其糞而不能蕩
滌其邪則正氣不復不能
大瀉其火則真陰不復往
往死於糞出之後於是咸
相戒曰潤腸之品且能殺
人而大承氣湯更無論矣
甚矣哉大承氣湯之功用
盡為那庸耳俗目所掩也

