

濟陰綱目六

卷三 虛煩

嘔吐 三六

發渴 四

吃嘔 四

自汗 七

咳嗽 四下

發熱 十

喘急 四下

往來寒熱 鼻衄 四下

瘧疾 六

羸勞 二

虛羸 五

痞悶 二六

腹脹 七

浮腫 九

積聚 五

霍亂 三六

卷十四

泄瀉

痢疾 三下

大便秘澀 八

大小便不通 十

遺尿 十下

淋閉 十一上

小便數 七上

小便不禁 七

小便出血 九

大便出血 九下

產門不開 腫痛 五

乳汁不行 三

乳汁自出 三下

吹乳癰腫 三下

乳癰 四

乳結 四

乳巖 四

乳懸 四

附保生數事

濟陰綱目

十三 十四 卷終

濟陰綱目卷之十三

關中 武之望叔卿父輯著 白嶽 趙文燧子垣氏訂正

西陵 汪 淇瞻漪子箋釋 天都 查 望于周父叅閱

產後下

虛煩

凡產後血虛氣無所附則逆而為火火上逆而瘀血迫之則心煩矣童便濁陰也其味苦鹹寒其性就下降火消瘀故宜服之所謂濁陰出下竅

與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用之必死
陳氏曰尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯溫膽湯殊不知產後
薛氏曰四物湯加茯神遠志治產後虛煩十全大補湯尤効論見
太速兼食不相宜之物所致但能依方療之無不痊可
大全云餘血奔心蓋是分解了不便與童子小便并擗心下及臥

蒲黃生用性

涼逐瘀桂心

去皮性熱行

血烏梅酸收

滌汚用此方

不可忘此法

前方以熱行

血此方以涼

行血集方者

涇渭自分用

方者得朱

紫不辯

此方行氣行

血不熱不寒

較前方是一

天霽色令人

心曠神怡

金黃散

治產後惡血衝心時發煩躁

玄胡索

蒲黃各半

桂心二錢半

右為細末烏梅煎湯調下二錢

荷葉散

療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶

荷葉

一兩七錢半

延胡索

二兩

地黃汁

二合

右用水二升煮二味取六合下延胡索分三服空心服忌肉食

一日

川芎散

療產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛

川芎

生乾地黃

白芍

枳殼

各等分

右為末酒調方寸七日二服

集驗方

產後血氣煩悶

生地黄汁

清酒

以上四方看

一方有一方

妙用細玩之

真如山陰道

上行令人不

忍捨去

讀治症語便

知用藥宜溫

所謂寒者熱

也
之留者行之
也
以煩躁二字
似不宜用熱
藥問到惡血
不快便是瘀
血衝心而如
此溫行破血
之藥必不可

右二味相和煎一沸分爲兩服

經効方

療產後氣虛冷搏於血血氣結滯上衝心腹脹滿

當歸

川芎

桂心

吳茱萸

陳皮

生薑

各一兩

白芍

二兩

右咬咀以水三升煮取一升去滓空心服

沒藥丸

治產後心胸煩躁惡血不快

沒藥

蠻薑

延胡索

當歸

乾漆

炒

桂心

牛膝

牡丹皮

乾薑

各等分

右爲細末醋煮麴糊丸如桐子大煎麴湯下十丸至十五丸

治血氣煩悶雜方

論其煩而不

用熱藥哉

連讀數方各

呈如相如化

工天巧有難

描盡

此教方又有

致粧濃抹之

致

藕汁竹瀝雖俱

治煩然清火則

同而破血消痰

則異宜別之如

陳白梅蒲黃與

笑散人皆能之

而羊血之則誠

有奪天之力造

方者集方者獨

生藕汁飲二升効竹瀝亦得

一方陳白梅搥碎煎湯飲

一方用蒲黃隔紙炒每服一錢東流水煎湯下

用失笑散亦佳

一方療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕用羊血

一盞頓服若不定更服立効

○已上治餘血奔心之劑

人參當歸湯治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內渴以致

心煩短氣自汗頭痛

人參

當歸

熟地黄

門冬

去心

肉桂

各二錢

白芍藥

炒二錢半

此方以四物去
川芎惡其散氣

也用肉桂助其

止汗也但與衆

藥等分亦須斟酌

而以梗米竹

葉加之治心煩

短氣之良法矣

血熱加生地尤

佳如肉桂所當

去也

此方以小麥補

心麥門竹葉除

煩甘草大棗益

氣安其子併培

其母亦良法也

生薑佐之更有

贊襄之力而曰

右用小二鍾梗米一合竹葉十片煎至一鍾食遠服○血熱甚

者加生地黃二錢

竹葉湯

治產後短氣欲絕心口煩悶

竹葉

切

麥門冬

去心

小麥

各

甘草

各一

生薑

二兩

大棗

十二枚

右切以水一斗煮竹葉小麥至八升去渣納餘藥煮取三升去

渣溫服○虛悸加人參二兩○少氣力加糯米五合

甘竹茹湯

治產後內虛煩熱短氣

甘竹茹

一人參

麥門冬

去心

茯苓

甘草

各一

黃芩

三兩

右咬咀以水六升煮取二升去渣分三服日三

薤白湯

治產後胸中煩熱逆氣

益善糯米用之

為少力之助又

養陰也

此治虛煩短氣

神方雖品味數

少而藥力精專

可法可法

如黃芩又可去

取者也

此治胸痺法

變也原方出自

仲景雞白半夏

所以治逆氣痞

薑棗麥門所以

治煩熱人參甘

草補虛知母石

膏之加非熱甚

不用益氣血虛

所忌也

雞白

半夏

人參

甘草

兩

招薑桂兩

麥門冬

半斤

熱甚加知母石膏

右咬咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服日三夜二

芍藥梔豉湯

治產後虛煩不得眠

白芍

當歸

梔子

香豉

半合

右用水二鍾半先煮前三味得二鍾內香豉煮取一鍾半去滓

分二服溫服

此雖雲岐法不若仲景酸棗湯穩當

○以上治血氣虛煩之劑

仲景二物黃芩湯

婦人在草褥自發露得風四肢苦煩熱頭痛

者與小柴胡湯頭不痛但惡寒者此湯主之

黃芩

兩

苦參

兩

乾薑

黃四兩

仲景治傷寒虛

煩不眠有枝子

鼓湯而此如白

芍當歸者乃雲

岐變傷寒法以

治產後也人常

謂傷寒方可通

於雜症有是哉

要在風字上看

以頭痛不痛為

法

此大苦寒之劑

與產後非宜意

者熱病成煩歟

要以煩煩字

上體貼

中虛症不可用

石膏煩亂症不

可用桂枝而此

右三味以水八升煮取二升溫服一升多吐下蟲

竹皮大丸

治婦人產後中虛煩亂嘔逆安中益氣

生竹茹

石膏

各二分

桂枝

白薇

各一分

甘草

右五味為末棗肉和丸如彈子大以飲服一丸日三夜二服○

有熱倍白薇○煩喘加栝實一分

○已上治中風煩熱之劑

經驗方

治產後煩躁此重可去怯之義

禹餘糧一枚狀如酸飴者入地埋一半四面緊築用炭一秤

發頂火一斤煨去火三分耗二為度用濕土罨一宿方取出

打去外面一層只用裏內細研水淘澄五七度將紙襯乾再

研數千遍用甘草湯調二錢七只一服立効

配衆藥六分又

以塞而爲丸仍

以一丸飲下可

想見其立方之

微用藥之難審

虛寔之不易也

仍飲服者尤慮

去虛虛之禍耳

用是方者亦當

深省

若謂去血過多

而用童便以治

虛火是以而以

四物治虛則川

芎之物能不升

散乎以胃氣虛

而渴用白朮宜

矣而以血虛用

白朮亦難信也

○發渴

熊氏曰產後心煩發渴宜清心蓮子飲

薛氏曰前證若出血過多虛火上炎用童子小便或四物白朮麥

門丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸耆湯若血虛發熱用八珍加

麥門五味若血脫發熱煩躁用當歸補血湯若胃氣虛弱用補中

益氣湯或七味白朮散

一產婦患前證朝寒暮熱肚腹作痛以手按之不痛余以爲血氣

俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更加發熱煩躁余用當歸補

血湯熱躁漸止用八珍麥門五味氣血漸復

李氏曰產後煩渴氣虛者生脉散血虛者四物湯加天花粉麥門

冬氣血俱虛作渴頭眩脚弱飲食無味者用人參二錢麥門冬一

必血虛胃氣弱
者乃可省證用

藥幸毋挑一

此方分兩有法

讀者不可輕放

過

真人以天地之

心為心故其方

亦以雲行雨施

之道渴教此方

以治渴補虛之

藥十分為君而

又以淡滲燥血

生渴之藥十之

一分為使佐此

何為也蓋以疾

苦能降天之陰

氣生夏發地之

陽氣脾者上也

通於地

錢半熟地黃七分天花粉三錢甘草五分糯米薑棗煎服

千金竹葉湯 療產後虛渴少氣力

竹葉三升 人參 茯苓 甘草各一兩 小麥五合

麥門冬五兩 半夏 生薑各三兩 大棗十五枚

右咬咀以水九升先煮竹葉小麥薑棗取七升去滓入餘藥再

煎取二升每服五合日三夜一

竹葉歸薷湯 治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉一錢 黃薷二錢 人參 白朮 當歸各一錢

麥門冬去心七分 甘草炙五分

右剉水煎服

熟地黃湯 治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

故佐姜更發脾

氣以通壅滯而

生津經曰氣和

而生津液相成

神乃自生此大

意也真入素有

一体同仁之教

豈不知半夏茯苓

苓之過而反用

之歟後之幸者

效之去之各存

乎其人焉

少用地黃多用

人參便是妙法

○糯米養陰○

自治中氣虛弱

以致津液短少

者宜之蓋為胃

氣不能致津液

熟地黃

錢半

人參

麥門冬

二錢

括藁根

錢四

甘草

炙五分

右咬咀作一服加糯米一撮生薑三片棗二枚水煎服

七味白朮散

治中氣虛弱津液短少口乾作渴或因吐瀉所致

人參

白朮

炒

白茯苓

甘草

炙

藿香

木香

乾葛

各一錢

右剉一服水煎服

清心蓮子飲

治產後心煩發渴

麥門冬

去心

黃芩

地骨皮

車前子

甘草

炙各一錢半

人參

黃耆

蜜炙

白茯苓

石蓮肉

各七分半

一方加遠志石菖蒲

各一錢

子脾七乾薑木
香薷膏皆發脾
氣而木香於小
兒更宜於產後

須量用

方名清心理宜

保肺以生水導

赤以瀉火也致

諸藥性能知其

理

用遠志石菖蒲

以治煩恐有未

當處

大渴妙藥亦有

補土生金之理

血渴者血虛而

渴也故加生地

此二方不惟產

後宜服與消渴

右另用麥門冬二十粒水二鍾煎一盞水中沉冷空心溫服○
發熱加柴胡薄荷

產寶方

療產後大渴不止

蘆根

切一升

麥門冬

生四兩

瓜蒌根

人參

茯苓

甘草

各三兩

大棗

二十枚

右以水九升煮取三升分三服頓服四劑卽瘥忌菽菜

括婁根湯

療產後血渴

括婁根

四兩

麥門冬

去心

人參

各三兩

生乾地黄

甘草

各二兩

土瓜根

五兩

大棗

二十枚

右咬咀以水八升煮取二升半分三服

黃芩散

治產後血渴飲水不止

黃芩 麥門冬 分

原東垣治脫血方也移之以治產後煩渴非有見者不能

以下三方一清心一涼血一生血如一山一水一琴一霍各得其趣

右咬咀每服三錢水一盞煎八分溫服無時

當歸補血湯 治產後血脫煩躁引飲晝夜不息脉洪大而虛重

按全無者

當歸二錢

黃耆兩炙一

右剉作一服水煎服

一方 療血渴及產後渴

用蓮子心取為細末米飲調下二錢効

一方 治產後出血太多虛煩發渴

用真正蒲黃末二錢白湯調下如渴燥甚并花水下

一方 治產後中風煩渴

用紅花子五合微炒研碎以水煎濃徐徐呷之

桃花散

治產後不煩而渴

新石灰

一兩

黃丹

五錢

右為細末渴時用井水調下一錢

○自汗

丹出於鉛內
含真水且以鎮
墜浮火故能止
渴而石灰最為
燥烈之物何以
用之而況以產
後乎曰不煩而
渴時用井水調
下一錢須臾勞
其設也

夫汗者陽之氣

陰氣不復則陽

氣實者陽加於陰故令汗出而陰氣虛弱不復者則汗出不止也

陰故虛陽上浮

凡產後血氣皆虛故多汗因之遇風則變成瘧縱不成瘧亦虛乏

於外而為汗耳

若常為汗多成

短氣身體柴癭唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

瘧而失言因而

薛氏曰按前証屬血氣俱虛急用十全大補湯如不應參附著

風麥癭之理

薛氏曰按前証屬血氣俱虛急用十全大補湯如不應參附著

氣柴瘦者此變
熱也省之省之

亡陽發瘧用十
全大補參附芪

附之類必審其

所以而用毋泛

泛執以為是也

而額汗當分部

宜以近于注臨

症尤宜詳悉蓋

腎液入心為汗

於理須究

其始也妙在為

先少其藥也宜

大劑湯煎服

代茶炒黑之

埋可法

附等湯若汗多亡陽發瘧尤當用前藥王海藏先生云頭汗出至
頸而還額上偏多蓋額為六陽之所會也由虛熱熏蒸而出竊謂
前證當以部位分之額左屬肝額右屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬心
治者審之

一產婦略聞音響其汗如雨而昏憤諸藥到口即嘔余以為脾氣
虛敗用參附末為細丸時含三五粒隨液嚥下乃漸加至錢許却
服參附湯而痊

一產婦盜汗不止遂致廢寢神思疲甚口乾引飲余謂血虛有熱
用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩連檗炒黑倍加
人參五味子二劑而愈

大全云凡產後忽胃悶汗出不識人治用鷄子及竹瀝
二法見前血暈

前論風變瘕之說
居優不然即
謂之脫陽矣
此大補法所
當施也

黃芪得防風其
功更天為易子
國表也而黃芪
二錢防風五分

大約足矣牡蠣
腎家藥也以腎
液入心為汗故
止汗又宜固腎
其他可意解矣

麻黃氣悍而輕
陽藥也凡其根
有茸陽中之陰

薛氏曰前證屬大虛宜固元氣為主其汗不止必變柔瘕東垣先
生云婦人分娩及半產漏下昏冒目瞋蓋因血暴亡而火上熾但
補其血則神自昌若常時血下當補而升舉其氣陽得血而神安
則自明矣今立一方以補手足厥陰之血兼益陽氣名曰全生活

血湯

黃耆湯

治產後虛汗不止

黃耆二錢

白朮

防風

熟地黃

牡蠣煨為粉

白茯苓

麥門冬去心

甘草炙各五分

右切作三服加大棗一枚水煎服

麻黃根散

治產後虛汗不止

當歸

黃耆炒

麻黃根

杜蠟粉