

非賣品

集成良方三百種

中

歡迎翻印



大活絡丹

治一切中風。癱瘓。痿痺。痰厥。拘攣。疼痛。癱瘓。注。跌撲損傷。小兒陽癇。婦人停經。及頑痰。風熱毒。瘀血。入於經絡。非此方不能透達。凡治肢體大症。必備之藥也。

白花蛇

貳兩 黃酒浸

烏梢蛇

貳兩 黃酒浸

威靈仙

貳兩 黃酒浸

雨頭尖

貳兩 黃酒浸

草烏

貳兩

煨天麻

貳兩

全蝎

貳兩 去毒鉤

龜板

貳兩 炙

何首烏

貳兩 黑豆水浸

烏藥

貳兩

麻黃

貳兩

貫仲

貳兩

炙甘草

貳兩

羌活

貳兩

官桂

貳兩



藿香 貳兩

黃連 貳兩

熟地 貳兩

蒸大黃 貳兩

木香 貳兩

沉香 貳兩

細辛 壹兩

赤芍 壹兩

沒藥 壹兩

丁香 壹兩

僵蠶 壹兩

乳香 壹兩

天南星 壹兩

青皮 壹兩

骨碎補 壹兩

白蔻仁 壹兩

安息香 壹兩

黑附子 壹兩

黃芩 壹兩

茯苓 壹兩

香附 壹兩

元參 壹兩

白朮 壹兩

防風 貳兩半

葛根 壹兩半

當歸 壹兩半

虎脰骨 壹兩半

血竭 柒錢

地龍 伍錢

犀角 伍錢



麝香

伍錢
另研

松脂

伍錢

牛黃

壹錢半
另研

片腦

壹錢半
另研

人參

叁兩

右藥共五十味。為末。蜜丸。如桂圓核大。金箔為衣。燈紗紙包。臘皮封固。每服壹丸。陳黃酒送下。老年人每逢節氣前一日。服一丸。可免中風。偏枯等症。

〔元〕真中風類中風辨治

〔甲〕一時卒倒。口吐痰涎。發狂號叫。或睛突不語。手足亂舞。痰色黃結成塊。大小便閉。目不識人。身中發斑。數日後變成瘡癰者。此乃真中風證也。

蓋其人元氣不虛。一時為風邪所中。正氣既盛。而邪氣又不弱。正邪相戰。兩不認負。於是痰涎生。狂叫起。心中如焚。坐立不安。內熱既盛。由內外發。故紅斑現於皮膚。火毒難消於肌肉。因變為瘡瘍矣。治法不必助正。而惟卻邪即安。方用

荆芥伍錢

防風叁錢

半夏叁錢

陳皮

壹錢

鹽

茯苓叁錢

黃芩貳錢

蘇葉壹錢

天花粉

壹錢半

右藥水煎服。三劑全瘳。

此等真中風極少。萬人中未必一見。患者用此排風飲。亦殊效。

大黃叁錢 酒蒸 丹皮伍錢 甘草壹錢 防風壹錢

天麻壹錢 玄參壹兩 柴胡叁錢 黃芩貳錢

蘇葉貳錢 荊芥貳錢 當歸叁錢 天南星壹錢

右藥水煎服。或用瓜蒂散探吐之。亦效。

瓜蒂叁個 或皂角 壹個

右煎水。灌下喉。然後探吐。連續行之。不拘次數。痰吐盡。病即瘳。以上三方。治真中風皆效。

(乙) 一時卒倒。眼閉不能言語。氣息如無。或喉間微有水鷄之聲。此證類似中風。實非中風。乃氣虛而痰邪中之也。

丙自卧跌墜床下。不知人事。乃氣虛而痰邪中之。
丁忽然尸厥。氣息皆無。狀若死尸。而脈尚動者。亦
屬氣虛而痰邪中之也。惟在白晝中者。屬陽邪。
昏夜中者。屬陰邪。

以上類中風三證。總屬氣虛。倘非尿遺手撒。皆
能起而生之。方用三生飲。

人參壹兩 天南星 叁錢 生半夏 叁錢

生附子 壹箇 水煎急灌之。

此證或用卻狂至神丹亦效。

人參壹兩 白朮 壹兩 半夏 叁錢 天南星 叁錢

附子 壹錢

水煎服

以上類中三證。純是氣虛。氣虛之人。未有不生
疾者。疾重。則卒中。卒倒。有由來也。若徒治其疾
而不補其氣。即所以殺之也。三生飲妙在用人
參壹兩。同生附。半夏。南星。等。卻邪蕩滌之藥。駕
馭而攻之。必能起死回生。方中用人參壹兩。始有力量。若少用
反為痰邪所使。安能助附子蕩邪。
(戊) 忽然卒倒。不知人。口中痰聲作響。此非中風。乃

氣虛也。若作風治。未有不死者。蓋因平日不慎
女色。精虧氣衰之所致也。方用培氣湯。

人參 壹兩

白芥子 叁錢

黃芪 壹兩

白朮 壹兩

茯神伍錢

石菖蒲貳錢

附子壹錢

半夏貳錢

右藥水煎服。此方補氣而不治風。消痰而不耗氣。反有生理。一劑神定。二劑痰清。三劑全瘳。
已。一時卒倒。狀似中風。自汗不止。懶於言語。此亦氣虛也。夫卒倒已似中風。更加自汗。此虛極之證。乃亡陽而非中於風也。亡陽之證。必須參附以回陽。始有生機。倘以為中風。而用風藥。有立亡而已矣。方用參芪歸附湯救之。

人參壹兩

黃芪貳兩

附子叁錢

當歸壹兩

右藥水煎服。一劑自汗止。再劑言語出。四劑神

氣復矣。此證似輕而實重。似緩而實急。故必乘此將亡未亡之時。大補其氣血。恰是火候。苟畏參芪之多。因循退縮。坐失時機。難期收功。此證用龜蠲神膏亦效。

人參 壹兩

黃芪 壹兩

麥冬 伍錢

北五味 壹錢

蜀漆 壹錢

肉桂 貳錢

牡蠣 叁錢

龜板膏 叁錢

右藥水煎服。

(庚)一時卒倒。痰涎壅塞。汗出如雨。手足懈弛不收。口不能言。囊縮。小便自遺。乃陰陽兩脫也。此至危之病。刻不可緩。生死在反掌之間也。若作風

症治。下口立亡。必須急用三生飲救之。

人參貳兩 生附子壹枚 生天南星伍錢

生半夏叁錢

右藥水煎服。一劑腎囊伸。小便止。再劑能言。始可別用湯劑也。世人疑三生飲過於猛烈。不知病來甚暴。非此等斬關奪門之藥。何能直入臟腑而追其散失之元陽。故必投於人參數兩之中。方可奪命於須臾也。惟是關門既開。前藥又不可再服。另用濟急丹。

人參壹兩 白朮貳兩 茯苓伍錢 當歸壹兩



熟地 壹兩

麥冬 壹兩

半夏 叁錢

山茱萸 伍錢

右藥水煎服。連服二劑。元氣日旺。虛汗不流。手

足可以運動。而無癱瘓之憂也。

此證用救脫飲。亦甚效。

人參 壹兩

白朮 貳兩

附子 壹錢

乾薑 叁錢

半夏

叁錢

貝母 壹錢

水煎服

(辛)兩手麻木而面亦麻者。人以為中風將現之證

不知此乃氣虛不能運血也。方用助陽通氣湯。

人參

叁錢

白朮 伍錢

黃芪 伍錢

廣木香 叁分

防風 伍分

當歸 叁錢

威靈 伍錢

天花粉 貳錢

附子 貳分 烏藥 貳錢 麥冬 貳錢 茯苓 叁錢

右藥水煎服。連服二劑。手麻解。再服二劑。百木亦解。更服二劑。不再發。此方大補其氣。氣旺血行。又何麻木之有。

此證用助氣解麻湯亦效。

人參 叁錢 白朮 伍錢 黃芪 伍錢 麥冬 伍錢

當歸 貳錢 荊芥 貳錢 烏藥 捌分 附子 壹分

柴胡 捌分 半夏 壹錢 水煎服

(壬) 口眼喎斜。人以為胃中之痰。不知乃心中虛極。不能運於口目之間。輕則喎斜。重則不語。方用



人參 壹錢 白朮 伍錢 茯苓 叁錢 甘草 壹錢

陳皮 壹錢 肉桂 壹錢 菖蒲 伍錢 半夏 壹錢

當歸 伍錢 白芍 伍錢 水煎服

一劑輕。二劑瘡。此方補正不卻邪。而喝斜自瘡。

(癸)尸厥證。或中風不語。或感邪祟一時卒倒。不省

人事。乃正氣虛而邪氣中之。疾迷心竅。在白晝

發者。屬陽邪。昏夜犯者。屬陰邪。治法用卻疾之

藥。加入補正之中。則病去如掃。死者重生。

白晝尸厥。不省人事。方用

人參 叁錢 白朮 伍錢 茯苓 叁錢 天南星 叁錢

半夏 叁錢 白芥子 壹錢 生附子 伍分

生薑 壹大塊 搗取汁去渣 水酒各壹盃煎八分灌之

令人扶患者坐起俾藥易下行入腹另用皂角刺細末吹入患者鼻孔先取噴嚏然後以前藥灌下立醒必吐出怪痰甚多吐後倦睡再用

人參 壹錢 白薇 壹錢 茯苓 叁錢 白芥子 叁錢

白朮 伍錢 半夏 壹錢 陳皮 伍分 甘草 伍分

右藥水二盃煎八分候患者睡醒服之全瘳

昏夜尸厥不省人事方用

人參 壹兩 白朮 伍錢 半夏 伍錢 茯苓 伍錢

菖蒲壹錢

陳皮伍分

水煎灌服之。

中陰邪與中陽邪不同。雖亦用人參補正。而不

用南星之類直入心經也。如不能言語。亦用皂

角刺末吹鼻取嚏。然後灌藥。

無論中陽邪。中陰邪。倘非
來遺手撒。一劑皆可回春。

以上二則。一治陽邪。一治陰邪。治邪之法。二方

足以包括。臨時再審病之輕重。酌量用藥。可也。

(三) 白喉證治

夫咽喉者。陰陽升降之路。咽以胃為主。喉以肺

為宗。凡本質不足者。或遇燥氣流行。或多食辛

熱。感觸而發。人但知肺之灼。而不知由於胃之

蒸人即知胃之熱。而不知由於腸之寒。腸寒則下焦凝滯。胃氣不能下行。而上灼於肺。咽喉之綫之路。終日蒸騰。故肺之本色上現於喉。而成白象。不急治。與治之不當。則腫且潰。潰且閉矣。白喉初起。惡寒發熱。或不發熱。或喉或不咳。喉內或極痛。或微痛。頭痛背脹。或遍身骨節疼痛。或便閉鼻塞。有隨發而白隨見者。或至二三日而白始見者。或由白點白塊。甚至滿喉皆白者。此證鼻通者輕。鼻塞者重。聲音清亮。氣息調勻。易治。音啞氣急難救。治法不外肺腎二經。養陰