

S294  
46-3420

十  
方  
神  
書

陳修園醫書五十種二十



南京中医药大学图书馆版权所有

書十

言主藥樂

角羊示申



南京中医药大学图书馆版权所有

葛氏自敍

夫人之生。皆稟天地之氣而成形。宜乎保養真元。固守根本。則一病不生。四體輕健。若曰不養真元。不守根本。病即生矣。根本者。氣血精液也。予得先師之教。萬病無如癆症之難。蓋因人之壯年。血氣充聚。精液完足之際。不能守養。惟務酒色。豈分饑飽。日夜耽慾。無有休息。以致耗散精液。則嘔血吐痰。骨蒸煩熱。腎虛精竭。形羸頰紅。面白口乾咽燥。小便白濁。遺精盜汗。飲食難進。氣力全無。斯因火乘金位。重則半年而斃。輕則一載而傾。況爲醫者。不究其源。不通其治。或大寒大熱之藥。妄投亂進。不能取效。殊不知大寒則愈虛。其中大熱則愈竭。其內所以世之醫者。無察其情。予師用藥治癆。如羿之射無不中的。余以用藥次第。開列於後。用藥之法。逐一條陳。如嘔血咳嗽者。先服十灰散。揭住。如不住者。須以花蕊石散止之。大抵血熱則行。血冷則凝。見黑則止。此定理也。止血之後。患人必疏解其體。用獨參湯補之。令其熟睡一覺。不要驚動。醒則病去六七矣。盛熱。盛風。盛寒。盛六事。加味治之。餘無加法。又服藥法。曰三日前服保真湯。三日後服次服保真湯。止嗽甯肺。太平丸潤肺扶瘻。消化丸下痰疏氣。保和湯分治血盛痰盛喘。保和湯二藥相間服之爲準。每日仍濃煎薄荷湯灌漱喉中。用太平丸徐徐嚥下。次噙一丸。緩緩化下。至上牀時候。如此用之。夜則肺竅開。藥必流入肺竅。此訣最爲切要。如痰壅。却先用飴糖烊消化丸。百丸吞下。又依前嚼太平丸。令其仰臥而睡。嗽必止矣。如

有餘嗽可煮潤肺膏服之復其根本完其真元全愈之後方合十珍丸服之此謂收功起身藥也前藥如神之妙如神之靈雖岐扁再世不過於此吁世之方脈用藥不過草木金石碌碌之常耳何以得此通神訣要奇異之靈也余蒙師授此書吳中治癆何止千萬人未嘗傳與一人今此書恐就泯失重次序一新名曰十藥神書留遺子孫以廣其傳時至正乙酉一陽日可久書於姑蘇養道丹房

余自髫稚學業醫道攷究方脈三十餘年遍歷江湖多學廣傳者不過言語文字形容之耳及至用藥治病皆不能捷是以日夜苦心用志務在中病後遇至人同處三月斯人極明醫道精通方術用藥如發矢無不中的余曰必神人也遂拜爲師得授奇方冊閱之或羣隊者方三四味者皆余目覩至人用效者也使予如久旱逢霖夜行得月心中豁然自此回至吳中一用一捷無不刻驗信乎奇方可鐫梓者也余以三餘暇日將至人所授奇方併日用決效之法類成一帙名曰十藥神書蓋用效者輒記錄之今西浙大癆道人與余通家之好用禮求授故錄以奉養生濟人之功用爾時至正戊子春正月三陽日可久再書於姑蘇春先堂

十藥神書註解序

此葉天士家藏祕書也前此流傳皆爲膺本余歸田後始得原書重爲訂詮附於傷寒論金匱要略之後蓋以傷寒論金匱要略爲萬古不易之準繩而此書則奇而不離於正故可取焉

閩長樂陳念祖識

吾吳天士葉先生凡治吐血症皆祖葛可久十藥神書更叅以人之惰性病之淺深隨宜應變無過不及治無不愈然亦治之於初病之時與夫病之未經深入者若至五臟遍傳雖盧扁亦莫可如何矣家藏此書有年幾獲脈望故亟付梓然書中僅列十方世皆以方少忽之不知十方中錯綜變化有幾千百方故復採周氏之說使人粗曉業是者更察虛損二字分自上而下自下而上自不知槩以六味開手矣

古吳瘦樵程永培識



南京中医药大学图书馆版权所有

十藥神書註解目錄

全卷

甲字十灰散治血咳嗽考先啜此散過往

乙字花蘆石散如服未散不復

丙字獨參湯血止身倦必解此補之

丁字保和湯取病者服之

戊字保真湯服獨參湯以此嗽虛肺

在血  
三日  
之前服

己字太平丸潤肺扶瘦

在吐血  
三日  
之前服

庚字沉香消化丸下痰疏氣

辛字潤肺膏

壬字白鳳膏

癸字補髓丹



南京中医药大学图书馆版权所有

十藥神書註解全卷

姑蘇葛可久編

閩

長樂陳念祖修園著  
東治林壽萱潤甫韻

甲子十灰散。治嘔血。吐血。咯血。嗽血。先用此藥止之。

大薑 小薑 荷葉 扁柏葉 茅根 茜根 山梔 大黃 牡丹皮 櫟榔皮

分各等

右各燒灰存性。研極細末。用紙包碗蓋於地上。一夕出火毒。用時先將白蘿蔔搣汁。或蘿蔔汁磨京墨半碗。調服五錢。食後服下。如病勢輕。用此立止。如血出成升斗者。用後藥止之。

十灰大小薑大黃梔子茅根茜草根側柏葉同荷葉等櫟榔皮並牡丹嘗。

陳修園按前散自註云。燒灰存性。今藥肆中止知燒灰則色變爲黑。而不知存性二字大有深義。蓋各藥有各藥之性。若燒之太過。則成死灰。無用之物矣。惟燒之初燃。卽速放於地上。以碗覆之。令滅其火。俾各藥一經火煉。色雖變易。而本來之真性俱存。所以用之有效。人以爲放地出火氣。猶其淺焉者也。然余治證四十餘年。習見時醫喜用此藥效者固多。而未效者亦復不少。推原其故。蓋因製不如法。亦因輕藥不能當此重任。必須深一步論治。審其脈洪面赤。傷於酗醉惱怒者。爲火載血而上行。症余製有惜紅丸。日夜三四服。但須以麻沸湯泡服。不可煮服爲囑。審其素能保養。

脈沉而細面赤淡白。血來時外有寒冷之狀者爲陽虛陰必走症。余製有惜紅散。加鮮竹茹日夜服三劑。其藥之配合散見於拙刻各種中。茲因集隘不能備登。

乙字花蘆石散。五臟崩損。湧噴血成升斗。用此止之。

花蘆石

火峻  
研爲末存性

右用童便一盅。燉溫調末三錢。甚者五錢。食後服下。男子用酒一半。女人用醋一半。與童便和藥服。使瘀血化爲黃水。服此以後藥補之。

花蘆石須火煅研。燉分酒醋和童便。功能化瘀爲黃水。輕用三錢重五錢。

舊註

程度樵云係周氏所註

然余以未得名號爲憾。治吐血者競推葛可久。而先生首以二方止血。明辨却

劑毫無顧忌。細玩始知先生意之所到。理之精也。人生於陽。根於陰。陰氣虧則陽自勝。上氣爲之喘促。咳吐痰沫。發熱面紅。無不相因而致。故留得一分自家之血。卽減得一分上升之火。易爲收拾。何今日之醫。動以引血歸經爲談。不可概用止血之味。甚至有吐出亦美。壅反爲害。遂令遷延時日。陰虛陽旺。煎熬不止。至於不救。果誰之咎。執引經而緩時日。冀復元神。吾恐有形之血。豈能使之速生。而無偶之陽。何法使之速降。此先生所以急於止血之大旨也。

陳修園按虛癆症。金匱以桂枝加龍骨牡蠣湯。從腎虛立法。建中湯。從脾虛立法。黃耆建中湯。從氣血兩虛立法。八味地黃丸。天雄散。溫其下元。從脾腎氣血之



總根處以立法。是以補虛爲一大綱也。以薯蕷丸治風氣百疾。虛羸諸不足。是以祛風爲一大綱也。以大黃麌蟲丸治乾血成癆。是以逐瘀爲一大綱也。三綱鼎足爲此症不易之準繩。今葛仙翁以花蕊石散繼於十灰散之後。雖云止血。實欲使瘀血化爲黃水。而不見血也。然自余思之。吐血旣止。而離經之血蓄而不行。不可不用此散化之。若血來勢如湧泉。相續不絕。竟用此散。令其盡化爲水。是令一身之血俱歸烏有。尙有生理乎。讀書不可死於句下。此其一也。且三大綱因虛而成癆。醫書恒有治法。而因風而致者。言之頗罕。而因瘀血而致者。除仲景金匱大黃麌蟲丸。仲景小品百勞丸外。未有發明其旨。且金匱以薯蕷丸與大黃麌蟲丸並舉。意以風氣不去。則足以賊正氣。而生長不榮。乾血不去。則足以留新血。而滲灌不周。怯症種種所由來也。余治吐血諸藥。不止者。用金匱瀉心湯。百試百效。其效在生大黃之多。以行瘀也。附錄仲景百勞丸方。當歸炒乳香沒藥各一錢。人參分數闕。蟲蟲十四個去翅足。水蛭十四個炒。桃仁十四粒去皮尖。大黃四錢。蜜丸如梧子大。都作一服。可百丸。五更用百勞水下。取惡物爲度。服白粥十日。百勞水者。杓揚百遍。卽甘瀉水也。

丙字獨參湯

止血後此藥補之

大人參

去蘆兩

右每服水一盞。棗五枚。煎一盞細呷之。服後熟睡一覺。後服諸藥除根。

功建三才得合名。陰傷血脫可回生。人參三兩五枚棗服後方知氣力宏。

舊註凡失血後不免精神怯弱。神思散亂。前方雖有止血之功。而無補益之力。故舊形之陰不能卽復。而幾微之氣不當急固乎。頓使獨參湯。不但脫血益氣。亦且陽生陰長。觀先生自註云。熟睡一覺。使神安氣和。則煩除而自靜。蓋人之精神由靜而生。亦由靜而復也。奈何今之醫者遇吐血家乃視參如毒耶。

陳修園按神農本草經云。人參氣味甘微寒無毒。主補五臟。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明日開心益智。久服輕身延年。經文只此三十七字。其提綱云。主補五臟。以五臟屬陰也。精神不安。驚悸不止。目不明。心智不足。皆陰虛爲亢陽所擾也。今五臟得甘寒之助。則安之定之。止之明之。開之益之。之效矣。曰邪氣者。非指外邪而言。乃陰虛而壯火食氣火。卽邪氣也。今五臟得甘寒之助。則邪氣除矣。細味經文。無一字言及溫補回陽。何後人信從宋元無稽之說。而反疑開天明道之聖經耶。此症用至二兩。以失血之後。臟陰太虛。陰虛則不能維陽。陽亦隨脫。故用二兩。任專力大。可以頃刻奏功。但人參雖有補虛之功。而咳嗽者忌之。乘此大血甫止之際。咳嗽未作。急飲之。若得熟睡一夜。則血從心臟而生。沛然莫之能禦。卽所失成升成斗。週時補之而有餘矣。若睡未足。而驚醒之。則血亦停而不生矣。若血止一二三日而始服之。不徒無益而有害。周氏舊註亦超。但以人參爲補氣之品。未免囿於俗見。然人參補

陰與地黃龜板之一於補陰者不同。按其字義參者參也。其功與天地人並立爲三。且能入肺。肺爲一身之橐籥。謂爲益氣却亦近道。程山齡謂貧者以歸脾湯代之。然不如取當歸補血湯二劑。入童便二茶碗。隔湯炖二炷香。取汁頓服之。

丁字保和湯。久嗽肺痿成瘻。

知母 貝母 天門冬 款冬花錢各三 天花粉 蕙苡仁 杏仁 五味子錢各一

半各錢

甘草

兜鈴

紫苑

百合

桔梗

阿膠

當歸

地黃

紫蘇

薄荷

百部

右以水二盞。生薑三片。煎一盞。入飴糖一匙調服。日三食後各進一盞。與保真湯相間服。

血盛加炒蒲黃。茜根。蘿蔔節。大薑。小薑。茅花。當歸。痰盛加南星。半夏。陳皮。茯苓。枳殼。喘盛加桑白皮。陳皮。蘿蔔子。葶苈子。蘇子。熱甚加山梔子。黃連。黃芩。黃柏。連翹。大黃。款冬花。風甚加荆芥。防風。菊花。細辛。香附子。旋覆花。寒甚加人參。桂枝。蠟片。芍藥。

知貝欵天冬各三。二錢杏慧味天花。五分二百阿歸地。紫苑兜蘇薄桔。甘。

加減歌

歸茅小大薑蒲黃。蘿蔔節茜根血盛當。痰盛南星陳半入。茯苓枳實殼須將。喘加桑白陳。

皮等蘿蔔夢蘇三子詳熱甚芩連梔柏欵連翹合併大黃吞風加香附荆防細旋覆菊花六件良寒甚加參兼牡桂芍加蠟片不須言。

陳修園按此方治久嗽不過類集順氣化痰清火解鬱之品以多爲貴絕無把柄抑又思之先生有道之士也其方又得之神人何以庸陋至此且蘇葉桔梗薄荷辛散非久嗽所宜百部欵冬苦溫非血後所宜兜鈴花粉杏仁亦爲中虛所忌知母貝母天門冬地黃阿膠百合性寒而滯力亦輕微其去市肆中之間症立方搖鈴輩之備統配合以零賣者幾希耶然此方不見於大家之書如明季龔太醫各刻及萬病回春壽世葆元等本亦載之但方名間有不同藥品偶有增減村醫用之往往見效余向以病人壽算未終總不歸功於此方亦隨見而隨忘之耳今得此書始知禮失而求諸野沾體塗足中大有人焉轉悔從前之肉眼也究竟於此方未得其旨大抵奇之弗去而耦之一方不去而複之如韓信將兵多多益善且其輕重大有法度加生薑之辛溫以潤肺飴糖之甘培土以生金卓然大家可知仙方非凡人所可窺測也但喘盛加蘿蔔子與地黃相反臨時自當去取

戊字保真湯 治虛弱骨蒸體虛

當歸 生地黃 白朮 黃耆 人參各三錢 赤茯苓 陳皮 赤芍藥 甘草 白  
茯苓 厚朴各一錢 天冬 麥冬 白芍藥 知母 黃柏 五味子 柴胡 地

骨皮 熟地黃

各一錢

每服水二盞。薑二片。棗子五枚。煎與保和湯閒服。

每日一服。

驚悸加茯神。遠志柏子仁。酸棗仁。淋濁加草薢。烏藥。猪苓。澤瀉。便澀加石葦。扁蓄。通赤苓。遺精加龍骨。牡蠣。蓮心。蓮鬚。躁熱加石膏。滑石。鼈甲。青蒿。

加浮小麥。牡蠣黃耆。麻黃根。

參耆歸地朮三錢。赤白茯苓。朴草。兼赤芍。陳皮錢半等。味柴白芍。二冬。編骨皮熟地和知柏各一錢。加薑棗煎。

加減歌

骨蒸又見悸和驚。棗遠茯神柏子仁。淋濁草烏猪澤入。遺精龍牡蓮鬚心。小便澀要加石葦。扁蓄木通共赤苓。燥熱青蒿石滑鰐。麻根盜汗蠣浮耆。

舊註一名保和者。因失血之後。氣血未調。率難把握。然調血者。以氣爲主。調氣者。實肺爲司。故大旨以瀉肺中之伏熱。益下焦之化源。此其始也。若和而失其所以爲和。則保亦失其所以爲保矣。至保真。則氣血之味俱等。大旨以甘溫爲主。甘涼佐之。而苦寒又佐之。未常禁用苦寒也。而與今日之用寒涼者異矣。曰保真者。大輔其正。兼瀉其邪。使生機活潑。油油然而不已也。兩方加法大備。然非盡用。亦姑列之。以俟去取耳。學者須知。

陳修園按此方卽十全大補湯。去川芎、肉桂、加赤芍、赤芍、生地、天冬、麥冬、五味子、柴胡、厚朴、陳皮、地骨皮、知母、黃柏是也。氣血雙補之中，加柴胡、地骨以疏肝邪。肝火卽雷火也。知母、黃柏以降腎火。腎火卽龍火也。又合麥冬、五味子爲生脈散。俾水火之氣又合。天門冬爲三才湯以位育一身。最妙是陳皮、厚朴、甘草入胃寬中行滯。導諸藥各盡其運動之力。而協和共濟。且藥品輕重得宜。大有法度。但芍藥以花之赤白別之。其根則不可辨也。藥肆中另有一草葉小根大與芍藥無異。余家山中親見採藥人握取盈囊間之。則曰藥舖所備赤芍皆此種也。始信本草崇原註云赤芍不知何草之根。今外科小兒科習用害人之說。非虛語也。方中當去之。

己字太平丸

治久嗽肺痿肺癰

天門冬

麥門冬

知母

貝母

款冬花

兩各二

杏仁

當歸

熟地

生地

黃

蓮

阿膠珠

五錢

兩各一

蒲黃

京墨

桔梗

薄荷

兩各一

白蜜

四

麝香

少許

右爲細末和勻。用銀石器先下白蜜煉熟。後下諸藥末攪勻。再上火入麝香略熬三二沸。丸如彈子大。每日三食後細嚼一丸。薄荷煎湯緩緩化下。臨臥時如痰盛。先用飴糖拌消化丸吞下。却噙嚼此丸。仰臥使藥流入肺竅。則肺清潤。其嗽退除。服七日病痊。凡咳嗽只服此藥立愈。

二兩二冬二母如歸連二地杏阿珠各需兩五錢。皆兩京墨蒲黃薄桔俱。

舊註太平丸非正方也。先生意計周密。恐人正氣漸復之後。尙留一分未盡。必有一分未妥。特於宴息之時。噙服此丸。使人於靜中。不知其所以然。而藥力無不到此。少許麝香之所以爲神妙也。

陳修園按。方中潤燥化痰養液。少佐薄荷以利氣。無甚深義。惟雜以黃連之苦寒。麝香之走竄。不幾令人駭而吐舌乎。而不知令人駭處。正是神仙妙用處。神農本草經云。黃連氣味苦寒。苦爲火之本味。以其味之苦而補之。而寒能勝火。卽以其氣之寒而瀉之。一物而兼補心瀉心之妙。故凡久嗽肺痿肺癰。得此則火不尅金。而金自受益矣。本草經又云。麝香主辟惡氣去三蟲。蓋勞嗽不已。則爲療病而生蟲。非常之藥所可治。惟麝爲諸香之冠。香者天地之正氣也。正能辟邪而殺蟲。療病之有蟲。如樹之有蠹。惟先去其蠹。而後培其根。則發榮滋長矣。况咳嗽不離於肺。肺有二竅。一在鼻。一在喉。肺竅宜開。不宜閉。喉竅宜閉。不宜開。今鼻竅不通。則喉竅將啓。而爲患必得麝香之香氣最盛。直通於鼻竅而開之。則呼吸順而咳嗽之病根除矣。舊註未闡出所以然之妙。今特補之。

庚字沉香消化丸。治熱嗽壅盛。

青礞石各一錢 明礬細研 猪牙皂角 生南星 生半夏 白茯苓 陳皮各二錢 枳殼各二錢 黃芩 薄荷葉各一錢 沉香五錢

右爲細末和勻薑汁浸神麌爲丸梧桐子大每服一百丸每夜臨臥飴糖拌吞嚼噙太平丸二藥相攻痰嗽除根矣。

南星皂半茯苓陳礞石明礬二兩均枳實殼皆需兩五薄芩一兩五錢沉。

舊註人見此數味或畏其狠卽予亦嫌其峻然先生註云熱痰壅盛乃以此治其不致壅盛者稍稍減服四五十丸可也况前先服獨參繼用保真則神氣亦漸復矣暫用幾服胡爲不可若情形消瘦者未可用也是又在學者臨症自明耳。

陳修園按此方卽滾痰丸去大黃加明礬皂角南星半夏茯苓陳皮枳殼枳實薄荷葉是也方面略同而功用則有南轍北轍之判彼以大黃領各種化痰之藥從太陽一滾而下而知不得痰之所在徒下其糞則反傷胃氣也蓋痰者水也水者氣也水性下行得火則上沸而爲痰方中所以取用沉香陳皮枳殼枳實等藥重重疊疊以順氣化氣行氣且水氾濫則患大由於地中行則天下安方中取半夏南星之辛溫茯苓之淡滲以燥治濕卽以土制水之義語云見痰休治痰是也方中惟礞石化痰爲妙是明礬皂角二味凡水渾濁入明礬攪之則濁者立刻轉清矣衣服污穢以皂角洗之則污者隨滌而淨矣古人制方之周到如此所疑者虛勞之症不能當此峻劑。