

明醫雜著

明醫雜著卷之三

薛氏醫按

鄞

王卽齋集

吳郡薛

已註

新

都

吳中增校

續醫論

喘與脹二症相因必皆小便不利喘則必生脹脹則必生喘但要識得標本先後先喘而後脹者主於肺先脹而後喘者主於脾何則肺金司降外主皮毛經曰肺朝百脉通調水道下輸膀胱又曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣是小便之行由於肺氣之降下而輸化也若肺受邪而上喘則失下降之

令故小便漸短以致水溢皮膚而生脹滿焉此則喘
爲本而脹爲標治當清金降火爲主而行水次之脾
土惡濕外主肌肉土能尅水若脾土受傷不能制水
則水濕妄行浸漬肌肉水既上溢則邪反侵肺氣不
得降而生喘矣此則脹爲本而喘爲標治當實脾行
水爲主而清金次之苟肺症而用燥脾之藥則金得
燥而喘愈加脾病而用清金之藥則脾得寒而脹愈
甚矣近世治二症但知實脾行水而不知分別脾肺
二症予故爲發明之

愚按前症若肺中伏熱不能生水而喘且渴者用

黃芩清肺飲以治肺用五淋散以清小便若脾肺
虛弱不能通調水道者宜用補中益氣湯以培元
氣用六味地黃丸以補腎水若膏粱厚味脾肺積
熱而喘者宜清胃散以治胃用滋腎丸以利小便
若心火尅肺金而不能生腎水者用人參平肺散
以治肺用滋陰丸以滋小便若腎經陰虧虛火爍
肺金而小便不生者用六味地黃丸以補腎水用
補中益氣湯以培脾土若脾氣虛弱不能相制而
喘者用補中益氣湯以培元氣用六味地黃丸以
生腎水若肝木尅脾土不能相制而喘者用六君

柴胡升麻以培元氣六味地黃丸以補腎水若脾
胃虛寒不能相制而脹者用八味丸以補脾肺生
腎水若脾肺虛寒不能通調水道而脹者宜用金
匱加減腎氣丸補脾肺生腎水若酒色過度虧損
足三陰而致喘脹痰湧二便不調或大小便道相
牽作痛者亦宜用此丸多有生者○一富商飲食
起居失宜大便乾結常服潤腸等丸後胸腹不利
飲食不甘口乾體倦發熱吐痰服二陳黃連之類
前症益甚小便滴瀝大便泄瀉腹脹少食服五苓
薤麥之類小便不通體腫喘嗽用金匱腎氣丸補

中益氣湯而愈。一儒者失於調養飲食難化胸膈不利或用行氣消導藥咳嗽喘促用行氣化痰肚腹漸脹用行氣分利睡卧不能兩足浮腫小便不利大便不實肺腎脈浮大按之微細兩寸皆短朝用補中益氣湯加薑附夕用金匱腎氣丸加骨脂肉果各數劑諸症漸愈再佐以八味丸兩月乃能步履却服補中八味半載而康

氣虛補氣用四君子湯血虛補血用四物湯虛甚者俱加熟附子蓋四君四物皆和平寬緩之劑須得附子健悍之劑行之方能成功附子熱藥本不可輕用

但當病雖在暑熱時月亦可用也予嘗治一僕人五月間病熱口渴唇乾譫語診其脉細而遲用四君子湯加黃芪當歸芍藥熟附子進一服熱愈甚狂言狂走或曰附子差矣診其脉如舊仍增附子進一大服遂汗出而熱退脉還四至矣又嘗治一婦人亦夏間病熱初用平調氣血無清熱和解之劑服二三服不應熱愈甚舌上焦黑膈間有火嗽水不嚥診其脉兩手皆虛微而右手微甚六七日內譫語撮空循衣摸床惡症俱見後用四物湯加黃芪人參白朮陳皮麥門知母熟附子服之一二時汗出而熱退次日復熱

再服仍退又次日復發知其虛極也遂連進十服皆加附子而安

愚按前論正所謂捨時從症捨症從脉真有定見者也○一男子發熱煩渴頭痛誤行發汗喘急腹痛自汗譫語用十全大補加附子治之熟睡喚而不醒及覺諸症頓退再劑而痊○黃武選飲食勞倦發熱惡寒誤用解表神思昏憤胸發赤斑脉洪數而無力余曰此內傷元氣非外邪也急用溫補之劑彼不從後果歿

飲食過傷變爲異常急暴之症人多不識嘗有一壯

年人忽得暴病如中風狀口不能言語目不識人四肢不舉急救蘇合香丸不效予偶過聞之因詢其由曰適方陪客飲食後忽得此症遂教以煎生薑淡鹽湯多飲探吐之吐出數碗而醒後服白朮陳皮半夏麥芽調理而愈大抵此等症多因飲食醉飽之後或感風寒或着氣惱而致飲食填塞胃氣不行內傷特重若誤作中風中氣症而用驅風解表行氣散氣之藥則胃氣重傷死在旦夕內經雖有暴病暴死之症但恐多有因於食者前輩不曾明言故人不識耳今後遇有此等急症湏要審問明白若方飲食醉飽或

之
累傷飲食重復受傷但覺胸膈有食滯只作傷食治

愚昔嘗治趙吏部患吐物出皆酸味其脉氣口大
於人迎者二三倍僚友速余投劑余曰此實邪在
上候其吐盡酸味不藥自愈翌早吐止而安○
婦人飲食後因怒忽患血崩四肢逆冷抽搐口禁
如發瘈然吐痰如湧灌以三陳柴胡山梔枳殼吐
出酸味神思稍醒藥止次日進薄粥少許但乳脇
脹痛寒熱欲嘔四肢倦怠余以爲悉屬肝火熾盛
致脾氣不能運化先用六君柴胡山梔釣藤鈎諸

症頓退惟四肢不遂血崩如初或又以為肝火未
息欲投清肝涼血之劑余以為肝脾氣血俱弱先
用補中益氣湯培其脾土而血氣歸經又用四物
參朮柴胡養肝筋而四肢便利

餘見異
症名要

久頭痛病畧感風寒便發寒月湏重綿厚帕包裹者
此屬鬱熱本熱而標寒世人不識率用辛溫解散之
藥暫時得效誤認為寒殊不知因其本有鬱熱毛竅
常踈故風寒易入外寒束其內熱閉逆而為痛辛熱
之藥雖能開通閉逆散其標之寒邪然以熱濟熱病
本益深惡寒愈甚矣惟當瀉火涼血為主而佐以辛

溫散表之劑以從法治之則病可愈而根可除也

愚按前症多王於痰痛甚者乃風毒上攻有血虛者有諸經氣滯者有氣虛者有四氣外傷有勞役所傷有可吐者有可下者當分虛實寒熱無變而治之若夫偏正頭風久而不愈乃內挾痰涎風火鬱遏經絡氣血壅滯甚則目昏緊小二便秘澀宜砭出其血以開鬱解表余嘗治尚寶劉毅齋但怒則兩太陽作痛先用小柴胡加茯苓山梔後用六味丸以生腎水而不再發○譚侍御每頭痛必吐清水不拘冬夏吃薑便止余作中氣虛寒用六君

當歸黃芪木香炮薑而瘥○商儀部勞則頭痛余
作陽虛不能上升以補中益氣加蔓荊子而瘥
眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散用苦寒辛
涼之藥以瀉其火在外點洗則用辛熱辛涼之藥以
散其邪故點藥莫要於冰片而冰片大辛熱以其性
辛甚故借以拔出火邪而散其熱氣古方用燒酒洗
眼或用乾薑末生薑汁點眼者皆此意也蓋赤眼是
火邪內炎上攻於目故內治用苦寒之藥是治其本
如鍋底之去薪也然火邪既客於目從內出外若外
用寒涼以阻逆之則鬱火內收不得散矣故點眼用

熱而洗眼用熱湯是火鬱則發因而散之從治法也世人不知冰片爲劫藥而誤認爲寒常用點眼遂致積熱入目而昏暗瘴翳故云眼不點不瞎者此也又不知外治忌寒涼而妄將冷水冷物冷藥挹洗致昏瞎者有之

愚按前症若體倦少食視物昏花或飲食勞倦益甚者脾胃虛也用補中益氣湯略多紫葳赤脉貫睛或臟腑秘結者用芍藥清肝丸若赤翳布白畏日羞明或痛如刺者上焦風熱也用黃連飲子若久視生花畏日遠視如霧者神氣傷也用神效黃

芪湯大凡午前甚而作痛者東垣助陽活血湯午
後甚而作痛者黃連天花粉丸午後甚而不痛者
東垣益陰腎氣丸能近視不能遠視地芝丸能遠
視不能近視定志丸故東垣先生云五臟六腑之
精氣皆稟受於脾上貫於目脾者諸陰之首也目
者血脉之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司
不能歸明於目矣心者君火也主人之神宜靜而
安相火代行其令相火者包絡也主百脉皆榮於
目既勞後運動勢乃妄行又因邪氣所并而損血
脉故諸病生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治

標不治本是不明正理也若槩用辛涼寒苦之劑
損傷真氣促成內障之症矣○給事張禹功目赤
不明服祛風散熱藥反畏明重聽脉大而虛此因
勞心過度飲食失節以補中益氣湯加茯神酸棗
山藥山茱五味頓愈又勞役復甚用十全大補湯
兼以前藥漸愈却用補中益氣湯加前藥而痊

四證或鳴甚如蟬或左或右或時閉塞世人多作
丘治不效殊不知此是痰火上升鬱於耳中而爲
翳甚則壅閉矣若遇此症但審其平昔飲酒厚味
上焦素有痰火只作清痰降火治之大抵此症多先

有痰火在上又感惱怒而得怒則氣上少陽之火客於耳也若腎虛而鳴者其鳴不甚其人多慾當見在勞怯等症

愚按前症若血虛有火用四物加山梔柴胡若中氣虛弱用補中益氣湯若血氣俱虛用八珍湯加柴胡若怒便聾而或鳴者屬肝胆經氣實用小柴胡加芩歸山梔虛用八珍湯加山梔若午前甚者陽氣實熱也小柴胡加黃連山梔陽氣虛用補中益氣湯加柴胡山梔午後甚者陰血虛也四物加白朮茯苓若腎虛火動或痰盛作渴者必用地黃