

證治理會卷三

噎膈

瘰癧

鼓脹

水腫

風水

瘰癧

欬逆

短氣

暖氣

目錄

惡心 嘔吐 乾嘔 咳 嘔 吞酸

從治理會卷三

嘔膈

脈弦緊而滑吐逆小弱而滿或尺微滿為反胃沈緩
無力或大而弱為氣虛滿小或數而無力為血虛數
而有力為血寸大沉伏或大或滑為痰飲滿為血隔
緊滿者為難治

按氣逆咽噎噎塞窒礙食物不得順利曰噎氣結胸
膈填塞隔絕食物不得下通曰隔反胃者因膈絕
不得下行故復反出於胃之噎者隔之漸隔則必止
於反胃之二者皆由陰中伏火而作蓋陽盛陰不



挽化陰之失位而陽伏於中傳化不變而反上行也
丹溪云噎痛生於血乾血陰也陰主靜內外兩靜則
藏府之火不起金水二氣有所養陰血自生腸胃津
液傳化合宜何噎之有惟血液俱耗胃脘乾槁其槁
在上而近咽之下水飲可行食物難入名之曰噎其
槁在下與胃為近食難可入良久復出名之曰隔也
曰反胃
子和云三陽結証之隔三陽者大小腸膀胱也小腸
結則血脈燥大腸結則便不通膀胱結則津
液涸三陽既結則前後祕瀉下既不通氣必反而上

行所以飲食不下縱下而復出也此陽火不下推而
上行也

張鷟峰云噎膈是神思不閒病惟內觀自養為滋味
忌色慾戒嗔怒可獲全安氣血兩虛口吐涎沫糞
以羊屎乃肺緊膈皆不治也

劉宗厚云噎膈之證皆由氣聚成積自積成痰痰積
之久血凝俱病以其為病在咽在膈故立膈噎二名
之名嚴氏代痰下氣夫氣之不下痰之不止必有為
病之因而不治其本而專用降痰之藥治其標痰氣
何由而自下也

薛立齋云反胃善食喜飲冷是有火食少喜飲湯
是有火

王太僕云食不化入是有火也食久反出是無火也
食不化入先用散結湯中飲後用利膈豁痰湯
食久反出用不君子加芩連炒萊菔炮姜白豆蔻藿
香 痰飲阻滯脈結牆土利膈豁痰湯或清咽含化
丸利膈丸 陰火冲上食不化入肺火大而數脈陰
清膈飲加枇杷葉倍芦根 飲食不思大便不實吞
酸噯腐食久不化是有脾胃虛寒補真丸 發熱頭
渴身惡風寒腹喜熱食手足俱冷胸腹脹是內真

寒而外低連附子丸或八味丸 飲食起居七情虧
損脾胃痰飲停滯乃君子湯加桔枳木香 鬱結傷
脾歸脾湯加桔枳枳壳 七情鬱結胸背引疼肺沈
而滿四磨湯加莢連梔子貝母或附子 大怒血
菴粒上積在胸膈礙氣升降津液聚為痰飲二陳湯
加白芥子魚附韭汁桃仁泥五灵脂 恚怒傷肝小
柴胡湯加茯苓或附梔子 咽噎閉塞胸膈痞悶屬
氣滯者利膈豁痰湯加白豆蔻 食物下咽屈曲自
腸而下投諸作痛多是瘀血以韭汁調桃仁泥大黃
莪朮歸化時之噎之 或過用行氣之葯胸膈痞悶

乃以子陽加芎歸 大便秘結囊多羊屎屬血虛其
四物湯加條芩枳壳桃仁生地茲過用血條之劑或
過用通利之藥致血液耗竭而愈結其四物湯加參
朮

按噎膈皆起於暮年之人其屬血乾之明甚蓋血枯
則無以制火火熾則津液脂膏因火成痰水穀道隔
因火乾稿故痰火壅塞胸膈而成噎膈也其中年之
人偶有病噎吐此則多屬憂思鬱怒所致夫鬱怒則
氣滯憂思則氣結痰因氣聚而日生氣因痰碍而愈
結故為噎膈反胃也用药之时切勿執滯痰涎上阻

微用緩苦湧出因而以下藥勢易行以條急久閉微
用蜜導通幽因而潤養則因_局自透若靜滯既久則
壅塞堅頑不用開結軟堅之藥遽爾補養吾恐痰因
補而愈多氣由補而愈塞矣切見世人治噎膈必用
瓜蒂之劑刻用牛羊之涎豈知瓜蒂能火耗血誅絡
自滯氣生痰求其病愈不亦難乎
周慎齋云膈氣有氣膈血膈痰膈治膈先散開胃氣
膈開胃小茴香烏藥枳榔血膈開胃散歸烏藥枳壳
枳榔沈香桃仁紅花痰膈開胃散及附子開胃散
可治宜理脾胃用補中益氣湯加附子矣烏藥止

用一錢大段如羊屎其此陽陷於陰而陰氣絕矣亦
用補中益氣加以提調理俱按同傷血膈吐時胸膈
痛連心背此因積血在於胸中也氣行則血行宜用
氣藥二陳加芎歸枳枳壳沈氏枳子生薑行氣導
血瘀隔膠固稠粘痰滯於胸中宜二陳湯加枳枳
壳生薑順氣降痰又云隔氣中焦鬱火惟煎在上
焦不用溫暖安解開其胸膈上焦宜清中焦宜溫食
積停痰氣實之人二陳隨所傷之物加消導之味傷
濕性寒者連加少用之氣虛人不君子湯加砂仁木香

治一老人患陽氣飲食不下大便乾結入肺浮大而
硬用烏藥四分小茴香炒一錢研末肉湯調下二
錢與食即進三服後用烏藥三分陳皮各板杏仁
各五分杏仁錢半並服食

治一中年婦患梅核氣用二陳加芎歸槐連枳實烏
藥取要旋覆花各附桔梗十劑數愈按梅核氣
由陰血虛而氣不歸本源治痰治火治虛標也宜
四物加芎柏知母山梔烏藥枳殼導火歸源以治
其本

一婦患咽嚥噎塞以梅核時以暖氣足冷以水用散

結化痰湯十數劑罔罔效思之乃陰火也三陰
五項而還陰虛火矣故咽塞噤氣足冷耳用滋陰
清膈飲數劑諸症皆愈
散結化痰湯 治氣逆咽噎有少梅核似名梅核氣
此噎膈之漸也

黃連炒 梔子炒 附子浸 貝母 鳳尾草

撫芎 半夏 橘紅 桑葉 白豆蔻些少

青黛 枳壳 生薑 嘔吐加枇杷葉

又方 治梅核氣

真蘇子炒 枳壳炒 廣陳皮 枇杷子 丁香些

水煎食遠服

利膈豁痰湯

治氣結痰壅隔噎飲食不下

半夏

橘紅

枳實

桔梗

瓜蒌

黃連

炒

梔子

炒黑附子
細茶

白芥子

枳殼

沈香

石膏

初服二三帖加麻黃各葉

散結法中飲

治食不化入

石羔

細茶
枳殼

黑附子

浸

山查

麻黃

葉

葛蒲

乾姜

炙

陳皮

共為末水二鐘煎三沸分二三次飲忌破物飯

漸陰清膈飲

治陰火上冲食不化入脉洪數者

噎膈

八

益治血虛有大咽嗝者梅核

黃

黃連水炒

生地

黃連

黃連炒

黃芩

黃芩炒

梔子

梔子炒

白芍

黃歸

甘草

入童便

以酒

瀝

薑汁

枇杷

葉散

治胃寒反胃

枇杷葉

白豆蔻

蘇子

厚朴

陳皮

枳殼

白芥子

半夏

枳殼

良薑

些少

肉桂

丁香

些少

人參

茯苓

薤白

沉香

些少

生薑

虎肚丸

三因冲和丸末四兩

在脾

加乾薑

虎肚

一个用

砂鍋炙爛搗細絞汁同馬剝光水法丸服尤妙

參芪苓附散

治脾胃虛寒反胃

人參

附子

茯苓

黃芪

粉草等分

鹽水煎服二錢

大半夏湯

治反胃嘔吐不止

半夏二合

人參

白朮

一杯

生薑

七片

水三升和蜜揚二百餅沸炙藥分二服

活血潤腸湯

黃歸

木

桃仁

玄皮

赤

皮

小

陳皮

小

炙

甘草

炙

淨

下

吳茱萸

製

黃連

木

厚

朴

炒

大

腹

皮

甘

味

湯

紅夜 莖 白朮 七分 益水 善飲 加 乾薑 莖 益服 三因

冲和丸 痰多 侵 以 柿蒂 七枚 煎湯 下 痰

九三十 侵 跡 玄 白朮 加 人參 五 黃柏 七分 益水

白叩仁 七分 益水 知母 山梔 仁 山梔 連 遠志 固

八 紅 棗 三十枚

神功散 治 血滯 胸腹 作痛 噎隔

五 靈 脂 炒 五 蓬 莪 朮 桂 心 姜 炭

芸 薹 子 各 半 酒 下 二 錢

赤 砂 寬 中 湯 治 氣 滯 胸 痞 噎 塞 或 胃 口 作 痛

砂 仁 赤 附 片 青 皮 陳 皮 白 朮 厚 朴

換柳 茯苓 甘草 半夏 白豆叩

生薑 臨服入蜜一匙 木瓜汁三匙

化滯和中湯 治脾胃虛弱飲食過傷胸膈噎塞食

不運化

白朮 枳實 厚朴 芍藥 茯苓 神曲 山楂

砂仁 黃連 厚朴 芍藥 神曲 山楂

麥芽 甘草 生薑

滯血潤腸湯 治血枯及死血在腸飲食不下大便

燥結

黃歸 芍藥 生地 紅花 桃仁 大黃 裝

重隔