

傷寒直格 卷中

劉河間六書 第十五卷

河間劉守真傷寒直格卷中

臨川葛雍編

新安吳勉學校

習醫要用直格

傷寒總評

傷寒六經傳受

（經言）寒傷形寒傷皮毛寒傷血寒傷榮然寒主閉
藏而腠理闔密陽氣怫鬱不能通暢怫然內作故
身熱燥而無汗故經曰人之傷於寒也則爲病熱
又曰夫熱病皆傷寒之類也內經既直言熱病者

言一身爲病之熱氣也以至仲景直言傷寒者言
外傷之寒邪也以分風寒暑濕之所傷主療不同
故只言傷寒而不通言熱病也其寒邪爲害至大
故一切內外所傷俱爲受汗之熱病者通謂之傷
寒也一名大病者皆以爲害之大也又春曰溫病
夏曰熱病秋曰濕病冬曰傷寒傷寒者是隨四時
天氣春溫夏熱秋濕冬寒爲名以明四時病之微
甚及主療消息稍有不等大而言之則一也非爲
外傷及內病有此異耳云冬伏寒邪於肌膚骨
肉之間至於發變爲熱病秋變爲濕

病久變病爲正傷寒者及名冒其寒而内生拂
熱熱微而不即病者以至將來陽熱變動或又感
之而成熱病非謂伏其寒氣而反變寒爲熱也經
曰冬傷於寒春必病溫亦其義也亦有一時冒寒
而便爲熱病者或感四時不正乖戾之氣或隨氣
運興衰變動或內外諸邪所傷或因他病變成或
因他人傳染皆能成之但以分門隨證治之耳經
言此六經傳受乃外傷於寒而爲熱病之大畧主
療之要法也

大法曰傷寒一日太陽受之故頭項痛腰脊強

此足太陽膀胱之經也故與經言五日足少陰腎
水爲其表裏或言爲手太陽者誤也此六經之證
也或以此直云傷寒不傳手經者亦誤也豈不詳
熱論云五臟六腑皆受病又刺熱篇皆言五臟熱
病但以熱病多于足經而其病甚少于手經而其
病微且與足經微爲兼證汗下之治但分表裏故
不單言手經而但寄於足經而已若針刺則本經
補瀉各分五臟手足之經矣

一日陽明受之故身熱目疼鼻乾不得眠也

二日少陽受之故胸脅痛而耳聾

四日太陰受之故脘滿而咽乾

五日少陰受之故目燥舌乾而渴

六日厥陰受之則煩滿囊縮

或言傳手厥陰包絡相火則水火既濟而愈傳足厥陰肝經則土敗木賊而當死者妄說也此經言足厥陰肝經之證也

大法曰前三日三陽病在表故宜汗之

汗洩熱退身涼而愈

後三日三陰病在裏故宜下之

下退裏熱則怫熱宣通汗出氣和而愈也亦有內

熱下盡無汗氣和而愈者也或者曰前三日寒在表者誤也此皆熱證也

或未愈者再經衰之七日太陽病衰自此以下皆言病自衰減頭項少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳能微聞十日太陰病衰身熱少愈腹滿如故十一日少陰病衰渴止不滿以言腹不復滿十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去言大病熱氣散去病則瘳音抽矣

此亦大畧言之耳傷寒傳受不必拘此但以明其諸證而如法治療耳

裏外傷

如得病脉便沉而裏病表和者內傷也脉浮而表病裏和者外傷也

病在身體四肢爲表病 病在胸腹之內爲裏病

表裏證

身熱爲熱在表 言皮膚壯熱而反增寒非謂自發

熱燥也

引飲

煩渴

或小便黃赤爲熱在裏身熱飲水或小便

黃赤爲表裏皆有熱身涼不渴小便清白則表裏皆

無熱

不言爲寒者蓋表裏熱微則亦有身表不熱而裏
亦不渴故也

渾身疼痛拘急表熱惡寒而脉浮者皆爲熱在表也
引飲譫妄腹滿實痛發熱而脉沉者皆爲熱在裏也
胸膈痞痛或嘔而寒熱往來脉在肌肉不浮不沉則
邪熱半在表半在裏也

夫邪熱在表而淺邪微而畏正故病熱而反增寒也
寒則腠理益闕而怫熱益加故也邪熱在裏而深邪
甚則不畏於正物盛於極故不惡寒而反自惡熱也
半在表半在裏進退無常則寒熱往來

多脉稍浮熱多爲裏多脉稍沉也諸
瘧疾反此由表之正氣與邪熱并之故裏表氣虛而
裏熱實亢則害承乃制故裏之火熱極甚而反兼寒
水之化制之故病熱極而反寒戰也臨汗而戰及諸
戰皆然寒戰爲裏熱表虛故也飲水而脉微不見也
裏之正氣與邪氣并出於表則表熱裏虛是以煩熱
汗出而脉浮也經以熱并於裏之陰分則爲陰勝而
發寒熱并於表之陽分則爲陽勝而發熱也俗未知
其爲表裏之陰陽而妄爲寒熱之陰陽故腎失內經
之本旨也夫傷寒之寒熱者惡寒爲表熱裏和故脉

浮發熱爲裏熱表氣不虛故發熱而脉沉實也氣并不并故寒熱相反而有微甚也熱并則其不并則微也

主療

傷寒表證當汗而不可下

反下之則畜熱內餘而成結胸或爲虛痞懊憹懷喘滿腹痛下利不止發黃驚狂班出諸熱變證危而死矣

裏證當下而不可汗

反汗之則熱甚發黃驚狂班出譫妄而眩悶亂危

極而死矣

半在表半在裏則宜和解

相和通解表裏也

不可發汗吐下妄治之則有前諸證

在上則涌

音湧吐也

之

言病在膈上如胸滿而嘔或眩脉關前系甚者宜

瓜蒂散吐之

在下者洩之

言蓄熱下焦則承氣抵當之類洩之皆隨病所在

攻之

傷寒無汗表病裏和則麻黃湯汗之或去水散之類亦佳

身熱惡寒無汗脉浮緊而數者

表不解半入於裏半尚在表者小柴胡湯主之或天水涼膈二藥各一服合同服之尤佳表裏之熱勢俱甚者大柴胡湯微下之更甚者大承氣湯下之

表雖未罷而裏證已甚若不下之則表熱更入於裏而裏熱危極宜以大柴胡大承氣下之雙除表裏之熱則免使但下裏熱而下後裏熱乘虛又入于裏而生結胸及痞諸病之類也

表熱多裏熱少天水一涼膈半以和解也

煎涼膈半服調天水一服上下同法

裏熱多表熱少未可下之者涼膈一天水半調之勢
更甚者小承氣湯下之表證罷但有裏證者熱傳于
裏也調胃承氣湯下之但除裏熱也凡此諸可下之
言大柴胡三承氣諸下證通宜三乙承氣下之善能
開發峻効而使之無表熱入裏而成結胸及痞之衆
病也

發汗不解下證前後別無異證者通宜涼膈散調之
以退其熱便無熱甚危極也除此之外遂勝小柴胡

湯兩感倣此而已

但隨表裏微甚而以調之兩感謂一日太陽與少陰兩證俱見二日陽明與太陰三日少陽與厥陰俱病前六經之證是也

傷風自汗表病裏和者桂枝湯解肌

無汗爲傷寒不可服桂枝湯

有汗爲傷風不可服麻黃湯

半在表半在裏脉在肌肉而半入于裏白虎湯和緩之病在裏脉當沉也大承氣湯下之一法無問風

濕有汗無汗但有可下諸證或表裏兩證俱見

見而病日深但目睛不了了者昏昧不精明或腹滿實痛者或煩渴或譫妄或狂躁喘滿者或畜熱極深而將死者通宜大承氣湯下之或三乙承氣湯下之尤良傷寒大發汗汗出不解反無汗脉尚浮者蒼朮白虎湯再解之

或中暑大汗自出脉虛弱頭痛口乾倦怠煩燥或時惡寒或畏日氣無間表裏通宜白虎湯或裏熱甚腹滿而脉沉可下者宜大承氣湯或三乙承氣湯尤妙傷寒表熱極甚身疼頭疼不可忍或眩或嘔裏有微熱不可發汗吐下擬以小柴胡天水涼膈之類和解

恐不能退其熱勢之甚者

表熱勢甚而裏已有熱發表未開則陽熱暴甚故不宜汗之表熱勢甚若吐下之則表之熱大乘虛而入反成結胸等證則危極也

或大下後或再三下後熱勢尚甚而不能退本氣損虛而再能實擬更下之恐下脫而立死不下之則熱極而寒太溫諸藥不能退其熱勢之甚者或濕熱內餘下利不止熱不退者或因大下後濕熱利不止而熱不退脉弱氣虛不可更下者或諸濕熱內餘小

便赤澀大便溏泄頻併少而急痛者必欲作利