

S252/2729
1448
二部

申集

外科正宗



外科正宗卷九

海甯許 楣辛本訂

明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光燾寅昉校

囊癰論第四十

夫囊癰者。乃陰虛溼熱流注於囊。結而爲腫。至潰後。羣丸懸挂者。猶不傷人。以其毒從外發。治當補陰清利。溼熱取效者。十有八九。近時人誤用疝家熱藥。多致熱甚爲膿。徐曰此二語確甚慮難收斂。初宜龍膽瀉肝湯。龍膽



徐勒批曰
初太寒 稍久滋陰內托散外敷如意金黃散俱可

內消又一種水疔皮色光亮無熱無紅腫痛有時內

有聚水宜用針從便處引去水氣則安
此句徐國批曰不可少此

法如腫痛日久內膿已成脹痛者可卽針之內服十

全大補湯加山茱萸牡丹皮澤瀉治之間以六味地

黃丸服之亦愈

囊癰看法

初起不紅微腫。胃子引痛不作寒熱起坐自便者輕已

成紅腫發熱。形色光亮疼痛有時飲食有味者順已潰

膿稠腫消痛止新肉漸生不痛作癢收斂者吉潰後腐爛囊皮脫落甚者睪丸突出能食不痛者順初起堅硬紫色日夜痛甚小便不利大便秘泄者重已成堅而不潰頭腐無膿疼痛無時常流血水者重潰後膿口開張腫痛不減身發寒熱睡臥不甯者重

囊癰治法

初起寒熱交作腎子腫痛疼連小腹者宜發散寒邪已成紅腫發熱口乾掀痛小水不利大便秘者利之已潰疼痛不減膿水清稀朝寒暮熱者宜滋陰內托潰後不

能收斂。日晡發熱。飲食減少者。宜養血健脾。潰後罌丸懸挂。不能收斂者。當外用生肌。內加補托。

囊癰治驗

一男子風寒未經發散。寒中腎囊。作腫痛甚。以萬靈丹洗浴發汗。寒邪頓退。又服四物湯。加澤瀉。蒼朮。山梔。天花粉。外敷如意金黃散。數次而痊。

徐曰。此輕邪不成癰。

一男子囊腫甚大。脹疼不熱。按之軟而即起。此溼水流注。聚而不散。以披針導去黃水。碗許。服導水消腎丸。



月餘而消。又以木香補腎丸服之。不發。

徐曰。此溼腫之症。

男子患此十餘日。腫甚脹痛。內膿已成。針之出膿碗許。服十全大補湯。加澤瀉丹皮十餘劑而收斂。

老年人素有疝氣。因怒傷肝。舉發疼痛。自服盤葱散熱藥。腫痛益甚。腎囊半邊堅硬。皮損紫黑。此欲腐爛見畢九候也。余語之不信。尚欲內消。請他醫治之。內服龍膽瀉肝湯。外敷四黃散。寒涼等藥。堅硬果腐。飲食少進。虛熱不睡。痛甚昏憤。又復請治。余曰。此症初



南京中医药大学图书馆版权所有

起似疝實非疝也。凡疝小腹作疼牽引腎子多寒少
熱好飲熱湯此症乃惱怒傷肝陰虛溼熱爲患其囊
紅腫發熱小便赤澀內熱口乾墜重作痛是爲囊癰
之候初宜清利溼熱。此六字徐圖而反用疝家熱藥已成

宜補陰而又用瀉肝涼劑老年氣血既虧攻補機關
又誤安得不殆。當養氣血固根本爲主而佐以安神
定痛之樂接補元氣死生在進退之間尚可轉也。內
服八珍湯加麥冬五味子遠志丹皮外以甘草湯淋
潰腐處將已壞黑肉盡行翦落其辜丸已露數日後

因得補藥之力。前症漸退。飲食漸進。外腐已盡。腎子已突出。大半搽以玉紅膏。外用膏蓋。肌長漸收。調理半年外始安。

徐曰。若治之得法。一月必愈。

一男子腫痛十餘日。堅硬無膿。囊頭紫色作爛。此欲外腐。以蟾酥錠爲末。糝上膏蓋二口。腐肉脫下。搽玉紅膏。以太乙膏掩之。內服補陰滋腎藥而愈。

一男子慾後受寒。致陰囊牽引小腹作痛。惡寒發熱。診之脈緊數而無力。服五積散一劑。寒熱乃退。痛亦稍



南京中醫藥大學圖書館藏

止更用八珍湯加肉桂丹皮澤瀉數服而愈肉桂徐勒

囊癰主治方

清肝滲涇湯清肝滲涇湯歸地 芍芍柴通澤瀉 燈心甘草效如神

治囊癰肝經涇熱結腫小水不利發熱掀痛者

川芎 當歸 白芍 生地 柴胡

龍膽草 山梔 天花粉 黃芩 澤瀉各一錢

本通 甘草各五分

水二茶鍾燈心二十根煎八分食前服

徐曰不外此方



滋陰內托散

滋陰內托散芎歸
角針澤瀉併山甲

白芍還兼熟地者
囊癰日丸服相宜

治囊癰已成腫痛發熱服之有膿即可穿潰

當歸

川芎

白芍

熟地

黃耆各

錢半

阜角針

澤瀉

穿山甲

各五分

水二茶鍾煎八分食前服

徐曰通治此症之方

導水消腎丸

導水消腎丸茅朮
更入木香共研末

木通肉桂炒牽牛
囊癰丸服不須憂

治內傷生冷外受風寒以致寒溼侵入囊中小者如

升大者若斗皮膚頑厚陽物短縮小水不利不痛多



冷。俗稱沙痞是也。宜服此藥引導水氣日久漸消不為廢疾。此方常驗。

茅山蒼朮

一斤米泔水浸切片炒黃

木通

半斤

肉桂

一兩去粗皮

牽牛

二兩微炒

木香

一兩

其為細末陳米粉打糊丸如桐子大。每服百丸空心白滾湯清米湯任下忌生冷麪食此囊雖夏月炎天亦以衣被覆之為妙。

徐曰此方不可輕服

灸偏墜法

偏墜灸法最為靈木腎盡頭為灸穴

候取天晴仰卧身灸之七壯自然平

候取天晴不犯人神日。患者平身仰臥。取木腎子根。下硬根盡處以墨點記。用安豆大艾炷。三年之內灸七壯。年久者灸九壯。十一壯為止。內服木香補腎丸。戒食生冷。兼忌房事。百日為妙。

木香補腎丸

木香補腎丸地精
丁香二香歸杞戟

棗朶蛇菰兔志苓
青鹽杜仲與人參

治偏墜。一名木腎。不疼不癢。漸漸而大。最為頑疾。有妨行動。多致不便。灸後宜用此。可內消。此藥功效。不獨治疝。中年後宜服之。益壽延年。黑髮壯筋。填髓明目。聰耳補腎。助元陽。調飲食。其功不可盡述。婦人服

之顏如童女。肌膚瑩潔如玉。又精寒血冷。久無嗣息者。服之更妙。

懷慶生地

四兩酒煮搗膏

兔絲子

肉蓯蓉

黃精

黑棗肉

打爛牛膝

蛇牀子

微炒

茯苓

遠志

各一

兩三

歸身

二兩四錢

丁香

五錢

大茴香

各一

木香

各六

錢

枸杞子

一兩五錢

巴戟

各一

杜仲

各兩

青鹽

五錢

人參

五錢

右為細末。煉蜜丸如梧。枸杞子大。每服六七十丸。空心

溫酒送下。又諸疝不常舉發者。服之亦宜。



徐曰此治腎經氣分之方穩妥無弊最可師法

桐案肉苁蓉蛇牀子遠志丁香大茴香木香巴戟

徐囑

如意金黃散

見腫瘍門

治囊癰初起紅赤腫痛發熱墜重者用葱湯同蜜調

敷夏月溼熱紅甚者溫茶湯同蜜調敷妙

義癰應用方

萬靈丹

蟾酥錠

太乙膏

王紅膏

俱見腫瘍門

十全大補湯

四物湯

俱見潰瘍門



五積散

見附骨疽門

龍膽瀉肝湯

見下疳明

懸癰論第四十一

夫懸癰者。乃三陰虧損。溼熱結聚而成。此穴在於穀道之前。陰器之後。謂之海底穴。初生狀如蓮子。少瘡痛。日久漸如桃李。赤腫掀痛。欲潰為膿。破後輕則成漏。重則瀝盡氣血。變為癆瘵不起者多矣。初起時。元氣壯實。宜用九龍丹瀉去病根。稍虛者。內消沃雪湯利去溼熱。十中亦有三四可消。如十餘日後。腫勢已成。不得內消。宜托裏消毒散加山甲。皂角制服之。自

破如腫高光亮膿熟不破頭者用針急破之穢膿一

出其患易安如膿出之後朝以六味地黃丸午以十

全大補湯加牡丹皮澤瀉溫補滋陰又有厚味膏案

之人氣體壯實者初服龍膽瀉肝湯潰服滋陰入物

湯以清蘊熱體瘦房勞氣血虛弱者初服八珍湯加

澤瀉炙甘草潰後十全大補湯加牡丹皮熟附子脾

弱者補中益氣湯以滋化源日久成漏者國老膏化

湯吞服蠟礬丸。國老膏以下徐國批曰此爲正前方皆浮泛首尾悞服

寒涼損胃傷脾。冰凝氣血以致患孔漸開穢膿不止

者定成虛羸癆瘵終爲難愈。

懸癰看法

初起如松子漸大若梅李紅赤腫痛光亮發熱者輕已潰成高腫作痛根腳不散皮薄易破膿成脹痛者輕已潰膿稠而黃氣味不臭掀腫易消痛止作癢者順初起已紫堅硬根腳漫腫痛連臀膝二便不利者重已成腫如黃瓜紫斑腐爛穢水無膿痛甚氣臭者逆已潰穢膿不絕瘡口開張肉不紅活虛熱食少者逆

懸癰治法