

字抄
喉科

咽喉大綱論

計百首

夫咽喉者左為咽右為喉咽屬胃喉屬肺乃一身之總要百
節之關防呼吸出入之所也經云一陰一陽結而為喉痺者閉
也有風有火有濕有毒有虛者或風火相薄或寒濕相聚
其症不一变幻不測故慢腫而爛者伏寒也紅腫而脈浮者
風火也脈沉實爛而不腫者毒也脈細數而浮者靈火也細
遲者靈寒也風火寒濕毒靈皆類而辨之可也
夫凡初起之症診右脈洪緊者腫風也兩關浮數者胃火腫
風也左關浮洪者心火也右寸浮洪者心火也右寸遲沉者肺伏
寒也沉數者伏熱也右尺洪大者三焦火旺也左尺洪而有力

者胃虛大也此數部脉之大畧也可總用六味湯加減治之若
亮陰等症須診其脉相其形再詳其受病之原細結其所起
之端而用葯对病自然愈之速矣故凡治咽喉之症其要在於
脉真形名焉矣

喉舌分經說

喉有二孔左為咽屬胃

納食之關

右為喉屬肺

納氣之關

口內上腭屬胃

咽

下腭屬脾

咽

舌之中心屬心

四圍屬脾

舌根亦屬心

經小舌名帝

丁屬胃

喉

之左右通舌根者肝經外兩耳垂下肝經舌白胎屬寒
黃胎者屬熱如集黃者熱甚黑者熱之極凡舌胎不論黃焦黑以
手指摸而滑有津者非真熱也不可一味涼葯用八味丸引火归原

之法也大忌逆紅者脾之火也可用清涼之劑喉癰地紅凡喉鏡不
可用銅潤比長大者近來病人多畏用手法况喉間地步窄側如
動手之時痛者或搖頭畏縮致傷他處必要或銅或金銀外打一
小筒中存利刀收放在手捺出鋒露收之則存不傷別處矣

凡針身首四肢之穴凡用細針惟十指五六可用三稜針、之以血多
為妙

凡看症若病者以舌疊起則不見喉間矣必須以物壓之則舌不疊
起矣或骨或牙或角皆可壓舌之具

凡治應病方藥凡須依此分量不可因葯味重以大黃等為峻利心
生疑忌不敢服之余存心濟世不用重劑悞人古云有病則病當

之豈有害於病者哉不可輕听人言反悞其事矣惜哉

十六絕症

舌捲囊縮

油汗如珠

啞喉噎食

吐血喉癰

聲如鋸錯

鼻塌唇青

脉細身涼

角弓反張

十指無血

喉乾無痰

六脉沉細

大便

十日不通

天柱倒折

兩目直視

壅痰氣塞

喉菌不治

又四絕症

走馬喉風

鎖喉風

纏喉風

走馬牙疳

此四症皆凶險之症若不吐不瀉針之無血藥不能入
俱為不治醫者見此症慎之 3 3

精選應用諸方

漱咽喉七十二症從方六味湯治一切咽喉不論紅白初起之時漱服可愈

荆芥穗示

薄荷示

炒羌活示

生甘草示

防風示

黃柏示

右药共為細末煎數沸去渣溫好連下漱下不可大口吃完如葉

不得法則難見效須依此為度倘緊要之時莫及白沸湯泡之方可

以及看症之特形然後加減他味後臨症可細查為要如大感加

知母 黃柏 黃芩 黃連 元參 山梔 花朴

丹皮 生地 羌活 蘼朮 連翹

視症加入為要

雄黃退煙消疾藥 九初起之症風痰上壅者吹之即退

銀銷 元示 水飛過 元明粉示 白礞砂示 雄黃分 棟上指

共為細末吹用若傷者爛旺者恐大痛不可輕用

金不換吹藥 治火症瘡疔牙疳喉間潰爛者吹之甚妙

人中白 桑燬存性 細柏末示 青黛二分 元明粉示 白礞砂示 冰片三分

西辰硝分 右共為細末吹用 若爛班有深潭者加

龍骨 象皮 赤石脂 各三斤 合研吹之

瘡疔加 川連 胡連 甘草 銀朮雪 印朮硝 人中黃

每金不換重一錢 五味各加五分 合搽之 喉癰喉疔加銀朮雪一錢

咽喉八仙散 凡咽喉潰爛者服此藥

人中白 芎藭 生大黃 生石膏 元參末 小蘇子 酒炒 芩 芩

元明粉 芩 芩 西辰硝 分 止 輕 芩 芩

共九味研末 每服一放 舌上津化嚥下 連服不斷 刻爛班自退矣

散 痰朱黃散 治凡痰上壅之症可服也

全礞石 芩 生大黃 芩 白礞砂 芩 元明粉 芩 西辰硝 分 止 鬱 全 芩

浮海石 芩 右藥共為末用 若痰多者用芩以生大黃泡湯送

下如不然 即用六味湯藥水送下 姜湯亦可

通關散吹藥 治咽喉急症

細辛末不 猪牙皂不 白凡末不

共研細末沖開水灌喉間即吐痰 姜湯亦可

十八味神藥 治一切爛喉毒症

正川連不 白癩皮不 酒黃芩不 秦膏犀不 杭赤芍不 草阿車不

生山梔不 生龜板不 廣木通不 生甘草不 川芎不 蒼耳不 連翹不

蒙乳魚不 金銀花不 天花粉不 皂角刺不 紫地丁不 川知母不 蘇木抄

以上諸藥開水煎服 結毒加土茯苓另何首烏一另 煎湯

代水服 大症爛喉加大黃不 生石膏不 為妙

靈保玉樞丹 治一切毒症重毒喉

山茨菰可洗去毛淨焙研末 五倍子可焙淨 麝香小 干金子並兩淨去油壳 可

明雄黃末 大戰可淨末 草河車可淨末

以上諸藥共為細末擇天德月德天醫黃道吉日或五月五日亦

抄齋戒焚香潔淨用濃米飲湯調和打成十餘下為度每服

五分甚者一錢 治病甚多可查外科正宗上乃見其神妙

結毒紫金丹

此方治楊梅瘡毒喉症唇鼻破壞者并下疳等症服之可痊

九毒氣隨紅絡而結恐喉間小舌皆能結聚故治咽喉者不可不知矣

龜版身炙焦浸酒漿內再炙反覆炙之陰乾三次焦黃為度即研成

細末淨 芎 龜自死者為敗大的為妙 石決明 九孔者佳童便
浸二次矣淨末 戩 正硃砂淨末 戩 服者必添土茯苓湯送以此藥
下餘竹茶服 以上三味研極細末爛末餘搗為丸如绿豆大
每服壹錢 若病在上者飯前食 病在下者飯後服 若滿身
筋骨痛用酒服 若腐爛者用土茯苓 何首烏 全愈服
其功勝于五寶散

民國丁卯十六年季春望日喉科韓先生原抄列特方便覽

夫喉疾症有七十二種除腎火腎寒之外症可以并解主之

如紫葛表葯犀角竹葉膏之類皆不宜混投慎之 余四十載

今疾疾活人不少但於大其心於小逢症小心細察望聞問切之

訣細看喉內之情形或音啞不治痰喘二不治關元三不治大便下利四不治汗出如油五不治目睛直視六不治胸膈不開七不治飲食不下八不治角弓反張九不治嗽不出聲十不治如過此症小心；；慎之；；

四絕症

喉內如綿蓋看不見紅白腫塊

喉喘連聲痰不得吐牛口乾

如遇此症者

大便下洩喉內閉塞脉沉細

舌捲出血臭味連痰脉浮急滑

救一二

列方摘用

症重方輕 症輕方重 如用升解之藥法宜先服桑杏甘桔 批杏

甘桔 蜜在甘桔 前杏甘桔 有精朴在合批桑葉或桑葉或小桑枝

外加溫胆 有寒濕加三陳枳朴 有毒加牛蒡子 山慈根 有火加鮮射

于中亭子以貝母 婦女加丹參 女貞 扶肝熱加丹皮忍冬 蘆筍
肺熱加淡竹 洋菊 紫 肺鬱加加荷葉 胃熱加通 解胸膈加又苦淡餅
以大便閉加芒灰 冬灰餅 酌之加減 不至悞人 如症能輕 喉疾相
解再轉別法 切不可先投表涼之劑 害人不少

爰採應用諸方

爰採應用諸方

胃虛門

知柏地黄湯

即六味地黄湯加知母黃柏各末

火症

三黃湯

黃連

黃柏

黃芩

各等分炒平

黃連解毒湯

川連不黑枝不黃柏平黃芩不

三黃石膏湯

即三黃湯加石膏桑小枝平

胃火門

犀角地黄湯

六味地黄加犀角石羔

涼膈散

連翹

示

大黃

示

芒硝

示

甘草

示

薄荷不竹葉不

葉

血虛門

四物湯

川芎

芍藥

熟地

各

等

分

煎

服

腎虛門

六味地黄湯加附子肉桂各三分冷服

三部四至如平脉

反此則病

肺脉浮濇而短

脾脉緩而散大

命脉緩而悠洋洋

右手圖



寸屬肺大腸之脉係焉

關屬脾胃之脉在焉

尺屬命門三焦之脉在焉

遲為寒數為熱細

緩則虛寒細數則

虛熱

女尺宜大

四至為平反此

則病


心脉悠洋緩散

肝脉沉而洪長心

腎脉虛而且細肝

腎

左手圖



病脉全前

遲為寒數為熱細緩則虛寒細數則虛熱

寸屬心其小腸

關屬肝其胆徑

尺屬腎其膀胱

針灸圖

左右穴分

耳垂下八分頰車



大指
少商

二指
商陽

三指
中冲

四指
關冲

五指
少冲

