

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之五

御醫忠勤貞亮 聖功臣崇祿大夫陽平君 臣許浚 奉 教撰

霍亂

霍亂之因

內經曰土鬱之發民病嘔吐霍亂注下又曰大陰所至為中滿霍亂吐下又曰歲土不及風乃災

有所感陽不升陰不降非禍而成非因鬼邪皆飲食所致此先哲確論也(丹心)○霍亂者揮霍變亂

也凡人內素有鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂然病本因飲食失節生冷過度以致溼熱內甚中焦失

運不能升降是以上吐下瀉(入門)○霍亂或因飲冷或失飢或失怒或冒寒或乘舟車傷動胃氣令

人吐瀉併作用藥遲緩須臾不救(華佗)○霍亂多漬於熱故夏秋為盛(入門)○霍亂之病由風溼

火炎三氣之合成也風者肝木也濕者脾土也噦者心火也肝主筋故風急其則轉筋也吐者嘔也心

火炎上故嘔吐也泄者脾土也脾溼下流故瀉也故玄子曰皆脾熱所生也斯言為正(子和)

霍亂形證霍亂證心腹卒痛嘔吐下利憎寒壯熱頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛則先利心腹俱痛吐利

而不吐邪在中焦則吐利並作病因飲食不節清濁相干陰陽乖隔輕者只曰吐利重者揮霍變亂乃

曰霍亂因邪入脾胃故發為吐利(入門)○霍亂一證夏秋為多寒月亦有之蓋有伏者而作(入門)

○人之臟府冷熱不調或飲食不節生冷過多或起居失宜露卧當風使風冷之氣歸於三焦傳於脾

胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干飲食變亂於腸胃之間心腹疼痛發作吐利有心痛而先

吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛

者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或四肢逆冷煩悶昏塞而欲死者隨證治之(得效)

脈法

霍亂脈浮洪可救脈微遲而不語氣少則難差(得效)○脈多伏或絕(丹心)○脈代者霍亂代而亂

者亦霍亂又關脈滑為霍亂吐瀉又滑而不勻必是霍亂吐瀉之候脈代或大而虛或結或

促或代皆不可斷以死脈亂故也(正傳)○脈浮大或代而散或隱而遲難救(正傳)

霍亂有乾有溼此病有乾霍亂溼霍亂乾霍亂死者多溼霍亂死者少蓋吐利則所傷之物得以泄出雖甚

傷之物不得出泄壅閉正氣隔絕陰陽煩擾悶躁喘脹而死矣(明理)

乾霍亂治法吐利不得謂之乾霍亂○乾霍亂者忽然心腹脹滿刺痛狀若神靈所附吐利不得頃刻之間

乾霍亂治法

乾霍亂

乾霍亂

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之五

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚 奉 教撰

霍亂

霍亂之因

內經曰土鬱之發民病嘔吐霍亂注下又曰大陰所至為中滿霍亂吐下又曰歲土不及風乃災

有所感陽不升陰不降乖隔而成非因鬼邪皆飲食所致此先哲確論也(丹心)○霍亂者揮霍變亂

也凡人內素有鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂然病本因飲食失節生冷過度以致溼熱內甚中焦失

運不能升降是以上吐下瀉(入門)○霍亂或因飲冷或失飢或大怒或冒寒或乘舟車傷動胃氣令

人吐瀉併作用藥遲緩須臾不救(華佗)○霍亂多漬於熱故夏秋為盛(入門)○霍亂之病由風溼

火炎上故嘔吐也泄者脾土也脾溼下流故瀉也故玄子曰皆脾熱所生也斯言為正(子和)

霍亂形證霍亂證心腹卒痛嘔吐下利憎寒壯熱頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛則先利心腹俱痛吐利

而不吐邪在中焦則吐利並作病因飲食不節清濁相干陰陽乖隔輕者只曰吐利重者揮霍變亂乃

曰霍亂因邪入脾胃故發為吐利(入門)○霍亂一證夏秋為多寒月亦有之蓋有伏者而作(入門)

○人之臟府冷熱不調或飲食不節生冷過多或起居失宜露卧當風使風冷之氣歸於三焦傳於脾

胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干飲食變亂於腸胃之間心腹疼痛發作吐利有心痛而先

吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛

者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或四肢逆冷煩悶昏塞而欲死者隨證治之(得效)

脈法

霍亂脈浮洪可救脈微遲而不語氣少則難差(得效)○脈多伏或絕(丹心)○脈代者霍亂代而亂

者亦霍亂又關脈滑為霍亂吐瀉又滑而不勻必是霍亂吐瀉之候脈代勿訝(醫鑒)○滑數為嘔代

者霍亂微滑者生滋數凶斷(脈訣)○脈微而溢或代而散或隱而伏或大而虛或結或

促或代皆不可斷以死脈亂故也(正傳)○脈浮大或洪可救微弱而遲難救(正傳)

乾霍亂治法

傷之物不得出泄壅閉正氣隔絕矣陽煩擾悶躁喘脹而死矣(明理)

乾霍亂治法吐利不得謂之乾霍亂○乾霍亂者忽然心腹脹滿刺痛狀若神靈所附吐利不得頃刻之間

門一加官桂赤茯苓枳殼木瓜煎服或吞下蘇合香丸尤妙(得效)○乾霍亂最難治死在須臾并降不通故也當先吐以提其氣之橫格不可用涼藥宜二陳湯(方見痰門)加解散藥川芎蒼朮藿風白芷之類兼用薑鹽湯(丹心)○絞腸痧者乃乾霍亂一名也腹痛不可忍或手足厥冷乃腸胃氣痛在腹也急用鹽湯吐之(入門)○乾霍亂者氣痞於中吐利不得所傷之物壅閉正氣悶格陰陽隔絕喘脹者必死急用吐法針委中(穴名)出血兼服治中湯(方見寒門)或藿香正氣散必效(入門)出血兼服治

薑鹽湯 治乾霍亂欲死鹽一兩生薑切半兩右同炒色變以童尿二盞同煎至一盞分二次服(直指)

淫霍亂治法 上吐下瀉謂之淫霍亂○凡霍亂吐瀉渴為熱不渴為寒(海藏)○熱多欲飲者宜五苓散寒多不飲水宜理中湯(方見寒門)○霍亂乃淫熱兼風木為害治宜散風寒和淫

降火四時通用藿香正氣散(方見寒門)○寒月虛冷用理中湯(方見寒門)○暑月煩渴宜黃連香薷散(方見暑門)俱宜合五苓散(方見寒門)以分清上下更合益元散(方見暑門)降火尤妙(入門)○霍亂吐瀉宜用木黃散二香黃連散加味薑附湯回生散加減正氣散○中暑霍亂宜香薷散桂苓白朮散(方並見暑門丹心)○吐瀉過多四肢逆冷不省人事南星末三錢棗三枚薑五片煎極熱服一服可效或半夏末薑汁點服或白礬末一大錢沸湯點服亦效(得效)

木黃散 治霍亂吐瀉肢體轉筋逆冷木瓜瓜吳茱萸食鹽各五錢右同炒令焦餅盛百沸水三升入藥同煎至二升冷緩任意服即效○如無前藥枯白礬末一錢沸湯調服如無白礬只用鹽一捻醋一盞

同煎服或鹽梅鹹酸等物皆可煮服(入門)

二香黃連散 治伏暑霍亂腹痛脾悶脈沉手足冷藿香厚朴半夏茯苓陳皮白扁豆香薷各一錢黃連澤瀉各八分甘草三分右剉作一貼水煎入薑汁一匙溫服(入門)

加味薑附湯 治霍亂吐瀉過多手足逆冷氣少不語六脈沉伏附子炮乾薑炮人參各一錢半甘草炙七分右剉作一貼水煎服(得效)○一名四順附子湯(直指)

回生散 治霍亂吐瀉過多但一點胃氣存者服之回生霍香陳皮各五錢右剉作一貼水煎溫服(入門)

加減正氣散 異鄉人初到他方不伏水土遂成霍亂或吐或瀉倉朮二錢藿香厚朴陳皮縮砂研香附半夏甘草各一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚燈心一團水煎服(回春)

香薷散 治中暑霍亂吐瀉腹痛轉筋四肢逆冷急煎此藥沉冷服之他藥不能救(方見暑門)

益元散 一名六一散治霍亂吐瀉取此藥生薑湯調下妙(方見暑門)(丹心)

霍亂後轉筋 陽明屬胃與大腸以養宗筋暴吐暴瀉津液脫亡宗筋失其所養此輕者兩脚轉筋而已重者

有後氣者立起急用木黃散(方見上)加茴香甘草紫蘇葉煎服再研大蒜塗兩脚掌心則雖昏危入

腹者亦效(八門)○霍亂吐瀉過多遍體轉筋手足厥冷氣欲絕者急灸臍中又取鹽一把煎湯洗

次投附子理中湯(方見寒門)即效(綱目)○霍亂後轉筋理中湯(方見寒門)加石膏一兩煎服

海藏)○一法理中湯去白朮加生附子一個(活人)○轉筋屬血熱四物湯(方見血門)加酒煮酒

花倉丸南星煎服(丹心)○吐瀉脇痛轉筋脈弦者木克土也平胃散(方見)

內傷)加木瓜五錢煎服(八門)○吐瀉後轉筋不止宜用木瓜湯(直指)

木瓜湯 治霍亂轉筋木瓜四錢吳茱萸二錢茴香炒一錢甘草炙四分右

一法 治轉筋不止欲死男子以手挽其陰牽之女子則

挽其乳近兩傍牽之此千金方妙法也(丹心)

霍亂後煩渴 吐瀉既多津液暴亡以致煩渴引飲不止宜桂苓白朮散五苓

散(方見寒門)○椒豆散參門冬湯加減需茶湯止渴湯(諸方)

桂苓白朮散 治中暑霍亂吐瀉煩渴滑石一兩寒水石石膏澤瀉甘草各五錢白朮白茯苓

麥門冬湯 治霍亂後煩渴麥門冬二錢陳皮半夏白朮白茯苓各一錢小麥半台人參甘草各

椒豆散 調下或水煎服(八門)○一名胡椒湯胡椒七粒菜豆二十一粒為末木瓜湯調下(直指)

加減需茶湯 治霍亂熱渴天花粉二錢一名胡椒湯胡椒七粒菜豆二十一粒為末木瓜湯調下(直指)

止渴湯 治同上人參麥門冬赤茯苓桂枝梗瓜萸根澤瀉湯

霍亂後虛煩 霍亂後虛煩不得眠或熱渴宜竹葉石膏湯

參胡三白湯 治霍亂後煩熱口乾脈數或頭身痛柴胡白朮白茯苓白芍藥當歸陳皮麥門冬梔子仁

既濟湯 治霍亂後虛煩不得眠麥門冬二錢人參竹葉半夏附子炮甘

霍亂吐法 治乾霍亂心腹刺痛煩冤吐利不得氣欲絕者極鹹鹽湯熱飲一升刺口令吐不吐則再飲一升

須三吐使宿食盡乃止此法大勝諸治吐訖以理中湯薑香正氣散煎緩調治(得效)○又法急

東醫寶鑑雜一五



以鹽湯一盞入童便薑汁頓服探吐令透未透再服吐後續用熨法（入門）

霍亂熨法

霍亂吐瀉心腹痛不可忍少鹽二碗紙包紗護頓其胸前并腹肚上以熨斗熨之氣透則愈續以炒鹽熨其背則十分無事（得效）○又法鹽炒吳茱萸熨臍下亦效（入門）

霍亂針法

乾霍亂刺委中（穴名）出血或十指頭（諸經并入）出血皆是良法（正傳）○絞腸痧證手足厥冷腹脹不可忍以手蘸溫水於病者膝腕上拍打有紫黑點血以針刺去惡處即愈（經驗）○乾霍亂者乃寒濕大甚脾被

而不能用麻弦卜竹弓蘸香油或熱水刮手足胸背頸項即愈（經驗）○乾霍亂者乃寒濕大甚脾被

氣血南方刮胸背手足以行氣血俱能散病然出氣血不如行氣血之為愈也（丹心）○又治絞腸痧刺血法詳見救急門（入門）

霍亂灸法

霍亂轉筋入腹手足厥冷氣欲絕以鹽填臍中大艾炷灸之不計壯數立效（得效）○霍亂已死灸天樞氣海中脘立愈（正傳）霍亂諸法不效灸大椎即效（綱目）○霍亂已死但有暖氣者灸承筋七壯立甦（綱目）

死灸天樞氣海中脘立愈（正傳）霍亂諸法不效灸大椎即效（綱目）○霍亂已死但有暖氣者灸承筋七壯立甦（綱目）

禁忌法

霍亂吐瀉之時切勿與穀食雖未湯一呷下咽立死必待吐瀉止過半日飢甚方可與稀粥以漸而助邪氣必使傷物盡然後稀粥漸養之（入門）○霍亂時大忌飲食（綱目）○霍亂不可遽與米飲粥飯以

入腹則死只吃水水不妨不可飲熱湯切不可飲熱酒燒酒（山居）

不治證

霍亂轉筋腹痛四肢厥冷氣欲絕其脈洪大可治如脈微而囊縮古卷而不治（綱目）○霍亂喘脹頻躁者不治（得效）乾霍亂吐瀉不得胸腹脹硬而唇青黑手足冷過肘膝六脈伏絕氣喘急舌短囊縮者死（回春）○脈微遲氣少不語為難治（得效）○

大渴大躁大汗遺尿者死回生散救之（方見上）（入門）

水疾吐瀉

乘船大吐瀉渴飲水者即死飲童尿最好自己尿亦好（丹心）○枯白礬末一錢百沸湯點服亦好（入門）○船車嘔吐大半夏湯（方見疾門）煎服效（入門）

單方一

種二十

鹽

治乾霍亂鹽一大匙熬黃取重尿一升溫而攪服吐下即愈（本草）

甘瀾水

治霍亂入藥煎用甚妙詳見（水部）

生薑

治霍亂欲死生薑五兩切取牛尿一升同煎取汁服即差（本草）

鍋底墨

治霍亂取二錢百沸湯一盞投其中急攪服吐瀉立止（本草）

生熟湯

一名陰陽湯治乾霍亂能吐宿食惡毒之物和鹽服之尤妙即百沸湯合新汲水也（本草）

天南星

治吐瀉不止四肢逆冷不省人事南星為末每三錢入大棗三枚同煎服四肢漸煖神識

便省神妙
本草

皂角 乾霍亂鹽湯一碗入皂角末少許調服探吐即效(本草)

烏梅 治霍亂煩渴水清和蜜飲之妙(本草)

林檎葉 治霍亂轉筋筋大如桃李掌搗不可忍取葉濃煎湯飲之(種杏)

糯米 治霍亂煩渴水研取汁任意飲之(本草)

香薷 治霍亂吐瀉轉筋濃煎飲之即止○治霍亂不可開也(本草)

牛糞 治霍亂吐瀉四股逆冷黃牛糞以水煮濾取清汁頓服一升即止(本草)

醋 治霍亂未得吐下飲一二升良○治轉筋取衣絮漬醋煮令溫裏患處冷則易即愈(千金)

嘔吐

嘔吐之因 內經曰諸嘔吐逆衝上皆屬於火○胃膈熱其則為嘔火氣炎上之象也(河間)○嘔吐者俱屬於胃胃者總司也以其氣血多少為異耳嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也有食入則吐有食已則吐以橘紅為主喘者少

胃或因飲食所傷而致宜以丁香霍香半夏茯苓陳皮生薑之類主之(東垣)○淫嘔者有物有聲客已則嘔乾嘔者空嘔無物總屬陽明氣血俱病故嘔吐者重也(入門)○劉河間謂嘔者有物有聲食此特一端耳有痰隔中焦食不得下者有氣逆者有寒氣鬱於胃口者有食滯心脾之分新食不得下而反出者有胃中有大與痰血嘔者(丹心)○嘔家雖有陽明證慎不可下逆之故也(仲景)

脈法 寸口脈數其人即吐○寸口脈細而數數則為熱細則為寒數為嘔吐(脈經)○問曰病人脈數為熱當消穀引食而反吐者何也師曰過發其汗令陽氣微膈氣虛脈乃數數為客熱不能消穀胃中虛冷故吐也(仲景)○嘔吐無他寸脈滑數微數虛虛單浮胃薄花則有痰最忌瀉弱(回春)○跌陽脈浮為嘔吐(脈訣)○嘔吐無他寸脈滑數微數虛虛單浮胃薄花則有痰最忌瀉弱(回春)○跌陽脈浮為嘔吐(脈訣)

而溢浮則為虛瀉則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐完穀不化名曰胃反(脈經)○脈緊而瀉其病難治○脈弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐(脈經)○反胃噎膈寸緊尺澁(回春)○噎

蘆花 一名蓬農治霍亂氣息危急者取一把濃煎取汁頓服即差(本草)

木瓜 治霍亂吐瀉轉筋不止煮汁飲之枝葉功同○槩攪與木瓜同功(本草)

林檎 青色者治霍亂吐瀉甚妙煮取汁飲或嚼食之(本草)

粟米 治霍亂煩渴飲數升立差○又研米清水和瀉取汁服之主轉筋入腹(本草)

蓼 治霍亂轉筋濃煎乘熱熏洗因取飲一二盞即愈得效

小蒜 治霍亂吐瀉煮汁飲之(本草)

煙鹿皮 治霍亂皮重煙最多黃色者水浸搗取汁頓服治乾霍亂即吐神效(俗方)

牛涎 小兒霍亂牛涎一合灌下立效(得效)

嘔反胃脈浮緩者生況澁者死脈澁而小血不足脈大而弱氣不足(醫鑒)

嘔吐法治

嘔吐者有冷熱二證冷者面青手足厥冷食入乃吐宜加味二陳湯丁香安胃湯加減理中湯○熱者面赤手足熱食已即吐宜保中湯和中桔梗湯黃連竹茹湯清熱二陳湯或葛根竹茹湯加味

橘皮竹茹湯○大病後胃熱虛而嘔者竹葉石膏湯方見寒門○加薑汁煎服即止(入門)○時疫吐清水或冷涎自下涌上者脾熱所致也二陳湯加白朮白芍藥升麻神麴麥芽乾生薑土炒各連梗手

或水煎服或蒸餅為丸服(入門)○肝火出胃逆上嘔吐宜抑青丸(方見火門)○半真橘皮生薑在嘔家主藥若胃虛而嘔者宜推揚鬱氣四味藿香湯加減四君子湯主之(綱目)○久病胃虛嘔吐

藿香安胃散藿香平胃散比和飲○痰飲嘔吐宜茯苓半夏湯小半夏湯大半夏湯(方見痰門)○神朮丸治嘔吐清水如神(方見痰門)○停水而嘔者心下怔忡先渴後嘔者宜赤茯苓湯(方見痰門)○

先嘔後渴者宜猪苓散水入即吐者宜五苓散(方見寒門)○(入門)○嘔家聖藥是生薑干金之說信矣然氣逆作嘔生薑散之痰水作嘔半夏逐之生薑於寒證最佳若遇熱嘔不可無烏梅也(醫鑒)

嘔吐宜服雞白粥○嘔家有癰腫不須治嘔膿盡自愈矣(仲景)

加味二陳湯

治胃冷嘔吐一錢丁香五分也(丹心)貼加縮砂一錢

丁香安胃湯

治嘔吐噎胃寒所致黃芪二錢吳茱萸草豆蔻人參蒼朮各一錢丁香柴胡升麻當歸身陳皮甘草炙各五分黃柏二分右剉作一貼水煎服(正傳)

加減理中湯

治胃寒嘔吐清水冷涎脈沉遲人參白朮赤茯苓乾薑炮陳皮藿香丁香半夏縮砂研桂皮各一錢右剉作一貼入薑三片烏梅一個水煎服(回春)

保中湯

因痰火致嘔吐不下飲食白朮土炒二錢黃芩黃連並土炒藿香梔子薑汁炒各一錢半夏陳皮赤茯苓各八分縮砂三分甘草二分右剉作一貼入薑三片以長流水和黃泥澄清水取煎之去滓稍冷頻服(醫鑒)

和中桔梗湯

治上焦熱食已暴吐脈浮而洪半夏夏薤二錢桔梗白朮各一錢半陳皮厚朴枳實赤茯苓各一錢右剉作一貼薑三片水煎取清調木香檳榔末各一錢空心服三服後吐漸止降木香

檳榔末更加白芍藥二錢黃耆一錢牛煎服(正傳)

黃連竹茹湯

治胃熱嘔吐煩渴脈數黃連薑汁炒梔子炒黑竹茹各一錢人參七分白朮赤茯苓白芍藥陳皮麥門冬甘草各五分右剉作一貼入薑二枚一水煎服(回春)

清熱二陳湯

治痰火嘔吐出涎沫半夏陳皮赤茯苓甘草人參白朮竹茹如砂仁梔子麥門冬各一錢右剉作入薑三枚一水煎服(回春)

葛根竹茹湯

治胃熱嘔吐葛根三錢半夏切薑汁漿水同煮焙乾二錢甘草一錢右剉作一貼薑三片水煎服
也(入門)

者是胃熱

加味橘皮竹茹湯

治胃熱多渴嘔吐不食橘皮竹茹赤茯苓枇杷葉麥門冬半夏各一錢人參甘草各五分右剉作一貼薑三片水煎服○無枇杷葉則以蜜炙桑白皮代之(入門)

四味藿香湯

治胃虛嘔吐藥不停藿香人參橘皮半夏各二錢右剉作一貼薑三煎服(入門)

加減四君子湯

治久病胃弱全不納食聞食氣即嘔四君子湯(方見氣門)去茯苓加人參黃耆香附子各一錢右剉作一貼入薑三片水煎服(入門)

藿香安胃散

治脾胃虛弱嘔吐飲食不待腐熟橘紅五錢人參丁香藿香各二錢半右為末每取二錢薑三片同煎溫服(寶鑒)

藿香平胃散

治同上蒼朮二錢藿香厚朴陳皮各一錢半縮砂神麴各一錢甘草炙七分右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服(東垣)

比和飲

治胃虛嘔吐月餘不納水穀聞食氣即嘔聞藥亦嘔人參白朮白茯苓神麴炒各一錢藿香陳皮縮砂甘草各五分陳倉米一合右剉作一貼先以順流水三升泡伏龍肝末澄清取一升半入藥

及薑三棗二同煎至七分去滓稍冷服日二三遂納而不吐別以陳倉米煎湯時時啜之全愈(醫鑒)

茯苓半夏湯

治痰飲停胃嘔吐不止半夏二錢赤茯苓陳皮蒼朮厚朴各一錢藿香八分縮砂乾薑甘草炙各五分右剉作一貼入薑三枚一水煎服(回春)

猪苓散

治先嘔後渴嘔吐而思水解者急與之猪苓赤茯苓白朮各等分右為末每一二錢水調服○一人每嘔水二三碗諸藥不效但吃井華水一口即止用此藥即愈(仲景)

雞白粥

治嘔最效雞白三莖雞子三個去黃栗三合同煮作稀粥別用人參一兩細到水一升煎取三合去滓右以雞雞栗粥入雞人參湯相和攪勻頓服即止(得效)

惡心乾嘔

惡心者欲吐不得吐見飲食則心便惡之二陳湯(方見痰門)如白豆蔻香附子縮砂煎服(入門)○惡心者欲吐不吐也胃口有熱有痰二陳湯加薑炒芩連(丹心)○乾嘔者有聲無物也

乾嘔或手厥冷者宜生薑橘皮湯(活人)○惡心者無聲無物但心中几几然無奈欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心實非心經之病皆在胃口上宜用生薑入曰惡心吐清水胃口有痰有熱有虛皆用生薑

生薑半夏湯(仲景)○乾嘔吐涎沫宜半夏乾薑散(仲景)○胃中素有熱惡心乾嘔不止者宜梔子竹茹湯(醫鑒)

生薑橘皮湯

治乾嘔或手足厥冷橘皮四兩生薑八兩右剉以水七盞煮至三盞遂旋微溫呷服活人○一名陳皮湯治乾嘔最妙下咽即愈(仲景)



生薑半夏湯 治胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦微心中憤憤然無奈者半夏五錢水一盞半煎至半盞入薑汁半盞和勻緩緩服之(仲景)○大凡嘔吐藥忌一時頓服宜緩緩服(八門)

半夏乾薑散 治胃乾嘔吐涎沫半夏乾薑各等分粗末每取三錢水煎緩服(仲景)

梔子竹茹湯 治胃熱惡心乾嘔不止梔子炒三錢陳皮二錢青竹茹一錢牛右到一貼水煎和薑汁服(醫鑒)

食痹吐食 食痹謂食已心下痛陰陰然不可名也不可忍也吐出血乃止此為胃氣逆而不下行也(綱目)○嘔吐而脈弦者肝旺于脾也

由風痰蠱絆於脾胃之間故惡心欲吐飲食不下當先實其脾土宜茯苓半夏湯參天湯白朮茯苓湯金花丸(東垣)

茯苓半夏湯 治風痰蠱絆於脾胃之間惡心欲吐宜實脾土麥芽炒一錢半白朮白茯苓各半夏神麴炒各一錢三分橘紅天麻各一錢神麴炒一錢麥芽

白朮茯苓湯 治同上白朮白茯苓各半夏各三錢神麴炒一錢麥芽

金花丸 治同上半夏製一兩積柳二錢雄黃水飛一錢半右為末薑汁浸蒸餅和丸梧子大薑湯下三五錢以吐止為度風痰蠱絆于脾故飲食不下用此以治風痰(易老)○一名安脾丸(八門)

水煮金花丸 治風痰蠱絆脾胃飲食不下白麵四兩半夏天南星並湯洗寒水石燒各一兩天麻五錢雄黃一錢半右為末滴水丸梧子大每取百丸先煮漿水沸下藥煮令浮為度漉出生薑湯

吞下食前(易老)○風邪在胃翻翻不定或鬱酸水全不入食宜不換金正氣散(方見寒門)或安脾丸不宜輕用參朮惟久病脇痛者本克土也宜六君子湯(方見痰門)如青皮白芍藥柴胡升麻川芎

砂仁神麴煎服(八門)

麥天湯 治風邪蠱絆脾胃有痰惡心欲吐麥門冬一錢半天麻一錢三分白朮白茯苓半夏神麴陳皮各一錢右到作一貼薑五水煎服(八門)

吐病有三 氣為上膈屬上焦食已暴吐者今世謂之嘔吐也○食飲入而還出為下膈食晬時乃反出之屬中下二焦○朝食暮吐暮食朝吐今世謂之隔氣反胃也(綱目)○吐有三因乃氣積寒也皆從

三焦論之上焦在胃口上通天氣主納而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下下通地氣主分而不納○上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脈浮而洪其證食已暴吐渴欲

飲水大便燥結氣上衝胸而發痛其治當降氣和中○中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相侵為積而痛其脈浮而弦其證或先吐而後痛或先痛而後吐治法當以小毒藥去其積木香檳榔相侵為

(宜紫沉丸消積)○下焦吐者皆從於寒地道也其脈沉而遲其證朝食暮食朝食朝吐小便清利大府秘而不通治法宜以毒藥通其閉塞溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令大府結閉而自安



丁香透膈湯

治五噎十噎痞塞不通白虎一錢三分甘草九分人參白茯苓縮砂香附子各七分沉香薑香陳皮厚朴各五分丁香木香麥芽青皮肉豆蔻白豆蔻各三分草果神麝半夏各一分右

剉作一貼薑三棗二水煎服(八門)〇十
噎者冷風氣伏熱悲憂水食喜也(綱目)

五噎寬中散

治五噎食不下厚朴香附子各一錢半甘草五分五皮陳皮丁香縮砂各四分木香三分白豆蔻二分右為籠末入薑三片鹽少許水煎服(綱目)

瓜蒌實丸

治噎膈胸膈痞痛微背喘急妨悶瓜蒌實枳殼牛夏製桔梗各一兩右為末薑汁末糊和丸梧子大每五七十丸薑湯吞下(正傳)

神奇散

治噎膈反胃血虛有大三陽枯竭當歸川芎白芍藥生地黃並酒炒陳皮縮砂半夏白茯苓白朮土炒香附子枳實烏梅肉藿香赤茯苓檳榔木通猪苓黃芩炒黃芩人參炒知母人乳炒赤芍藥

天門冬麥門冬甘草各五分
右剉作一貼水煎服(醫鑑)

當歸養血湯

治老人痰結血枯成噎噎當歸白芍藥炒熟地黃白茯苓各一錢黃連以吳茱萸同炒去茱萸八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚朴香附子川芎蘇子各七分沉香五分水磨取汁右剉

作一貼薑一棗二水煎入
沉香汁竹瀝調服(回春)

生津補血湯

治年少人噎膈乃胃脫血燥不潤故便閉塞而食不下當歸白芍藥熟地黃生地黃白茯苓各一錢枳實陳皮黃連炒蘇子貝母各七分縮砂沈香水磨取汁各五分右剉作一貼薑一

棗二水煎入沉香
汁調服(回春)

聖灰散

治噎食病及回食病(回食者食下即吐也)取初出壘石灰投入鍋中滾水中化開去渣止用青水煮乾炒黃色為度黃色難得牙色即可用確收貯封口勿令泄氣過一二年則無用矣凡人年

者四十餘壯健者用四分年老氣弱只用二分或三分好燒酒調服一二鐘能飲
者三四鐘或吐出虫或下虫其病即愈如不吐不下遇發再服自痊(回春)

八仙膏

治噎食生藕汁生薑汁生梨汁生蘿蔔汁甘蔗汁(無則砂糖代之)白果汁(即銀杏)竹瀝蜂蜜各一盞右和勻盛飯甑蒸熟任意食之(回春)

疏汞丹

治反胃吐逆水銀八錢生硫黃末二錢同入銚內慢火化開柳枝拌炒有焰起以醋酒之候結成砂子再研為末以糝尖拌丸菜豆大生薑橘皮湯下三五十九(八門)

狗米平胃丸

治反胃諸藥不效黃雄雞一口餓數日用生粟米飼之取其糞中米淘淨用韭白煎湯煮作粥臨熟入沉香二錢平胃散末和勻得所作丸梧子大每五七十九丸淨用韭白煎湯煮

杵糠丸

治五隔杵頭糠牛轉草各半斤糯米一斤為末取黃母牛口中涎和砂糖三兩為丸芡實大入鍋內慢火煮熟食白二次(八門)〇一名奪命丸(正傳)



九仙奪丹命

治反胃噎食其效如神枳殼二兩白礬枯一兩半夏厚朴並薑製各五錢木香南星薑製各二錢人參甘草各一錢豆豉研過一兩右為末夜晴露過以人參厚朴煎湯調糊作餅如小錢大慢火焙乾每一餅嚼碎以薑湯調平胃散送下忌生冷酒麵(活心)

順氣和中湯

治嘔吐反胃噎膈吞酸噎膈吐痰水心腹刺痛陳皮鹽水炒香附子醋炒梔子薑汁炒黑香一錢白朮土炒八分白茯苓七分半夏神麴黃連薑汁浸晒乾猪胆汁拌炒各六分枳實五分縮砂三分甘草炙二分右剉作一貼入薑三長流水入黃土泥攪澄清水煎入竹瀝童便薑汁溫服(醫鑒)

安中調氣丸

治反胃及痰氣白朮土炒香附子長流水浸三日炒黃各三兩陳皮二兩半夏製油炒白茯苓當歸酒洗白豆蔻炒各五錢甘草炙三錢木香一錢右為末以竹瀝薑汁打神麴為糊和丸菜豆大湯下百丸(醫鑒)

回生養胃丹

治脾土虛寒聚成痰涎以致大便燥澀小便赤而多嘔吐酸水漸成反胃結腸之證倉朮換捏作小餅烘乾南星細切薑汁浸一宿伏龍肝同炒去土半夏湯洗醋浸七日蒸熟橘紅伏龍肝同炒去土粟米薑汁浸蒸焙各四兩人參白朮白茯苓厚朴蓬朮三枝二味並醋炒華澄茄縮砂白豆蔻各為末稀糊丸梧子大米飲吞下六七十丸(醫鑒)

定生丹

治反胃定生丸雄黃朱砂乳香半夏木香肉豆蔻百草霜(為衣)各三錢沉香一錢阿魏礪砂各五分萊菔四十粒烏梅四十個湯泡去核右為末以烏梅肉和搗作丸彈子大百草霜為衣陰乾每一丸嚥化嚥下以薑湯救口復以陳麥餅火燒熟細嚼壓下嚥藥即

安胃湯

治反胃白朮白茯苓山藥炒當歸陳皮半夏薑香各一錢黃連薑汁炒蓮肉各八分人參縮砂各五分甘草三分右剉作一貼入薑土炒去土右為末薑汁和丸梧子大薑湯下百丸(回春)

太倉丸

治反胃噎膈白豆蔻縮砂各二兩陳倉朮一升薑土炒去土右為末薑汁和丸梧子大薑湯下百丸(回春)

奪命丹

治反胃有起死回生之功藁一個麝香一分孩兒茶二分金絲黃礬三分朱砂春二分夏四分秋六分冬八分○藁乃土糖裹即蛇蟻所轉之彈凡糞土之下皆有用彈中有白虫者如指大如蟻蟻一樣將彈小破一點蓋住火煨過大黃色存性不要燒焦放入藥內并彈共為末燒酒調空心服如覺飢用小米煮粥漸漸少進一日二三次不可多吃一日進一碗半足矣多進則病復不可治矣忌生冷厚味蔥蒜酒麪氣惱五十以後一二服即效(回春)

附子散

治反胃大附子一個坐於磚上回面著火斬逼淬入生薑汁又炙又淬之可盡汁
牛梳許搗為末粟米飲調下一錢不過三服差或加丁香一錢同為末（入門）

嘔吐噎膈反胃宜通大便

謹病人欲吐者切不可下逆之故也（仲景）○陽明之氣下流行蓋思所以區盡

而利導之（直指）○陰虛邪氣逆上窒塞嘔噦不足之病也此地道不通當用生地黃當歸地行花
兼用甘草微加大黃芒硝以通其閉大便利則嘔吐自止矣（東垣）嘔吐證忌用利藥此言其常只

嘔吐則嘔吐何由而止乎古人用三一承氣湯正是此意（丹心）○通利大便以開下焦之壅塞宜用
發泄則嘔吐何由而止乎古人用三一承氣湯正是此意（丹心）○通利大便以開下焦之壅塞宜用

紫沈丸厚朴丸附子丸人參利膈丸三一承氣湯四子調中湯香白丸大黃湯潤腸膏（諸方）○嘔吐
家多大便秘結虛冷者用蘇感丸溫而利之（方見大便）若大便秘結用蜜導法（方見大便）或猪胆

汁和醋灌入下
部妙（直指）

柴沈丸

治中焦吐食由食積與寒氣相格故吐而疼此主之陳皮五錢半夏麴代赭石縮砂烏梅肉各三
錢丁香檳榔各二錢沈香木香杏仁白朮各一錢白豆蔻巴豆霜各五分右為末醋糊和丸黍米

煎湯下紫沈丸百九一日二服後大便通不吐則止（易老）

厚朴丸

治同上方與萬病紫苑丸同方見積
聚每服三丸或五九薑湯下（東垣）

附子丸

治下焦吐食朝食暮吐暮食朝吐大便不通附子炮五錢巴豆霜一錢硫磺二錢右研極細焙黃
蠟為丸梧子大每一二九冷水送下下利為度利後更服紫苑丸常服一丸勿令再閉（保命）

人參利膈丸

治噎膈大便燥結喘滿壅塞治隔氣之聖藥也人參當歸藿香枳殼大黃厚朴甘
草各一兩木香檳榔各七錢半右為末水丸梧子大白湯下五七十九（綱目）

三一承氣湯

治嘔吐大便秘三陽結而不通上
為噎膈反胃（方見寒門）○河間

四子調中湯

治反胃痰盛二便澀半夏二錢桃仁一錢半香附子枳實瓜萸仁蘇子炒白芥子炒各一錢
黃連薑汁炒七分青皮陳皮沈香白茯苓木通芒硝各五分右剉作一貼水煎入芒硝攪勻

（醫鑒）
空心服

香白丸

治痰涎壅盛嘔吐不止大便澀滯青州白丸子（方見風門）與
青木香丸（方見氣門）右等分作九薑湯下三十九（得效）

大黃湯

治冷涎反胃其候欲發時先流冷涎次則吐食此乃勞證治不早死在朝夕大黃一兩生薑自然
汁半盞炙大黃令燥淨入薑汁中如此滓汁盡切焙為末每二錢陳米一撮蔥白二莖水一盞煎

至七分先食蔥白次服藥不十日去根(本事)○凡嘔噎大便秘結用大黃乃急則治標之法也仍用四物湯加童便非汁竹瀝多服為妙(正傳)

潤腸膏 治噎噎反胃甚捷新採威靈仙四兩搗取汁生薑四兩取汁真麻油二兩白砂蜜四兩治噎噎反胃甚捷新採威靈仙四兩搗取汁生薑四兩取汁真麻油二兩白砂蜜四兩

難治不治證 嘔吐麻弱小便自利身微熱而厥者虛極難治(脈經)○凡吐如清菜汁者死此是乍熱也

(大腸無血故也)○不淡飲食不斷房室者不治○氣血俱虛者則口中多出血(但見津多者必死(丹心)○反胃吐白沫者可治吐黃沫者不可治(種杏)

單方 有螺泥丸

黃丹 治反胃黃丹一兩白礬二兩同入罐內火煨放冷為末蒸餅和丸梧子大溫酒下五九至七九(綱目)

黑鉛 治吐虫而嘔者黑鉛炒成灰檳榔等分為末空心米飲調下(丹心)

二錢妙

(本草)

之

(本草)

煎頓服日

再(本草)

一升即差

(本草)

嘔家用半夏以去其水水去則嘔自止(金匱)

橘皮 治反胃嘔吐橘皮用日照西方壁土末同炒香取皮為末每一錢淡薑湯煎服(直指)

滑石 治反胃積飲滑石末生薑白煎汁澄清白脚和丸時時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

赤石脂 治痰飲吐水成反胃石脂水飛每一錢空心以水酒任下加至二三錢無則以好赤土代

人參 治反胃垂死者人參末三錢薑汁五合粟米一合煮粥空心食之(人參)○人參到二兩水

生薑 凡嘔吐皆因氣逆故用生薑之辛以散之○反胃嘔吐半夏

半夏 凡嘔吐生薑二兩對分二貼水煎服(本草)○

蘆根 治乾嘔及五噎煩悶蘆根五兩水煎服一升不過三升即差(本草)

鯽魚 治反胃取大鯽魚去腸留膽入綠蓼滿腹以火炙焦為末每一錢米飲下日三(綱目)○諸魚

蚌蛤粉 治反胃吐食取爛粉米飲下一二錢○蠅爛

蠅 主反胃吐逆取肉淹五味炙食皮

水瓜 止嘔逆煮汁飲之佳生薑同煎服尤妙

模 模揸去惡心乾嘔煎服之(本草)

水瓜 止嘔逆煮汁飲之佳生薑同煎服尤妙

模 模揸去惡心乾嘔煎服之(本草)

水瓜 止嘔逆煮汁飲之佳生薑同煎服尤妙

模 模揸去惡心乾嘔煎服之(本草)

水瓜 止嘔逆煮汁飲之佳生薑同煎服尤妙

模 模揸去惡心乾嘔煎服之(本草)

葡萄根 止嘔噦濃煎取汁細細飲之佳(本草)

杵頭糠 主噎食不下咽喉塞取細糠蜜丸彈子大含化嚥之○又細糠一兩白粥清調服(八門)

蓴 和鱸魚作羹食之主反胃食不止嘔(本草)

噎 (本草)

牛乳 治反胃噎噦要藥並汁二盞牛乳一盞竹瀝半盞童便一盞生薑半兩取汁右和勻頓服(醫鑑)

大便潤而愈(丹心)

上待半乾作丸梧子大每三十九蒼香湯吞下立愈名曰螺泥丸其螺放於水中殺食無效(綱目)

次日去蛤留水晒乾延為末每服五分淡酒調下即效(醫鑑)

食則可下然後隨證調理○一方只燒存性未飲調服二錢

雞穀袋 治噎取袋不以多少不可失包內一物用泥固濟火煨存性每袋一箇入薑炒香附末半兩神麴糊和丸梧子大薑湯吞下(綱目)

貓胎衣 治反胃取貓生子胎衣陰乾燒為末酒調服甚效貓生子急取之稍遲則貓食之矣(種杏)

下三十九 (種杏)

却取蠍虎切爛與雞吃取其糞焙乾為末每一錢燒酒調下(回春)

針灸法 嘔吐無度并乾嘔不止尺澤大陵皆灸三壯又灸乳下一寸三十壯又灸間使三十壯若四肢厥冷脈沈絕灸間使便通此回生起死之法(得效)○善嘔嘔有苦者邪在膽通在胃取三里陽陵泉(內經)○又取勞宮中魁腕骨心中腕下腕(東垣)○反胃神效膏盲俞灸百壯豐中三里各灸七壯(綱目)○又取勞宮中魁腕骨心中腕下腕(東垣)○今日胃神效膏盲俞灸百壯豐中三里各灸七壯(綱目)

(綱目) 反胃灸肩井三壯即愈乃神灸也(回春)又取水分氣海灸之(資生)

獼猴桃 治噎噦反胃取汁和薑汁服之○藤汁至滑主胃閉吐逆煎取汁和羹汁服之甚佳(本草)

嬰子栗 治反胃食不下和竹瀝煮作粥食之佳(本草)

老牛口中涎 主反胃噎噦取少許和水服之終身不噎○口中齡(丑)之切(草經)

鹽尿 主反胃吐日永差稍有毒不可多服(本草)

田螺 治反胃大田螺多取新水養之待吐出泥去清水以灰鋪篩上用皮紙覆灰上傾此泥於紙

螃蛤 治反胃噎噦取螃蛤洗淨入水中高四指以香油小酒鍾入水中二指捻白細微水上涎即出

馬剝兒 為一名馬剝兒即王瓜也治噎噦反胃燒存性為末每一錢和棗肉平胃散二錢溫酒調服

炊乾飯 治噎噦久不納穀取隔年炊乾飯以急流順水煮爛取汁時時飲之待能食以藥調治正傳

狗膽 治反胃吐黃沫長砂一兩大黃二兩為末狗膽浸二日乾再為末麴糊和丸梧子大空心鹽湯

蝎虎 治噎噦反胃取活蝎虎一個入燒酒內浸七日火上溫之去蝎虎飲酒即愈○又雄雞臍一日

咳嗽

咳嗽

內經曰人感於寒微則為咳甚者為嗽為痛。秋傷於溼冬生咳嗽又曰秋傷於溼上逆而咳積於脾也。大抵素秋之氣宜清而肅若反動之則氣必上衝而為咳嗽。甚則動脾溼而為痰也。是知脾無留溼則雖傷肺氣亦不為痰。若有痰而寒少熱多故咳嗽。咳嗽非專主乎肺病以肺主皮毛其則則外故風寒先能傷之也。經曰五藏六府皆能令人咳嗽。惟溼病痰飲入胃留之而不行而上入於肺則為嗽。傳以與之也。所病不等寒燥溼風火皆能令人咳嗽。惟溼病痰飲入胃留之而不行而上入於肺則為嗽。今溼在心經謂之熱痰溼在肝經謂之風痰溼在肺經謂之氣痰溼在腎經謂之寒痰。所治不同各隨證用藥。河間曰咳嗽無痰而有聲肺氣傷而不清也。嗽謂無聲而有痰脾溼動而為痰也。咳嗽者有痰而有聲因傷肺氣動於脾溼故咳而兼嗽也。河間曰咳嗽者聲咳之咳俗謂之嗽者是也。肺主氣形寒飲冷則傷之使氣上而不下逆而不收衝擊膈咽令喉中淫淫如癢習習如梗是冷嗽甚者續續不已連連不息坐卧不安言語不竟動引百骸聲聞四隣矣。明理。

脈法

咳嗽所因浮風緊寒數熱細溼房勞瀆難右關濡者飲食傷脾左關弦短痰極肝哀浮短肺傷法當咳嗽五藏之嗽各視本部浮緊虛寒沈數實熱洪滑多痰弦澁少血形盛脈細不足以息沈小伏匿皆是死脈。惟有浮大而嗽者生外證內脈參考停脈訣。關上脈微為咳。脈弦或緊為寒。脈浮者風。脈細為溼。脈數為熱。脈沈為留飲。九數為實熱。洪滑為多痰。脈浮軟者生沈小伏匿者死。正傳曰喘急脈沈肺脹停水氣逆填胸脈必伏取沈而實滑身溫易愈身冷脈浮尺濇難補。回春曰喘脈滑而浮者生澁而數者死大抵宜浮過不宜急數。正傳曰喘鳴肩息者脈實大也緩則生急則死。內經曰喘脈滑而手足溫者生脈濇而手足寒者死數者亦死為其形損故也。脈經曰咳逆脈浮而緩者易治。弦急而按之不鼓者難治。脈結或促或微皆可治。脈代者危。右關脈弦者水乘土位難治。正傳曰咳逆上氣脈散者死散即數脈也。咳逆脈數為大刑金必死。入門曰咳唾膿血脈數虛為肺痿數實為肺癰仲景曰肺痿唾血脈緊強者死滑者生。脈經曰寸數虛瀝肺痿之形脈訣。

咳嗽

雖屬肺亦有臟腑之異。內經曰咳嗽上氣厥在胸中過在手陽明大腸太陰肺。帝曰肺之令人咳何也岐伯對曰五藏六府皆令人咳非獨肺也。帝曰願聞其狀岐伯曰皮手者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也其寒飲食入胃從肺系上至於肺則肺寒肺寒內外合邪因而客之則為肺咳五藏各以其時受病非其時則各傳以與之乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之帝曰何以異之岐伯曰肺咳之狀咳而喘息有音甚則唾血心咳之狀咳則心痛喉中啞啞如梗狀甚則咽腫喉痹肝咳之狀咳則兩脇下痛

甚則不可以轉轉則兩脇下滿脾咳之狀咳則右脇下痛陰引肩背甚則不可以動動則咳劇腎咳之狀咳則腰背相引而痛甚則咳延帝曰六府之咳奈何安所受病岐伯曰五藏之久咳乃移於六府脾咳不已則胃受之胃咳之狀咳而嘔嘔甚則長蟲出肝咳不已則胆受之胆咳之狀咳而嘔嘔甚則肺咳不已則大腸受之大腸咳之狀咳而遺失心咳不已則小腸受之小腸咳之狀咳而失氣腎咳不已則膀胱受之膀胱咳之狀咳而遺尿久咳不已則三焦受之三焦咳之狀咳而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多渴唾而面浮腫氣逆也(內經)

臟腑治咳藥

肺咳宜麻黃湯(方見寒門)心咳宜桔梗湯(方見下)肝咳宜小柴胡湯(方見寒門)脾咳宜升麻湯(方見寒門)腎咳宜麻黃附子細辛湯(方見寒門)胃咳宜烏梅丸(方見寒門)膽咳宜

宜黃苓湯加半夏生薑半夏黃芩芍藥甘草各一錢薑棗煎大腸咳宜赤石脂禹餘糧湯(方見寒門)小腸咳宜芍藥甘草湯(方見腹門)膀胱咳宜茯苓甘草湯(方見苓桂枝各二錢白芍一錢)

前 三焦咳宜錢氏異功散(方見小兒)(海藏)

嗽作有四時早晏之異

凡咳嗽者是春升之氣夏是火炎上最重秋是溼熱傷肺冬是風寒外束(丹心)○重宜解表行痰用藥發散之後以半夏等藥逐去其痰庶不再來(入門)○早晨嗽多者胃中有食積至此時火氣流入肺中瀉白散加知母或二母散(五更嗽同)○上半日嗽多屬胃中有火用貝母石

膏降胃大一云上半日嗽多者(午前也)胃中有實大單石膏丸(方見大門)加知母貝母若便閉喘渴痰稠者宜涼膈散(方見大門)○午後嗽多屬陰虛四物湯加知母炒黃柏先降其火一云午後嗽

(下半日也)多屬陰虛四物合二陳湯加知母黃柏麥冬冬知寒熱盜汗遺精宜滋陰降火湯(方見大門)○黃昏嗽多此火氣浮於肺不宜用涼藥五味子五倍子斂而降之(云黃昏嗽多者(夜嗽也)

潤肺丸以斂之(即潤肺散作丸也)通用二陳湯去半夏加貝母瓜蒌青黛梔子黃芩桑白皮○夜嗽用降陰分火(丹心)○風寒鬱熱夜嗽者三柳湯加知母黃芩生薑(正傳)

桔梗湯

除痰止咳嗽又治心咳桔梗半夏製陳皮去白各一兩枳實三錢右為粗末每三錢薑五水煎服(局方)

二母散

治諸般咳嗽兼治痰喘咳嗽母貝母各一兩巴豆十粒作霜石為末每服一字與薑三片臨臥細嚼白湯下便合口睡其嗽即定亦治久嗽不愈(入門)

咳嗽諸證

有風嗽寒嗽熱嗽濕嗽鬱嗽勞嗽食積嗽氣嗽痰嗽乾嗽血嗽酒嗽久嗽火嗽夜嗽天行嗽通治咳嗽藥○咳因氣動為聲嗽乃血化為痰肺氣動則咳脾濕動則嗽脾肺二藏俱動則嗽咳俱作

也(入門)

風嗽

風乘肺則鼻塞聲重口乾喉癢語未竟而咳(入門)○傷風咳嗽宜神龍散散冬花散人參荊芥散(方見聲音)金沸草鼻流清涕欲語未竟而咳(醫鑒)○傷風咳嗽宜神龍散散冬花散人參荊芥散(方見聲音)金沸草