

醫壘元戎

癰論萃英

東垣十書

卷十六終

醫聖元戎

新安 吳中珩校

傷寒不可汗不可下不可吐諸證

大發春宜吐夏宜汗秋宜下凡用藥汗及吐下湯劑皆中病卽止

若少陽病脈微不可發汗亡陽故也宜附子湯

若陽已虛尺中弱滿者復不可下之宜小柴胡湯

若動氣在左在右在上在下並不可發汗宜柴

胡桂枝湯 若少陰病脈細沉數病在裏不可發

汗宜當歸四逆湯 若少陽病不可發汗宜小柴

胡湯 若咽中閉塞咽喉乾燥亡血衄家淋家瘡
家不可發汗已上六證並宜小柴胡湯 若下利
清谷不可發汗宜理中湯四逆湯之類 若四逆
厥及虛家皆不可吐厥者宜當歸四逆湯 虛宜
附子湯 有熱人宜黃耆人參建中湯 若少陰
膈上寒乾嘔不可吐宜小半夏加橘皮湯溫中丸
若咽中有動氣不可下咽中閉塞不可下宜烏
扇湯 若外寔者不可下諸四逆厥者不可下虛
家亦然厥宜當歸四逆湯 虛者宜附子湯 有
熱宜黃耆人參建中湯 本虛攻其熱必噦宜小

柴胡湯

若脈浮而緊法當身疼痛宜以汗解假

令尺中遲者不可發汗榮氣不足血少故也宜小

柴胡湯

若脈濡而緊濡則衛氣弱緊則榮中寒

陽微衛中風發熱而惡寒榮緊衛氣冷微嘔心內

煩此不可汗宜小柴胡湯

若濡而弱不可發汗

宜小柴胡湯

若浮而大浮爲氣實大爲血虛小

便當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗出法

應衛家微可與小建中湯

若反更實津液四射

榮竭血盡乾煩而不得眠此不可下宜與小柴胡

湯

若脈浮大應發汗宜柴胡桂枝湯

若脈浮

而緊者不可下而及下之爲大逆宜桂枝麻黃各
半湯 若脈數不可下宜柴胡桂枝湯 若下之
必煩利不止宜葛根黃芩黃連湯 若脈瀼弱浮
數不可下宜小柴胡湯 若濡弱微瀼微則陽氣
不足中風汗出而反躁煩瀼則無血厥而且寒不
可下宜桂枝甘草牡蠣龍骨湯 若結胃脈浮大
不可下下之卽死宜小陷胃湯 若陽病多者熱
下之則硬宜小柴胡湯 若太陽發汗不徹轉屬
陽明微汗出不惡寒若太陽證不罷不可下之下
之爲逆宜桂枝麻黃湯 若太陽病有外證未解

不可下下之爲逆宜桂枝麻黃湯 若病發於陽

而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因

作痞 結胸則有陷胸湯九三四痞則有瀉心湯

五 若太陽與陽明合病喘而胃滿不可下宜麻

黃杏子甘草石膏湯 若太陽與少陽合病心下

硬頸項強而弦者不可下宜小柴胡湯 若病欲

吐者不可下宜小半夏加橘皮湯 太陰腹痛吐

食自利腹痛下之必胃下結硬 厥陰病渴氣上

衝心心中熱飢不欲食食則吐衄下之則利不止

若少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐腹痛

能吐始得之手足寒脈弦遲者此胃中寒寔不可
下也宜溫中湯生薑汁半夏湯 若無陽陰強大
便硬者下之必清谷腹滿宜用蜜煎導法 若傷
寒五六日不結胃腹濡脈虛復厥者不可下此亡
血也宜當歸四逆湯下之則死宜四逆加人參湯
若藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎
滑者不可攻也謂下也宜用小柴胡湯 若傷寒
嘔多雖有陽明證不可攻之宜小柴胡湯 若陽
明病身面色赤攻之必發熱宜調胃承氣湯 若
色黃者小便不利也宜五苓散 若陽明病心下

硬滿者不可攻之宜生薑瀉心湯 半夏瀉心湯

攻之利不止者死宜四逆湯

不可汗下吐三法利害非輕前人多列經後大抵醫之失只在先藥藥之錯則變生若汗下不差則永無亡陽生黃畜血結胃痞氣及下痢洞泄脇熱痢瘕急勞等證生矣其如此故錄大禁忌於前使医者當疾之初不犯也

大陽證

桂枝一十四方麻黃五方在後保命集內

傷寒六經所感形證合用汗下

吐和解等湯九仲景

活人雲岐子保命集載之詳者此不復重錄數書

中所無者并諸方對證加減今載于後

金匱黃耆建中湯治虛勞裏急諸不足宜此方主之

黃耆

桂枝

生薑

切各三兩芍藥六兩

炙甘草

二兩膠飴一升

大棗

十二個擘

右七味咬咀以水七升先煮六味取三升去滓內

膠飴令消溫服一升日三若嘔者加生薑 若腹

滿者去棗加茯苓四兩 若肺虛損不足痞氣加

半夏五兩

易簡建中加減法

若婦人血疼男子心腹疴痛并四肢拘急疼痛甚者

加遠志半兩 若或吐或瀉狀如霍亂及胃涉濕
寒賊風入腹拘急切痛加附子七錢半 若疝氣
發作當於附子建中湯煎時加蜜一匙頭許 若
男子婦人諸虛不足小腹急痛脇肋膜脹 下虛
滿胃中煩悸面色痿黃唇口乾燥少力身重短氣
模著強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或因勞
傷過度或因病後不復加黃耆一兩半 若婦人
一切血氣虛損及產後勞傷虛羸不足腹中疝痛
吸吸少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出不思飲
食加當歸一兩名當歸建中湯產後半月每日三

服令人精壯

大建中湯治內虛裏急少氣手足厥逆少腹攣急或
腹滿弦急不能食起即微汗出陰縮或腹中寒痛
不堪勞苦唇口舌乾精白出或手足作寒作熱而
煩苦酸痛不能當立此補中益氣

桂心三錢

芍藥

黃耆各二錢

甘草炙

當歸

人參各一錢

生薑半兩

附子五分

半夏

二錢半 棗二枚

右咬咀水五盞煎至三盞去滓分三服

易商杏子湯治欬嗽不問外感風寒內傷生冷及及

勞咯血痰飲停積悉皆治療

人參

半夏

茯苓

細辛

減半

乾薑

減半

甘草

炙

官桂

減半

芍藥

五味子

右咬咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚

薑五片煎至六分去滓服

若感冒得之加麻黃等分

若脾胃素實者用

殼去筋膜碎剉以醋淹炒等分加之每服加烏梅

一枚煎服其效尤驗嘔逆惡心者不可用此 若

久年欬嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃添芍

藥如麻黃之數乾薑五味子各增一半名小青龍湯

大補十全散

參耆朮茯苓 芍地桂歸川 三五錢秤用

生薑棗水煎 婦人虛弱用 名美號十全

治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病
虛損時發潮熱氣攻骨痛拘急疼痛夜夢遺精面
色痿黃脚膝無力喘欬中滿脾腎氣弱五心煩悶
並皆治之

肉桂

芍藥

甘草

黃耆

當歸

川芎

人參

白朮

茯苓

熟地黄

名曰熟地

右爲麤末每服二大錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分不拘時候溫服桂枝芍藥甘草小建中湯也黃耆與此三物卽黃耆建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子湯也川芎芍藥當歸四物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱天得地之成數故名曰十全散

全散

易簡胃風湯治大人小兒痢乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如莖汁或下瘀血

日夜無度

人參

茯苓

川芎

官桂

當歸

芍藥

白朮

各等分

右咬咀每服三錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去滓稍熱服空心小兒量力減之

若加熟地黃黃耆甘草等分足爲十味名十補湯
若虛勞嗽加五味子 若有痰加半夏 若發

熱加柴胡 若有汗加牡蠣 若虛寒加附子

若寒甚加乾薑皆依本方等分 若骨蒸發熱飲

食自若者用十補湯加柴胡二兩服之 若氣短

加人參 若小便不利加茯苓 若脈弦濇加川

芎 若惡寒加官桂 若脈濇加當歸 若腹痛

加白芍藥 若胃熱濕盛加白朮 若血瘀色紫

者陳血也加熟地黄 若血鮮色紅者新血也加

生地黄 若寒熱者加柴胡 若肌熱者加地骨

皮 若脈洪實痛甚者加酒浸大黃

潔古云防風爲上使 黃連爲中使 地榆爲下

使

千里漿一名水葫蘆

木瓜

紫蘇葉

官桂

名半兩

烏梅肉

赤茯苓名兩

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大噉化一丸嚥津

又方

百藥煎

烏梅肉

紫蘇葉

人參

甘草

麥門冬

右各等分爲細末煉蜜丸噉化

荔枝湯

烏梅肉

甘草名二兩

百藥煎一兩

白芷半兩

白檀三錢

右爲細末湯點