

歸脾湯

見本卷胞漏小產門

香桂散

見本卷子死腹中門

胎逆上逼脹滿子懸論

妊娠胎逆上逼。重則脹滿疼痛。謂之子懸。紫蘇飲爲必用之藥。蓋因紫蘇飲爲治妊娠胎氣不和。濁氣舉胎上湊。胎熱氣逆。心胃脹滿之證。且此證挾氣者居多。宜踈氣舒鬱。非紫蘇。腹皮。川芎。陳皮。無以流氣。非歸芍。無以養血。氣血既利而胎自降。然邪之所湊。其正必虛。故以人參。甘草。補之。如飲食不甘。加四君子。有熱。加芩。梔。歸芍。內熱。晡熱。或

四君兼逍遙散。若常常多怒。時覺脹滿。服順氣藥不應。宜用和氣安胎飲。或加味逍遙散。胎上攻而作痛。宜紫蘇飲。或順氣安胎散。若脾虛停滯脹滿。安胎飲力薄。宜用加參平胃散。有因鬱滯者。亦用紫蘇飲。或加味歸脾湯。有因痰結聚者。紫蘇飲加芩連貝母。有因暴怒者。左關必弦洪。肝火內動。用小柴胡加茯苓枳殼山梔。大抵胎氣上逆皆屬火旺急。用芩朮香附之類。不可服大寒之藥。反致他變。子每治孕婦心胃脹滿。用尊生和氣飲甚效。子懸證有兩尺脈絕。餘脈平和。不可錯認死胎。且死胎有面青舌青。可辨。

宜紫蘇飲消之。則胎歸原位。脹消脉起矣。如臨月胎上逼心。嘔噦欲死。急用童便灌之。卽下。或烏梅肉十枚研爛。入生薑三片煎湯灌之。亦下。取酸以降。斂之兼辛以散。火氣之逆也。又有因坐草太早。心懷恐懼。氣結不行。紫蘇飲一服。便產。○後附針灸一方備用。

四君子湯 治胃氣虛弱。飲食不思。倦怠少食。

人參 一錢至三錢

白朮 一錢至二錢。土炒黃

茯苓 一錢至錢半

炙甘草 六分至一錢

水煎服

逍遙散

附八味逍遙散又名加味逍遙散

治血虛肝

燥。骨蒸勞熱。往來寒熱。咳嗽潮熱。月經不調。口乾

便澁。

柴胡

當歸

酒拌

白芍

酒炒

白朮

土炒

茯苓

各一錢

炙草

五分

加煨薑薄荷引。水煎服。○一方無茯苓。薄荷有茯苓。生

薑為引。治肝脾血虛。鬱怒傷肝。血少目暗。發熱脇痛等

證。○加丹皮梔子

各七分

名八味逍遙散。又名加味逍



遙散。治小便帶血。或過勞。及多食炒炙。宜清膀胱之火。
柴胡、當歸加倍。白朮加五分。

和氣安胎飲 治孕婦多怒。胸中脹滿。若用烏藥香

附、砂仁順氣等藥。反加脹悶。宜服此飲。

人參

白朮 土炒

當歸

酒洗各二錢

川芎

條芩

各八分

陳皮

紫蘇

炙草 各四分

木香

二分磨汁衝服

治產心法

卷止

胎逆上逼子懸方

宅



薑引煎服。○一方無木香。有砂仁四分名順氣安胎散。

治孕婦胎氣上攻心腹。脹滿作痛。子懸之證。有因氣惱

者。加木香二分磨衝服。

加參平胃散 治孕婦脾氣虛弱。飲食停滯。以致腹

脹嘔吐。安胎飲力緩。宜用此散。

人參 白朮土炒各一錢

蒼朮米泔浸製 厚朴薑製七分

陳皮 炙草各四分

薑一片。水煎服。



尊生和氣飲 治孕婦心胃脹滿。

人參

蘇梗

白芍

酒炒

川芎

各六分

當歸

一錢或六分酒洗

腹皮

五分製淨

木香

二分磨衝藥服

炙草

三分

水煎服。

附針灸方

妊娠六七個月。飲食絕然不進。胸隔脹水與藥皆不能下。診脉平和。又非病脉。此乃隔氣不通。藥不能治。惟針



炙可通。宜炙內關穴。卽能進飲食矣。其穴在手掌大紋後二寸兩筋間。此穴可針。亦可炙。男左女右。重則雙手同炙。輕者七壯。重加十數壯。艾如黍大。或如麥大。寸取本人同身寸。以男左女右手。中指屈回。用草較所屈中指中節內紋兩頭盡處截斷。爲準一寸也。

紫蘇飲

見本卷安胎門

小柴胡湯

見本卷諸痛門

加味歸脾湯

見本卷小產門附歸脾湯下

諸血證論

妊娠漏極如同月水胞乾胎死母亦難保其調治之方已
詳論於胎漏門中茲不重論。

妊娠吐血凡七情內傷六淫外感皆足致失血之患。一

火熱者以氣血壅養胎元或有所感則氣逆而火上乘心

煩滿悶血隨而溢甚者或致墮胎但火有虛實之分實火

清熱養血虛火滋陰補水則血安胎固若泛用行血清血

之劑胎必墮而禍不旋踵矣加肝經怒火加味逍遙散膏

梁積熱加味清胃散鬱結傷脾加味歸脾湯肺經有火黃

芩清肺飲因氣鬱滯紫蘇飲氣不攝血補中益氣去升麻

加煨葛根。腎經虛火。冬味地黃湯。

鼻衄不止。東垣涼膈散。加當歸生地。

各一錢。

茅花

一大團。

生薑引。

咳嗽咳血。宜涼血。地黃湯。醫通云。咳嗽咯衄。胎前皆不宜。見如面赤聲啞。不治。又云。凡咯吐血。多致墮胎。胎賴血養。不宜漏溢。宜紫蘇飲。加條芩。

尿血。乃熱乘血分。流滲於脾。故令尿血。自尿門而下。若胎漏。則自人門下血。可辨。宜四物。加山梔。髮灰。或阿膠。熟地。麥冬。五味之類。如怒動肝火。小柴胡。加山梔。脾氣下陷。及

勞動脾火。補中益氣。加茯苓車前。若厚味積熱。加味清胃散。若肝脾血熱。加味逍遙散。

腸風臟毒下血者。平胃散去蒼朮。加槐角。防風。當歸。烏梅。治之。

加味清胃散 治胃中蘊熱。班疹。口舌生瘡。齒齦腐

爛出血。

生地 四錢 丹皮 五錢

當歸 酒蒸 川連

連翹 去心各三錢 升麻

生草 各一錢五分

爲散。分三服水煎去滓。衝犀角磨汁三四分。入藥服之。

黃芩清肺飲 治渴而小便不利。

梔子 炒黑

黃芩

各等分。煎服。○予謂此方乃治雜證發渴而小便不利。妙在熱服探吐以提。則肺氣立清。然胎前血證探吐之法。似非所宜。若服而不吐。不特綿延不能刻應。縱或小差。其苦寒之性。畱薄於內。大傷氤氲之氣。治胎前之證者。得不爲之預慮乎。

冬味地黃湯附丸方

熟地 四錢

山藥 二錢炒

山萸 一錢古方分兩加倍 丹皮

茯苓 澤瀉 各七分

麥冬 一錢或錢半 五味子 十粒

水煎服。○此方藥味十倍之煉蜜丸。即名冬味地黃丸。又名八仙長壽丸。

涼血地黃湯 治妊娠咳嗽吐血咳血。

生地 三錢 麥冬 去心

當歸 酒洗各二錢 黃芩 一錢五分



紫苑

知母

鹽水炒

白朮

土炒

天冬

去心各一錢

犀角

八分

陳皮

甘草

各四分

水煎服。有喘加瓜蒌仁一錢

加味逍遙散

見本卷子懸門附逍遙散下

加味歸脾湯

見本卷胎漏小產門附歸脾湯下

紫蘇飲

四物湯

俱見本卷安胎門



補中益氣湯

東垣涼膈散

小柴胡湯

平胃散

俱見本卷諸痛門

子腫子氣子滿論

子滿證卽俗呼胎水證也

妊娠子腫與子氣相類但子氣在下體子腫在頭面若子

滿證又名爲胎水則在五六月已後比子氣子腫不同蓋

胎大則腹滿遍身浮腫凡子氣子腫子滿由臟氣本弱或

因泄瀉下利耗傷脾胃或寒熱瘧疾煩渴加飲濕漬脾胃

使頭面手足浮腫也。然水漬於胞，兒未成形，則胎多損壞。故初妊，卽腫急，宜調治水去脹消。仍用六君子調補。所謂子腫者，妊娠面目虛浮，多因脾胃氣虛，或久瀉所致。宜健脾利水。全生白朮散主之。或用健脾利水湯，如未應用六君子湯，或加腹皮。車前又專治肢體如水氣之證，亦有用加味五皮湯治子腫之甚者。

所謂子氣者，妊娠自三月成胎之後，兩足面漸腫至腿膝，或腰以下腫，行步艱難，以致喘悶不寧，飲食不美，似水氣狀，甚至腳指間有黃水出者，蓋脾主四肢，脾氣虛弱，不能

制水而發腫肺金少母氣滋養而氣促滿悶諸書名曰子
氣卽水氣俗名皺脚治此病者先服加味天仙藤散如不
效則服茯苓湯再不效服補中益氣湯加茯苓若飲食失
節嘔吐泄瀉六君子湯或加炮薑木香香附若脾肺氣滯
加味歸脾湯佐以加味道遙散或紫蘇飲至孕婦八九個
月脛腿俱腫非水氣比不可以水氣治之反傷正氣凡有
此者必易產因胞臟中水血俱多不致胎燥也

所謂子滿者妊娠至五六個月胸腹急脹腹大異常或遍
身浮腫胸脇不分氣逆不安小便艱澀名曰子滿又爲胎