

惡核良方釋疑



書板寄存廣

東廣州府城西

太平門外十

甫宏經閣書

坊任人到印不

取板租或函知

香港上環大笪

地口街禮和祥

酒房或函知省

城花地西約海

傍勞禮記酒房

光緒二十九年歲在癸卯孟冬刊

此方傳自高州 救活已經千萬  
平日留心細看 臨事方保無患  
見症放胆服藥 切忌溫補燥散

惡核良方釋疑

標蛇 同治



均可商議借板  
印書也。

南海勞禮安堂  
誌

# 四句要訣

居要通風  
卧勿黏地  
食戒熱黏  
藥取急瀉



南京中医药大学图书馆所有

序

死生莫不有命。原無遺憾。然命究不可知。斯人事不可不盡。肇  
城數年來患鼠疫。遭劫頗慘。輕者幸藥而愈。稍重者十每難痊。  
一二人心惶惶。羣醫束手。當時雖有高州派來鼠疫彙編一書。  
唯苦於書少。地廣不能週知。卽知之。未遽深信。信之。而先後緩  
急。又未能如法善用。是以獲效者寥寥。我邑孝廉黎詠陔先生。  
憫此浩劫。曾將彙編悉心研究。篤信無疑。凡親好患是症者。  
踵門求商。悉本原方。如法調治。應手而效。閱歷既多。便有把握。  
因見原書繁重。忽迫之際。苦難卒讀。乃撮其症要。並施治諸法。

分列層次。兼附醫案。使人易曉易從。其用心良苦矣。曾將是編授余參校。余愧不知醫。然道理人人可明。且經驗既多。尤爲可據。力勸付梓。俾爲鼠疫津梁。編中計有萬言。非數十金不辦。擬在附城景福園內餘欵提銀五拾圓以爲刻費。乃商之園紳王君仲銘、胡君賓琴、暨各同人。慨然許諾。誠善舉也。余憶高州初患鼠疫。幾將十年。後得此方。不久寢息。天地好生。其有轉機乎。是爲序。

光緒二十七年。辛丑孟夏。高要黃興鶴序。

## 鼠疫方釋疑

鼠疫爲近年怪症。高州、石城、羅君芝園。光緒十七年。始從醫林改錯得解毒活血湯一方。移植治此症。救活多人。著爲鼠疫集。傳達近傳送。廿五年書傳至肇。板經五刊矣。用者疑信參半。稍知醫者不以爲然。深於醫者尤不以爲然。予初用以治次女。服兩劑不效。另延醫用本。連知柏苦寒藥亦不效。復用二劑。誤於遲誤。於輕遂至不救。繼室產後甫出月。與長男同時病。予懲前誤急進此方。各十數劑。合計桃仁石膏每用至二斤。犀羚花用至三兩。生地元參麥冬三四斤。粥飯戒半月之久。愈後殊不見虛。

弱廿六年除夕前。小媳病。每日五劑未愈。兩日後始見核。元旦急用三劑合煎。重加石膏犀羚花。應手而愈。豈非怪症乎。雖然。症非怪也。常人狃於聞見。用藥不中病。有良方而不肯用。羣相驚怪耳。予年來用此方治輕症四五劑而愈。稍重症十數劑愈。重症二三十劑乃愈。均只用單劑。或輕加承氣白虎湯。迨廿七年用此方。非雙劑三劑合煎。非日夜追服。亦難見效。間有失之遲誤於藥。瀕於危。無可挽救者。十中一二。予是以益信原書之不謬也。惟見近人初起。誤於醫者十之七。誤於時者十之三。誤於輕劑者十之五。誤於半塗改轍者十之九。若不誤時。不誤藥。

輕症早服者十全。重症而能放膽連服獲愈者。十僅一二而已。  
噫。有病之家。舉室皇皇。聽命於醫。醫者乃猜爲感冒。謬作傷寒。  
涼熱雜投。溫補妄進。否則輕劑淺試。養病成深。無誤人之心。  
有誤人之識。曾見有用仙方活命。羌獨葛夏。輕症變爲重者。用  
麻黃桂枝。生芪乳香。稍重變爲危者。用附桂參朮。吳萸干薑。立  
刻斃命者。見之惻然。聞之悚然。一誤再誤。至於屢誤。而牢不肯  
信。猶復執兩手之脈。以較量強弱虛實。豈非天哉。醫道深微。不  
容鹵莽。予更學問粗淺。豈敢謂人皆誤而已。獨不誤。惟知誤急  
改。經驗者多。不忍人之相率坐誤耳。曩見原書詞語繁重。臨事

忽遽無暇詳閱。曾於己亥年撮要刊述。以便省覽。然苟未能將此症了然於心。則往復遲疑。仍不敢始終篤信。因與梁君蔭、梁君眉川、關君仰之、黃君頌韶、梁君俊生、鍾君植生、余君養生、謀輯是刻。以拯災危於萬一。或者天牖其衷。俾細讀原書。庶幾救此一方民乎。明知劫運所關。但人盡人道。有一分祇救一分而已。天矜於民。民之所欲。天必從之。彌縫其闕。而匡救其災。是所望於仁人君子。光緒辛丑高要黎佩蘭詠陔謹識。



重刻良方序略

自芝園氏鼠疫彙編行於世。而治疫有法。自詠陔氏良方釋疑行於世。而信守鼠疫彙編以治疫者尤有法。良方釋疑者。鼠疫彙編之羽翼。鼠疫彙編之慈航寶筏。可以擴張。芝園氏之苦心。發明芝園氏之微旨。讀而易曉。曉而易用。用而易効。濟世壽世。兩得之焉。曩者鄙人嘗錄其方。撮其要。託諸盈尺之紙。盈千之字。分贈有心世界之人。而其後紛紛印送。爲數不下百十萬張。是其爲用之廣。收功之速。奏效之神。可不必煩言以求解。茲特採釋疑一卷。附以芝園先生序論。合而梓之。若是。

熙林良方續疑  
者何也。蓋如此而後無美不臻云。

光緒二十九年癸卯歲。

孟秋之月

上漸

朗心氏序於羊城之西怡怡書塾。



南海勞守慎



南京中医药大学图书馆版权所有  
南京中医药大学图书馆版权所有

惡核良方釋疑

南海

勞守慎

朗心撰

男應根  
姪應坤

全校

目錄

○直看

良方

加減法

敷核藥方

治法

煎藥法

辨症

論買藥

居處衣服飲食



南京中医药大学图书馆版权所有  
南京中医药大学 1956

思患預防

羅芝園辨誤弁言

羅芝園再續治鼠疫方原序

吳宣崇鼠疫原起論

羅芝園鼠疫原起論

羅芝園第五刻鼠疫彙編原序

羅芝園釋疑說

補吳川縣吳宣崇鼠疫原起論及禁忌

羅芝園先生辨明鼠疫症論

醫案

此症係由

熱毒鍊血

成瘀所致。

雖有輕重

遲速之分。

必須用藥

追化血管

之瘀。乃爲

對症要將

此書從頭

惡核良方

標蛇同治。○此方名曰解毒活血湯。出王勲。臣醫林改錯書內。○原方枳壳。鼠疫巢。編改厚朴。

因朴色赤。取其入血份云云。

桃仁

八錢去皮研

紅花

五錢後下

連翹

參錢

赤芍

參錢

生地

五錢

柴胡

八錢

葛根

八錢

當歸

錢半

厚朴

壹錢後下

甘草

錢

原方共十味。清水煎服。再加蘇木壹兩。熟石羔粉壹兩。更好。

服藥法列左

按症服藥。俾人易曉。但病勢沉重。其藥味之

當觀病狀如何。見景生情可也。切記切記。

重數非改用至四五倍。大劑速進。不能救急。

核小色白。不發熱。爲輕症。立卽急治。不可延緩。原方單劑。早八點鐘服一次。晚六點鐘服一次。共服貳劑。○核雖細而紅頭微痛。身微熱。爲稍重症。原方單劑。早八點鐘服一次。晚四點鐘服此書從頭。

看去。方知利害。切勿因其感受輕微。而忽不加察也。

一次夜三鼓服一次。共服藥叁劑。○核大紅腫。大熱大渴。頭痛身痛。爲重症。用雙劑合煎。早八點鐘服一次。晚四點鐘服一次。夜三鼓服一次。共服藥六劑。○核大紅腫。舌黑起刺。循衣摸床。狂言亂語。手足擺舞。無脈可按。身體冰冷。手足抽搐。不省人事。由感毒太盛所致。傷人至速。爲至重之症。用雙劑合煎。早八點鐘服一次。午十二點鐘服一次。晚四點鐘服一次。夜二鼓服一次。四鼓服一次。共服藥拾劑。○照法服藥。方能見功。但服藥後。將愈。用大的主滋陰。的主清熱。初服用小

方內當歸  
初起宜用  
歸尾將愈  
改用歸身

肇宸嘗論  
儒醫羅君  
熱鬱血瘀

退矣。常情當此必不肯進大劑。或改用溫補。是以致敗。然亦有病根深固。已中要害。如賊先據城。棋輸後著。此則無如何矣。故一見症。必急急服藥。慎勿自悞。服至身退大熱。結核漸消。則舌苔白或黃。或渴或未渴。或嘔逆。均宜加煅石羔一二三兩。或謂癥症屬全加白虎湯。煅石羔壹兩伍錢 竹葉伍錢 知母四錢。陽明實熱。熱甚。或手足冷。或有核。或無核。均加羚羊角。西藏紅花各二三錢。痛痺抽搐。重加羚羊伍錢。石羔式兩。西藏紅花伍錢。

加減法列左

服回單劑。每日二服。夜一服。必俟結核一的消盡。方可止藥。因核未消盡。卽熱毒未清故也。如斯時止藥。熱毒翻發。悔之晚矣。

而成核症

多起於陽

少陽部

位亦爲熱

鬱血擁所

結方用柴

葛帥桃紅

直達陽明

從少陽轉

腫而出此

症照前加。

孕婦減輕桃仁紅花。各用一錢。加黃芩一錢。桑子半錢。共貳兩爲底。按各

水瀉譴語。加大黃一二兩。臘結。加承氣湯。生大黃。後下枳實。

壹兩  
四兩

朴硝六錢

沖服

昏懵及見血。均加犀角羚羊西藏紅花。各四錢。竹葉心麥冬。各五錢。

小便不通。加車前木通。各二錢。羚羊犀角。各半錢。

癰。加大青。五錢。疔。痈。加紫花地丁。五錢。生白菊花根葉。壹兩。或

路邊菊。二兩。疹。麻。加淡竹。五錢。知母。四錢。

瓜蔞仁。四錢。

痰瘀帶喉痛。加牛蒡。五錢。

各用一錢。加黃芩一錢。桑子半錢。共貳兩爲底。按各



北京中医药大学图书馆版权所有