

武林葉慕樵著

萬病治療指南

上海中華新教育社印行



萬病治療指南 卷七（內科五）

關格門

【大小便閉】脹悶欲死。二三日則殺人。臍粉一錢。生麻油一合。相和空心服。②益和苦酒傳臍中。乾即易。仍以益汁灌臍內。并內用紙裹。益投水中飲之。③大小便閉。脹欲死。兩三日則殺人。芒硝三兩。泡湯一升。服。取吐即通。④白礬末填滿臍中。以新汲水滴之。覺冷透腹內。即自然通。臍平者。以紙圍環之。⑤甘遂末。以生麴糊調。傳臍中。及丹田內。仍艾三壯。飲甘草湯。以通為度。⑥時珍曰。外甥柳喬。素多酒色。病下極脹痛。二便不通。不能坐臥。立哭呻吟者。七晝夜。鑿用通利藥。不効。遣人叩予。予思此乃溼熱之邪。在精道。壅脹隧路。病在二陰之間。故前阻小便。後阻大便。病不在大腸膀胱也。乃用棟實茴香穿山甲諸藥。入牽牛加倍水煎。服一服而減。三服而平。⑦搗葱白和酢封小腹上。仍灸七壯。⑧桃葉杆汁半升。服。冬用榆皮。⑨巴豆連油。黃連各半兩。搗作餅子。先滴葱鹽汁在臍內。安餅子上。灸二七壯。取利為度。⑩豬脂姜汁各二升。下酒五合。和煎分服。

關格脹滿

千金用葵子為末。豬脂和。九梧子。大每服五十九。効止。②大蒜燒熟。去皮。綿裹納下部。氣立通也。

反胃關格

氣噎不通。丁香木香各一兩。每服四錢。水一盞半煎。一盞先以黃泥做成。益瀘藥汁于內。食前服。

氣壅關格

不通小便。淋結臍下。防悶兼痛。滑石粉一兩。水調服。

癰閉不通

小便急痛。無問久新。荊芥大黃為末。等分。每溫水服三錢。小便不通。大黃減半。大便不通。荊芥減半。名倒換散。③取三四年陳麥草。涼帽煎服。亦可通。

下部閉塞

葫蘆根一把。搗汁。和水絞去滓。強人每服一升。

下焦結熱

小便淋閉。或有血出。或大小便出血。瞿麥穗一兩。甘草炙七錢五分。山梔子仁炒半兩。為末。每服七錢。連鬚葱頭七個。燈心五十莖。生姜五片。水二盞。煎至七分。時時溫服。名立効散。

大小便血

好墨細末二錢。阿膠化湯調服。熱多者尤相宜。②劉寄奴為末。茶調空心服二錢。即止。③靈黃散治腸風大小便血。淋瀝疼痛。用靈黃。蠶蛻紙並燒存性。晚

蚕沙白僵蚕並炒等分為末入麝香少許每服二錢用米飲送下日三服甚効

【產後秘塞】五七日不通不宜妄服藥丸宜用大麥芽炒黃為末每服三錢沸湯調下與粥間服②大小便不通用桃花葵子滑石枳榔等分為末每空心葱白湯服二錢即利

【利大小便】芎實為末半兩分二服新汲水下

【小便久閉】諸藥不効以麝香少許和患者頂心頭泥作條入尿壅紙封馬口使氣透入尿壅內不過一時即通

【小便出血】溺管痛不可忍淡豆豉五錢煎湯溫服

【大便不通】除有病者仍從病治如無故不通用麝香一錢硃砂五分共研細以飯為丸桐子大開水下即通

【女子轉胞】小便不通腹脹如鼓數日垂死用猪胞吹脹以鷲毛管安上插入陰孔捻胞氣吹入即大尿

【小便不通】調乾麝圈出臍眼高寸許以葱裝射直安臍中麝圈內填鹽灸三五壯熱氣直透臍內其便立通

結燥門

【大便壅結】膩粉半錢沙糖一彈丸研丸梧子大每服五丸臨臥溫水下②又方膩粉二錢黃丹一錢為末每米

飲服一錢③皂礬一錢巴霜二個同研入雞子內攪勻封頭溼紙裹煨熟食之酒下即通④當歸白芷等分為末每服二錢米湯下

【大便閉塞】羊胆汁灌肛門內即通猪胆尤妙

【大便風秘】香白芷炒為末每服二錢米飲入蜜少許連服二服②蒺藜子炒一兩猪牙皂莢去皮酥炙五錢為末每服一錢鹽湯送下

【大便卒結】羊蹄根一兩水一大盞煎六分溫服

【大腸乾結】厚朴生研猪臟煮搗和丸梧子大每姜水下三十丸

【大便燥塞】以松子仁研泥加生白蜜三錢水調服

【大便不通】十月至一月者冬葵子三升水四升煮取一升服不瘥更服②葵子末人乳汁等分和服立通③用牽牛子半生半熟為末每服二錢姜湯下未通再以茶

服一方加大黃等分④麻子煮粥下葱椒鹽豉空心服⑤烏白木根方長一寸劈破水煎半盞服之立通不用多喫其功神聖兼能取水⑥猪胆治大便不通以葦筒納入下部三寸灌之立下

【大便不快】裏急後重用桃仁三兩去皮吳茱萸二兩食鹽一兩同炒熟去鹽茶每嚼桃仁五七粒

大便艱難 桃花為末。水服方寸匕即通。

大腸虛閉 勻氣散。用連鬚葱一根。姜一塊。鹽一捻。淡豉

三七粒。搗作餅。烘掩臍中。扎定。良久氣通即通。不通再作。②松子仁。柏子仁。麻子仁。等分。研泥。溶白蠟和。九梧子。大。每服五十丸。黃芪湯下。

燥渴腸秘 九月十月熟。蘇葉實。取瓢拌乾。葛粉。銀石器

中。慢火炒熟。為末。食後夜臥。各以沸湯點服二錢。

乾糞塞腸 脹痛不通。用毛桃花。淫者一兩。和麴三兩。作

餛飩。煮熟。空心食之。日午腹鳴如雷。當下惡物也。

熱黃便結 用蕪菁子。搗末。水和絞汁服。少頃當瀉。一切

惡物。砂石。草髮並出。

老人閉塞 綿黃耆。陳皮。去白。各半兩。為末。每服三錢。用

大麻子一合。研爛。以水濾漿。煎至乳起。入白蜜一匙。再

煎。沸調藥。空心服。甚者不過二服。此藥不冷不熱。常服

無閉塞之患。其効如神。②柏子仁。松子仁。大麻仁。等分

同研溶。蜜蠟丸。梧子大。以少黃丹湯食前調服。二三十

丸。日二服。

老人冷秘 風秘或泄瀉。煖元臟。除積冷。溫脾胃。進飲食。

治心腹一切痙癖冷氣。硫黃。柳木。槌研細。半夏湯泡七次。焙研等分。生姜自然汁調蒸餅和。杵百下。丸梧子大。

每服十五丸至二十丸。空心溫酒或姜湯下。婦人醋湯下。

大便溼悶 腸胃有溼。大便秘塞。大枳榔二枚。麥門冬煎湯磨汁溫服。或以蜜湯調末二錢服亦可。

大腸冷積 威靈仙末。蜜丸。梧子大。一更時生薑湯下。十丸至二十丸。

大腸冷秘 陳皮連白酒煮。焙研末。每溫酒服二錢。米飲下。

痔病秘結 用此寬腸。黃連枳殼等分為末。糊丸。梧子大。每服五十丸。空心米飲下。

大便頻數 宗奭曰。今人惟知半夏去痰。不言益脾。蓋能

分水故也。脾惡溼。溼則濡困。困則不能治水。經云。水勝

則瀉。一男子夜數如廁。或教以生薑一兩。半夏大棗各

三十枚。水一升。甕瓶中慢火燒為熟水。時呷之。便已也。

麻子仁丸 治脾約。大便秘而小便數。麻子仁二升。芍藥

半斤。厚朴一尺。大黃枳實各一斤。杏仁一升。熬研。煉蜜

丸。梧子大。每以漿水下。十丸。日三服。不知再加。

大便燥結 不通。用猪苦胆于羊角內灌入直腸。大便即

可通利。而不燥結矣。②內服。松子仁五錢。研為泥。生白

蜜一兩。開水調服。

腸風下血

【莫門暴腫】腸胃流熱下注則莫門暴腫外以木鼈子磨塗莫門內服防風通聖散歌曰防風通聖芥麻黃歸芍芎芩枯草動薄荷葱翹梔滑石硝黃姜配石膏方

【正水脹急】大小便不利欲死甘草五錢半生半炒胭脂坯子十文研勻每以一錢白麩四兩水和作菰子大水煮令浮淡食之大小便利後用平胃散加熟附子每以二錢煎服

腸風下血門

【腸風下血】黃芪黃連等分為末麩糊丸菴豆大每服三十丸米飲下②木香黃連等分為末入肥猪大腸內兩頭紮定煮極爛去藥食腸或連藥搗為丸服③茶葉內箬葉燒存性每服三匙空心糯米湯下或入麝香少許④蜜炙蘿蔔任意食之昔一婦人服此有効⑤經霜茄連蒂燒存性為末每日空心溫酒服二錢⑥腸風下血不止茄蒂燒灰米飲服二錢⑦霜後乾絲瓜燒存性為末空心酒服二錢⑧用寒藥熱藥及脾弱藥俱不効者獨用山震果俗名酸棗又名鼻涕團乾者為末艾湯調下應手即愈⑨柏子十四個槌碎囊貯浸好酒三盞煎八分服立止⑩松木皮去粗皮取裏白者切晒焙研

為末每服一錢臘茶湯下①使前近腎肝便後近心肺兒角刺灰二兩胡桃仁破故紙炒槐花炒各一兩為末每服一錢米飲下②不拘遠年近日用枳殼燒黑存性五錢羊腰炭為末三錢五更空心米飲下如人行五里再一服當日見効③破絮燒灰枳殼麩炒等分麝香少許為末每服一錢米飲下④皮鞋底套龜蛻核桃殼雞冠花等分燒灰每酒服一錢

【腸風瀉血】皂莢樹上草瓦焙為末每服一錢溫酒下椿莢半生半燒為末每服二錢半米飲下

【久近腸風】下血用緊炭三錢枳殼燒存性五錢為末每服二錢五更米飲下一服天明再服當日見効忌油膩毒物

【久病腸風】痛痺不止地榆五錢蒼朮一兩水二鐘煎一鐘空心服日一服②瀉血百藥不瘥敗皮中子燒灰白礬燒各一兩人指甲甲燒焦麝香各一分乾姜炮三兩為末每服一錢米飲下

【辟毒腸風】因營衛虛弱風氣襲之熱氣乘之血滲腸間故大便秘下血用皂椿根刮去粗皮焙乾四兩蒼朮米泔浸焙枳殼麩炒各一兩為末醋糊丸如梧子大每服五十丸米飲下日三服

熱毒腸風 蕨菜花焙為末。每服二錢。米飲下。

濕痢腸風 變通丸。治赤白下痢。日夜無度。乃腸風下血。

用川黃連去毛。吳茱萸湯泡過。各二兩。同炒香。漉去各

為末。以粟米飯和。凡梧子大。各收。每服三十丸。赤痢甘

草湯下。黃連丸。白痢姜湯下。萊菔丸。赤白痢各用十五

丸。米湯下。此乃浙西河山純老方。救人甚効。

腸風下血 用鰾鱧二斤。治淨。酒二盞煮熟。入鹽醋食之。

臟毒痔漏 下血不止。用川黃蘗皮刮淨一斤。分作四分。

三分用酒醋重尿各浸七日。洗晒焙一分生炒黑色。為

末。煉蜜丸梧子大。每空心溫酒下五十丸。久服除根。

酒痢腸風 黑散子。治風入臟。或食毒積熱。大便秘血。疼

痛。肛出。或久患酒痢。木饅頭燒存性。絞櫚皮燒存性。烏

梅去核。粉草炙等分為末。每服二錢。水一盞煎服。

腸風臟毒 下血不止。旱蓮子草。瓦上焙研末。每服二錢。

米飲下。何首烏二兩為末。食前米飲服二錢。雲臺

子生用。甘草炙為末。每服二錢。水煎服之。豬臟入黃

連末在內煮爛。搗丸梧子大。每米飲服三十丸。

臟毒下血 百草霜五錢。以米湯調露一夜。次早空心服。

①用獨蒜煨。和黃連末為丸。日米湯飲之。②新槐

臟毒赤白 地錦草洗暴乾為末。米飲服一錢。立止。

下血危篤 不可救者。絲瓜即天羅一個。燒存性。槐花減

半為末。空心米飲服二錢。

大腸下血 荆芥炒為末。每米飲服二錢。婦人用酒下。亦

可。拌麩作餅。飽食之。①荆芥二兩。槐花二兩。同炒紫為

末。每服三錢。清茶送下。②敗瓢燒存性。黃連等分。研末。

每空心溫酒服二錢。③茅薺搗汁。大半鐘好酒。半鐘空

心溫服。三日見効。④用槐花。荆芥。芥穗等分為末。酒服。

錢七。⑤不拘大人小兒。臟毒腸風。及內痔下血。日久多

食。腸飢。先用海螵蛸炙黃。去皮研末。每服一錢。米賊湯

下。三日後服豬臟黃連。

下血不止 絞櫚皮半斤。括樓一個。燒灰。每服二錢。米飲

調下。

積年下血 寒食蒸餅。烏龍尾各一兩。皂角七挺。去皮酥

炙為末。蜜丸。米飲每服二十丸。

便前血 令人面黃。用酢石榴皮炙研末。每服二錢。用

茄子枝煎湯服。

無故遺血 亂髮及爪甲燒灰。酒服方寸匕。

真後下血 萱草根和生薑油炒。酒冲服。①桑樹上白蟬

花。水煎服。或末服。亦止吐血。②不拘大人小兒。五倍子

末艾湯服一錢。白雞冠花並子炒煎服。

【結陰便血】雄黃不拘多少入棗內線繫定煎湯用銚一兩化汁傾入湯內同煮自早至晚不住添沸湯取出為末共棗杵和丸梧子大每服三十丸煎黑銚湯空心下只三服止。

【男子便血】黑豆一升炒焦研末熱酒淋之去豆飲酒神效。

【腸痔下血】多年不止用木賊枳殼各二兩乾姜一兩大黃二錢半並于銚內炒黑存性為末每粟米湯服二錢甚効。

【大腸虫出】不斷斷之復生行坐不得鶴虱末水調半兩服自愈。

【穀道生瘡】已決洞者牡丹末湯服方寸七日三服。久不愈用雞脫腔燒存性為末乾貼之如神。

【大腸血虛】用枵根白皮一兩人參一兩為末每服二錢空心溫酒調服米飲亦可忌油膩溼麪青菜果子茄物雞猪魚羊蒜薤等。

【下部蟲蟲】梅葉桃葉一斛煮爛蒸極熟納小器中隔布坐蒸之虫盡死也。病人齒無色舌上白喜睡憤憤不知痛痒處或下痢乃下部生虫食肛也桃仁十五枚苦

酒二升鹽一合煮六合于上半月望前服之虫盡死。

【槐角丸】治五種腸風瀉血。黃前有血名外痔。黃後有血名內痔。大腸不收名脫肛。穀道四面努肉如爛名舉痔。頭上有孔名瘻瘡。內有虫名虫痔。並皆治之。槐角去梗炒一兩地榆當歸酒焙防風黃芩枳殼麪炒各半兩為末酒糊丸梧子大每服五十丸米飲下。

【瀉血腸紅】新得良方歸身二錢地榆炒黑一錢日二服忌姜椒並一切辛熱之物。

【相火閉結】大黃末一兩牽牛頭末五錢每服三錢有厥冷者酒服無厥冷五心煩蜜湯服。

脫肛門

【大腸脫肛】烏龍尾即梁上塵同鼠屎燒烟于桶內坐上熏之數次即不脫也。蛇牀子甘草各一兩為末每服一錢白湯下日三服並以蛇牀末傅之。木賊燒存性為末摻之按入即止一加龍骨。槐角桃花各等分炒為末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下猪腰子去皮煎炙亦可。

【脫肛不收】芋根搗爛煎湯熏洗之。貼水荷花葉研酒服二錢仍以荷葉盛末坐之。用五倍子末三錢入白

礬一塊。水一碗。煎湯洗之。立効。

【下痢脫肛】赤石脂。伏龍肝。為末。傅之。一加白礬。二黑色堅硬。用巴豆殼燒灰。芭蕉自然汁。煮入朴硝。少許洗軟。用真麻油。點火滴于上。以枯礬龍骨。少許為末。摻肛頭上。以芭蕉葉托入。三白龍骨粉撲之。

【積痢脫肛】枳實石上磨平。蜜炙黃。更互熨之。縮乃止。

【痢痔脫肛】冷水調黃連末塗之。良。

【脫肛歷年】不入者。生鉄二斤。水一斗。煮汁五升洗之。日再。

【虛冷脫肛】石灰燒熟。故帛裹坐。冷即易之。

【風熱脫肛】鉄粉研同白飯末。傅上按入。

【痔漏脫肛】胡荽子一升。粟糠一升。乳香少許。以小口瓶燒烟熏之。四虎腰骨兩節。以蜜二九炙赤。搗蜜蒸餅丸。

梧子大。每清晨溫酒下二十丸。取効。

【老小脫肛】香附子。荆芥穗。等分為末。每服一匙。水一大盞。煎十數沸淋洗。

【脫肛瀉血】石耳五兩。炒白枯礬一兩。蜜陀僧半兩。為末。

蒸餅丸。梧子大。每米飲下二十九。

【下血脫肛】白雞冠花。防風。等分為末。糊丸。梧子大。空心米飲服七十丸。

【肛門腫痛】馬齒莧葉三葉。酸草等分。煎湯熏洗。一日二次。有効。

【肛門凸出】故屋東壁上土一升。研末。以長皂莢。按末之。仍炙皂莢。更互熨之。二虎骨燒末。水服。方寸匕。日三。

【腸頭挺出】秋冬搗胡荽子。醋煮熨之。甚効。

【肛門生瘡】肛門主肺。肺熱即肛塞腫縮。生瘡。白蜜一斤。猪胆汁一枚。相和。微火煎。令可丸。九。子。長。作。提。塗。油。

納下部。卧令後重。須臾通泄。

【虫蝕肛門】見五臟則死。以猪脂和馬蹄。或綿裹。愈。

部。日數度。瘡。

【穀道虫痛】腫痒。杏仁杵膏。頻頻傅之。

【穀道赤痛】兔絲子。熟黃黑。為末。雞子白和塗之。

【大腸脫下】木饅頭連皮子切炒。茯苓猪苓等分為末。每服二錢。米飲下。亦治夢遺。名鎖陽丹。

【下痛肛痛】不可忍。者。熱鹽色坐熨之。

【脫肛氣熱】臘月陰乾猪胆五分。孩兒茶二分。片腦一分。為末。人乳調搽肛上。熱汁自下。而肛收也。亦治痔瘡。

【老幼脫肛】萬年青連根煎湯熏洗。二又方五倍子炙研末。傅之。

痔漏門

【內痔腫痛】孩兒茶麝香為末。唾津調傳之。②朝陽黃土黃連末皮硝各一兩。用猪胆汁同研如泥。每日旋丸塞大。納入肛內過一夜。隨大便去之。內服烏梅黃連二味丸藥。③不可忍。胡黃連末。鷄胆汁調塗之。④不可忍。蛇牀子煎湯熏洗。⑤胡荽子炒為末。每服二錢。空心溫酒下。數服見效。⑥冬瓜煎湯洗之。⑦一人患痔。諸藥不効。用木耳煮羹食而愈。極驗。⑧桃根木煎汁浸洗之。當有虫出。⑨紫荆皮五錢。新汲水煎服。⑩用熱童尿入麝三分洗之。一日二三次効。⑪綿裹鯉魚鱗入肛門痛止。

【痔虫作痒】古石灰川烏頭炮等分為末。燒飯丸梧子大。每服二三十九。白湯下。

【雞冠痔疾】黃連末傳之。加赤小豆末尤良。

【野雞痔病】先以槐柳湯洗過。以艾灸上七壯取効。

【五痔肛腫】久不愈。變成瘻瘡。用雞冠花鳳眼草各一兩。水二盞煎湯頻洗。②用木鼈仁三枚。砂盆搗如泥。入百沸湯一盞。乘酒先熏後洗。日用三次。仍塗少許。

【痔瘡乳核】芫根一握洗淨。入木臼搗爛。入少水絞汁于石器中。慢火煎成膏。將絲線于膏內度過。以線繫痔。當

微痛。候痔乾落。以紙撚蘸膏。納數內去根。當永除根也。

【痔如虫咬】兔絲子熬黃黑為末。雞子白和塗之。

【內痔不出】草烏為末。津調點肛門內。痔即反出。乃用粘痔藥點之。

【痔瘡初起】馬齒莧不拘鮮乾煮熟。急食之。以湯熏洗。

月內外。其孔閉即愈矣。②痒痛。麝香熱餅之。冷又貼。

【吐血痔血】向東蘘荷根一把。搗汁三升。服之。

【痔瘡出血】槐樹上木耳為末。飲服方寸匕。日三服。③餅子粉糯米粉各一升。炒黃。滾水調作果子飯上蒸數食。之。不過四五次効。④桃葉一斛。杵納小口器中。坐蒸之。有虫自出。

【翻花痔瘡】木瓜為末。以鯉魚身上涎調貼之。以紙護住。

【痔瘡風腫】作痛。胡麻子煎湯洗之。即消。②發歇不定者。是也。白僵蚕二兩洗。炒妙黃為末。烏梅丸和肉梧桐子大。每姜蜜湯空心下五丸妙。

【內外痔瘡】片腦一二分。葱汁化搽之。②許仁則方。用槐角子一斗。搗汁晒稠。取地胆為末。同煎丸梧子大。每飲服十九。兼作挺子納下部。或以苦參末代地胆亦可。

【外痔長寸】用槐花煎湯頻洗并服之。數日自縮。

【諸痔發痒】用全蠍不拘多少。燒烟熏之。即効。秘法也。

大腸氣痔 作痛下血百藥煎末每服三錢稀粥調服日二次

下部痔蟲 掘地作小坑燒赤以酒沃之納吳茱萸在內坐之不過三度良

痔病秘結 用此寬腸黃連枳殼等分為末糊丸梧子大每服五十九空心米飲下

肛門鼠痔 蜘蛛絲纏之即落②腫痛用穿山甲尾尖處一兩炙存性鼈甲酥炙一兩麝香半錢為末每服一錢真茶湯服取効

十年痔瘡 熊胆塗之神効一切方不及也

下血成痔 稻藁燒灰淋汁熱洗三五度瘥

腸痔下血 益母草葉搗汁飲之②五月五日采蒼耳莖葉為末水服方寸匙甚効③葱白三升煮湯熏洗立効

④小豆三升苦酒五升煮熟日乾再浸至酒盡乃止為末酒服一錢日三服⑤熱多者尤佳樹葉微炙研末一錢槐花炒研末一錢米飲調服未止再服

肛門酒痔 絲瓜燒存性研末酒服二錢

酒痔下血 黃連酒浸煮熟為末酒糊丸梧子大每服三四十丸白湯下②青蒿用葉不用莖用莖不用葉為末

糞前冷水煮後水酒調服

痔瘡如瓜 腫痛如火柳枝煎濃湯洗之艾炙三五壯

虫痔裏急 換柳為末每日空心以白湯調服二錢

痔瘡有虫 不止者用翫月砂即免糞也慢火炒黃為末每服二錢入乳香五分空心溫酒下日三服①作痒或下膿血多取槐白皮濃煎汁先熏後洗良久欲大便當有虫出不過三度即愈仍以皮為末綿裹納下部中

痔漏腫痛 荆芥煮湯日日洗之②豬胆七個綿裹脂十個洗水和勻搽七次即可③旱蓮草一把連根鬚洗淨

用石臼搗如泥以極熱酒一盞衝入取汁飲之痔傳患處重者不過三服即安④葱涎白蜜和塗之先以米鼈子煎湯熏洗其冷如水即効一人苦此早用午安也

腸風痔瘻 銅青密陀僧各一錢麝香少許為末津和塗之②槐葉一斤蒸熟晒乾研末煎飲代茶久服明目

五痔諸瘻 忍冬圓治消渴愈後防發瘻疽先服此用忍冬草根並花葉皆可不拘多少入瓶內以無灰好酒浸

以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許碾為細末以浸藥酒打麩糊丸梧子大每服五十九至百丸湯酒任下

此藥不特治瘻疽大能止渴②芥子末以水蜜和傅乾即易之

痔漏出血 香白芷為末每服二錢米飲下并煎湯熏洗

神効

【久近痔漏】三十年者。三服除根。用蓮花益黑牽牛頭末各一兩半。當歸五錢為末。每空心酒服二錢。忌熱物五日見効。

【痔漏有虫】黑白牽牛各一兩炒為末。以猪肉四兩切碎炒熟。蘸末食盡。以白米飯三匙壓之。取下白虫為効。

【痔漏脫肛】胡荽子一升。粟糠一升。乳香少許。以小口瓶燒烟熏之。③絲瓜燒灰。多年石灰雄黃各五錢為末。以猪胆雞子清及香油和調貼之。收上乃止。

【臟毒痔漏】下血不止。川黃柏皮削淨一斤。分作四分。三分用酒醋童尿各浸七日。洗晒焙一分生炒黑為末。蜜丸梧子大。每空心溫酒下五十九丸。久服可除根。

【諸瘡痔漏】久不結痂。用生薑連皮切大片塗白礬末炙焦研細貼之。勿動良。

【上下諸瘻】或在頂或在下部。用苦參五升。苦酒一斗。漬三四日服之。以知為度。

【下部漏瘻】苦參煎湯日日洗之。

【一切漏瘻】故布裹鹽燒赤為末。每服一錢。④土瓜根搗傅之。燥則易。⑤用槲樹北陰白皮三十斤剉。以水一石煮一斗去滓。煎如飴。又取通都廁上雄鼠屎雌鼠屎各

十四枚。燒汁盡研和之。納溫酒一升和勻。瘦人食五合。富有虫出也。

【漏瘻不合】童尿製爐甘石牡蠣粉外塞之。內服滋補藥。瘻瘡水溢。乃腎虛也。牽牛末二錢半。入切開猪腎中。竹葉包定煨熟。空心食溫酒送下。借腎入腎。一縱一橫。兩得其便。惡水既泄。不復淋瀝。

【漏瘻膿血】白乳香二錢。牡蠣粉一錢。為末。雪糰丸。瘻子大。每姜湯服三十九丸。

【九瘻有孔】苦瓠四枚。大如盞者。各穿一孔。如指大。湯煮十數沸。取一竹筒長一尺。一頭挿瓠孔中。一頭湏瘻孔上。冷則易之。用過乃止。

【漏瘻惡穢】大腹皮煎湯洗之。

【九漏有虫】治九漏。燭燼同陰乾。馬齒莧等分為末。以泔水洗淨。和臘猪脂傅之。日三上。⑥乾人屎乾牛屎隔綿貼之。虫聞其氣即出。若痒則易之。虫盡乃止。

【一切冷漏】人吐蛇虫燒灰。先以甘草湯洗淨塗之。無不瘻者慎口味。

【蜈蚣漏瘻】萬根燒灰。千年石灰等分為末。油調傅之。⑦槲葉燒存性研。以米泔別浸槲葉取汁洗瘻。後乃納灰少許于瘻中。

此方為校對。需要完整PDF請訪問。ertongbook

蟻漏不愈 鯪鯉甲二七枚燒灰猪脂調傅

蝎癭五孔 相通者半夏末水調塗之日二

槐湯灸痔 以槐枝濃煎湯先洗痔便以艾灸其上七壯

以知為度

槐角丸 治五種腸風瀉血等症悉前腸風下血門

不禁門

小便不禁 治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁用白

茯苓赤茯苓等分為末以新汲水按洗去筋控乾以酒

煮地黄汁搗膏搜和丸彈子大每嚼一丸空心鹽湯下

雄雞銅燒研酒服方寸匕上熱下寒者鹿角霜為

末酒糊丸梧桐子大每服三四十丸空心溫酒下

小便卒數 非淋令人瘦石膏半斤搗碎水一斗煮五升

每服五合

小便滑數 金剛骨為末每服三錢睡時溫酒下

小便頻數 益智子鹽炒去鹽烏藥等分為末酒煮山藥

粉為糊丸如梧子大每服七十丸空心鹽湯下凡人

小便頻數不計度數便時莖內痛不可忍者此疾必先

大腑秘熱不通水液只就小腸大腑愈加乾竭甚則渾

身熱心躁思凉水如此即重症也此疾本因貪酒色積

有餘毒腐物瘀血之類隨虛水入于小腸故使時作痛

也不飲酒者必平生過食辛熱葷膩之物又因色傷而

然此乃小便頻數而痛與淋症澀而痛者不同也宜用

單解一兩水浸少時以鹽半兩同炒去鹽為末每服

錢水一盞煎八分和滓服之使水道轉入大腸仍以葱

湯頻洗穀道令氣得通則小便數及痛自減也山藥

以礬水煮過白茯苓等分為末每水飲服二錢白果

十四枚七生七煨食之取効止下焦虛冷也羊肺

具切作羹入少羊肉和鹽鼓食不過三具鹿角霜白

茯苓等分為末酒糊丸梧子大每服三十丸鹽湯下

心虛尿滑 及赤白二濁益智子仁白茯苓白朮等分為

末每服三錢白湯調下

腎消尿數 乾姜半兩以鹽四錢炒黃成顆雌黃一兩半

為末蒸餅和丸菴豆大每服十丸至三十丸空心鹽湯

下鹿角一具炙搗篩溫酒每服方寸匕日二

膏痺尿多 其人飲少用秦椒二分出汗瓜蒂二分為末

水服方寸匕日三服

小便過多 象牙燒灰飲服之

小便無度 破故紙十兩酒煮茴香十兩鹽炒為末酒糊

丸梧子大每服百丸鹽酒下或以米糝猪腎煨食之

不禁門

小閉門

消中尿多 日夜尿七八升。冬葵根五斤。水五斗煮三斗。每日平旦服二升。

老人遺尿 不知出者。草烏頭一兩。童便浸七日去皮。同鹽炒為末。酒糊丸。菴豆大。每服二十九。鹽湯下。

男婦遺尿 枯白礬牡蠣粉等分為末。每服方寸匕。溫酒下。日三服。

下虛尿床 羊肚盛水煮熟。空腹食四五頓。瘥遺尿且濕。桑耳為末。每酒下方寸匕。日三服。

遺尿淋瀝 痛不可忍。雞肫內黃皮五錢。陰乾燒存性。作一服。白湯下立愈。用雞脆脰一具。并腸燒存性。酒服。

男用雌。女用雄。

夜卧尿床 本人草薦燒灰水服立瘥。

婦人遺尿 舩故茹為末。酒服三錢。

睡中尿床 用燕薺草即燕窠中草也。無毒。主眠中遺尿。燒黑研末。水進方寸匕。用麻鞋綱帶及鼻根。惟不用底。

七量以水七升煮二升。分再服。用猪脬洗炙食之。

老少尿床 白紙一張鋪席下。待遺于上。取紙晒燒酒服。

止小便利 雞腸草一斤。豆豉汁和米作羹及粥。頻食之。

少小便床 薔薇根五錢。煎酒夜飲。

小閉門

【小便不通】 蚯蚓糞朴硝等分。水和傳臍下即通。梁塵三指撮水服之。滑石末一升。以車前汁和塗臍之。四畔方四寸。乾即易之。冬月水和。或鹽湯用戎鹽彈丸大一枚。茯苓半斤。白朮二兩。水煎服之。用牛根洗研攤絹上。貼少腹連陰際。須臾即通。時珍曰。按聖惠方治小便不通。用地麥草一把。水煎服。古方亦常用之。此物能益陰。通小腸。無陰則陽無以化。亦東垣治小便不通。用黃蘗知母滋腎之意。腹脹用瓜薑煨研。每服二錢。熱酒下。頻服以通為度。臬曰。膀胱有火邪并小便不利及黃濕者。並用酒洗黃蘗知母為君。茯苓澤瀉為佐。凡小便不通而口渴者。邪熱在氣分。肺中伏熱。不能生水。是絕小便之源也。法當用氣味俱薄淡滲之藥。猪苓澤瀉之類。瀉肺火而清肺金。滋水之化源。若邪熱在下焦血分。不渴而小便不通者。乃素問所謂無陰則陽無以生。無陽則陰無以化。膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。法當用氣味俱厚陰中之陰藥治之。黃蘗知母是也。

【小便不利】 膀胱熱閉。小便不快。井泉石海金沙車前子。

滑石各一兩為末。每服二錢。蜜湯下。②有水氣。括蒼瞿麥丸主之。瞿麥二錢半。括蒼根二兩。大雞子一個。茯苓山芋各三兩。為末。蜜和丸。梧子大一服。三九日。三。未知益至七八九。以小便利。腹中溫為知也。③膀胱水氣流滯。浮萍日乾為末。飲服方寸七日。二服。④蒲席灰七分。滑石二分。為散。飲服方寸七日。三。

【小便艱難】或轉胞。腹滿悶。不急療。殺人。用秦朮一兩。水一盞。煎六分。分作二服。②又方。加冬葵子等分為末。酒服一七。③不通。乾蒼葉一兩。燒灰。滑石半兩。為末。每米飲服三錢。

【小便熱短】樺皮濃煎汁飲之。

【小便澀痛】蜚蠊紙燒存性。入麝香少許。米飲。每服二錢。

【卒不小便】杏仁二七枚。去皮尖。炒黃研末。米飲服之。

【小便閉脹】不治殺人。葱白三斤。剉炒。帕盛二個。更互熨小腹。氣透即通也。②諸藥不効者。以真麝香少許。和患

者頭頂心泥。作條入尿壅中。紙封孔口。使氣透入尿壅

內。不須過一二時長。則小便可以通暢矣。

【小便虛閉】兩尺脈沉微。用利小水藥不効者。乃虛寒也。

附子一個。炮去皮臍。鹽水浸良久。澤瀉一兩。每服四錢。水一盞半。燈心七莖。煎服即愈。②因腫毒未潰。小便不

通。用葱切入麻油煎至黑色。去葱取油。時塗腫處。即通。

【汗多便閉】老人虛人皆可用。肉蓯蓉酒浸焙二兩。沉香一兩。為末。麻仁汁打糊。丸梧子大。每服七八丸。白湯下。

【相火秘結】大黃末一兩。牽牛頭末半兩。每服三錢。有

冷者酒服。無厥冷五心煩。蜜湯下。

【通利小便】龍葵根與木通。胡荽煎湯服。通利小便。

【小腸結澀】時珍曰。聖惠治小腸結澀不通。心煩悶。用粟奴苦竹鬚小豆葉炙甘草各一兩。灯心十寸。葱白五寸。銅錢七文。水煎分服。取効乃止。

【立不得溲】病不得溲。卧則微通。立則不得溲。滿用通利藥不効。唐問其平日自製黑錫丹常服。因悟曰。此必結砂硫飛去鉛不死。鉛砂入膀胱。卧則偏重。猶可溲。立則正塞水道。故不通。取金液丹三百粒。分為十服。煎瞿麥湯下。

諸淋門

【小便淋痛】葵花根洗到水煎。五七沸服之。如神。②石韋

滑石等分為末。每飲服刀圭最驗。③諸淋赤痛。三葉酸

漿草洗。并取自然汁一合。酒一合。和勻。空心溫服。立通。

④粳粟米粥。氣薄味淡。陽中之陰也。所以淡滲下行。能

利小便。專啖粟米粥。絕去他味。旬餘。瘥。月餘瘥。此五穀治病之理也。

【卒淋不通】好墨燒一兩為末。每服一字。溫水服之。②姜蕤一兩。芭蕉根四兩。水二大盞。煎一盞半。入滑石二錢。分三服。③取地膚草。搗自然汁。服之。遂通。至賤之物。有回生之功如此。

【小便淋瀝】防已。防風。葵子。各二兩。㕮咀。水五升。煮二升。半分三服。②或有白者。以赤根樓葱。近根截一寸許。安臍中。以艾炙七壯。③服血藥不効者。用牡蠣粉。黃蘗草。等分為末。每服一錢。小茴香湯下。取効。

【五種淋症】勞淋。血淋。熱淋。氣淋。石淋。及小便不通。至甚者。透格散。用消石一兩。不夾泥土。雪白者。生研為末。每服二錢。各依湯使。勞淋。勞倦虛損。小便不出。小腹急痛。葵子未煎湯下。通後便須服補氣丸散。小便不出。時下血。疼痛滿急。熱淋。小便便熱赤色。臍下急痛。並用冷水調下。氣淋。小腹滿急。尿後常有餘瀝。不通煎湯下。石淋。莖肉痛。尿不能出。內引小腹膨脹急痛。尿下砂石。令人悶絕。將藥末先入銚內。隔紙炒至紙焦為度。再研用溫水調下。小便不通。小麥湯下。卒患諸淋。只以冷水下。並空心調藥。使消如水。乃服之。②芋麻根。兩莖打碎。以水一

盞。半煎。半盞。頓服。即通。大妙。③赤藤。即做草鞋者。白茯苓。芋麻根。等分為末。百沸湯下。每服一錢。如神。④石魚頭。石十四個。當歸等分為末。水二升。煮一升。頓服。愈。

【砂石淋痛】小便澀痛。用黃爛浮石為末。每服二錢。生甘草煎湯調服。②馬蘭花七枚。燒故筆頭二枚。燒粟米一合。炒為末。每服二錢。酒下。日二服。名退神散。③小便淋痛。或尿血。或砂石脹痛。用川牛膝一兩。水一盞。煎一盞。溫服。一婦患此十年。服之得効。土牛膝亦可。或入麝香。乳香。尤良。④小便淋瀝。沙石痛。不可忍。用玉蜀黍根葉煎湯。頻飲。⑤痛不可忍。用薏苡仁子葉根。皆可用水煎熱飲。夏月冷飲。以通為度。⑥疼不可忍。用蘿蔔切片。蜜浸少時。炙乾。數次。不可過焦。細嚼。鹽湯下。日三服。

【石淋破血】浮石。滿一手為末。以水三升。酢一升。和煮。二升。澄清。每服一升。②牛角燒灰。酒服。方寸匕。日五服。③小便石淋。石淋。取細白河沙三升。燒熱。以酒三升。淋汁。服一合。日再服。④宜破血。瞿麥子。搗為末。酒服。方寸匕。日三服。三日當下石。⑤車前子二升。以絹袋盛。水八升。煮取三升。服之。須臾石下。⑥桃木膠。如棗大。夏月冷水二合。冬以湯三合。和服。日三服。當下石。石盡即止。⑦便中有石子者。胡桃肉一升。細米煮漿粥一升。相和。頓服。

【小便石淋】石淋。取細白河沙三升。燒熱。以酒三升。淋汁。服一合。日再服。④宜破血。瞿麥子。搗為末。酒服。方寸匕。日三服。三日當下石。⑤車前子二升。以絹袋盛。水八升。煮取三升。服之。須臾石下。⑥桃木膠。如棗大。夏月冷水二合。冬以湯三合。和服。日三服。當下石。石盡即止。⑦便中有石子者。胡桃肉一升。細米煮漿粥一升。相和。頓服。

即癰。⑥雞矢白日中半乾炒香為末。以酸漿飲服方寸匕。日二。當下石出。

【小便氣淋】臍痛。鹽和醋服之。②結澀不通。白芷醋浸焙乾。二兩為末。煎木通甘草酒調下一錢。連進二服。③雞

腸草三兩。石韋去毛一兩。每用三錢。水一盞煎服。

【血淋尿血】苦蕒菜一把。酒水各半煎服。

【血淋熱痛】黃芩一兩。水煎熱服。②白薇芍藥各一兩為末。酒服方寸匕。日三服。③蓮房燒存性為末。入麝香少

許。每服二錢半。米飲調下。日二。④痛不可忍。香附子陳

皮赤苓等分。水煎服。⑤芋根煎湯頻服大妙。亦治諸淋。

⑥芭蕉根旱蓮草各等分。水煎服。日二。⑦生地黃汁車

前葉汁各三合。和煎服。⑧時珍曰。一男子血淋痛脹。祈

死。以藕汁調髮灰。每服二錢。服三日而血止痛除。

【血淋心煩】石燕子商陸赤小豆紅花等分為末。每服一

錢。葱白湯調下。

【男婦淋血】亦治五淋。多年煮酒瓶頭箬葉。三五年至十

年者尤佳。每用七個燒存性。入麝香少許。陳米飲下。日

三服。有人患此。二服愈。②用真百藥煎。車前子炒。黃連

各三錢半。木香二錢。滑石一錢為末。空心燈草湯服二

錢。日二服。

【老人血淋】車前五合。綿裹煮汁。入青梁米四合煮粥飲。汁亦能明目。引熱下行。

【熱淋血淋】不拘男女。用赤小豆三合。慢炒為末。煨葱

莖搗酒熱調三錢服。

【小便熱淋】白茅根四升。水一斗五升。煮取五升。適冷暖

飲之。日三服。③海金沙草陰乾為末。煎生甘草湯調服

二錢。一加滑石。④馬齒莧汁服之。⑤生藕汁生地黃汁

葡萄汁各等分。每服半盞。入蜜溫服。

【男女淋疾】自取爪甲燒灰水服。②野葡萄根七錢。葛根

三錢。水一鐘。煎七分。入童便三分。空心溫服。

【熱淋如血】蚕種燒灰。入麝香少許。水服二錢。極効方也。

【小便淋瀝】生續斷搗絞汁服。即馬薊根也。③皂絲子煮

汁飲。④或有或無。用大蒜一個。紙包煨熱。露一夜。空心

新水飲下。⑤琥珀為末。二錢。麝香少許。白湯服之。或萱

草煎湯服。老人虛人。以人參湯下。亦可。蜜丸。以赤茯苓

湯下。

【小便渾濁】如精狀。木香沒藥當歸等分為末。以刺棘心

自然汁和丸。梧子大。每食前鹽湯下三十丸。

【急淋陰腫】泥葱半斤。煨熱。杵爛。貼臍上。

【冷淋莖痛】柶葉研末。每服三錢。水一盞。葱白七寸。煎六

分去滓。食前溫服。日二。

婦人患淋 一婦人患淋臥久。諸藥不効。以王不留行十餘葉煎湯服。次日病減八分。再服而愈。

熱淋莖痛 麻皮一兩。炙甘草三分。水二盞煎一盞服。日

二取効。③葡萄搗取自然汁。生藕搗取自然汁。生地黃搗取自然汁。白蜜各五合。每服一盞。石器溫服。

老人病淋 身體熱甚。車前子五合。綿裹煮汁。入青粱米

四合煮粥食。常服明目。③身熱腹滿。小麥一升。通草二兩。水三升煮一升。飲之即愈。③青豆二升。橘皮二兩。煮

豆粥下麻子汁一升。空心漸食之。併飲其汁甚驗。

妊娠患淋 冬葵子一升。水三升煮二升分服。③車前子

五兩。葵根切一升。以水五升煎取一升半。分三服。以利為度。

膏淋如油 海金沙滑石各一兩。甘州稍二錢半為末。每

服二錢。麥門冬煎湯服。日二次。③葦草搗生汁三升。酢二合合和頓服。當尿下白汁。

腎消膏淋 病在下焦。苦楝子茴香等分炒為末。每溫酒

服一錢。③男女虛損。腎衰陰痿。夢中失精。遺溺白濁。疝

瘕不可闕也。隣家一男子。小便數十次如稠米泔。心神恍惚。瘦瘁食減。得之女勞。合服桑螵蛸散。藥未終一劑。

而愈。其藥安神。魂定。心志治健忘。補心氣。止小便數。用桑螵蛸遠志龍骨菖蒲人參茯神當歸龜甲醋炙各

兩為末。卧時人參湯調下二錢。如無桑上者。即用他樹

者。以炙桑白皮佐之。桑白皮行水。以接螵蛸就腎經也。

③羊骨燒研。榆白皮煎湯服二錢。

淋癰溺血 取乳香中夾舌者研細。米飲服一錢。

胞轉淋閉 阿膠三兩。水二升煮七合溫服。

尿血不定 鬱金末一兩。葱白一握。水一盞煎至三合溫服。日三服。

小便尿血 茅根煎湯頻飲為佳。③香附子新地榆等分

各煎湯。先服香附子湯三五呷。後服地榆湯。至盡未効。再服。③益母草搗汁服一升立瘳。④吐血及耳鼻出血。生地黃汁半升。生薑汁半合。蜜一合和服。⑤萬苣菜搗

傅臍上甚効。⑥柏葉黃連焙研。酒服三錢。

下焦結熱 小便淋瀝。或有血出。或大小便出血。瞿麥穗

一兩。甘草炙七錢五分。山梔子仁炒半兩為末。每服七錢。連翹蔥頭七個。燈心五十莖。生薑五片。水二盞煎至

七分時時溫服。

小便血條 淡豆豉一撮煎湯空腹服。或入酒服。③勞傷

溺血茅根乾姜等分。入蜜一匙。水二鐘煎一鐘日一服。