

七
卷十九——二十一



沈氏尊生書卷十九

雜病源流犀燭內傷外感門

春溫病源流

沈金鑄撰

春溫少陰病也。仲景何以言太陽。以太陽與少陰相表裏。就其發熱言之。故曰太陽。而邪之所傷者。實少陰也。經曰。冬傷於寒。春必病溫。又曰。冬不藏精。春必病溫。夫邪之所勝。其氣必虛。不藏精矣。有不虛乎。少陰主精。其精不藏。則虛者非少陰乎。特以冬時寒水主令。少陰氣旺。寒雖傷之。未便發泄。至春少陽司令。木旺水虧。不足供其滋溉。所鬱之邪。向之乘虛而入者。令則乘虛而發。木燥火炎。乘太陽之氣。蒸於內。故所傷雖寒。所病則溫。是以春溫雖太陽少陽少陰三經俱有之病。而其原則專屬少陰也。仲景復言太少合病。以發熱不惡寒。兼見胃弱。胸滿也。復言三陽合病。以脈大為陽明。多眠為熱聚少陽也。其發熱而不惡寒者。以寒鬱營間。久則反熱。熱自內發。無表證也。然此其定理也。亦有寒邪將發之時。復感風邪者。不先頭痛。或先惡寒。而後熱。此新邪引舊邪也。或往來寒熱。頭痛嘔吐。稍愈後。渾身壯熱。此正氣又虛。伏邪更重也。無外證宜黃芩湯為主兼外證以柴胡或本經藥以輕解切不可汗。故仲景曰。發汗已。身灼熱者。名曰風溫。言誤用辛熱。既辛散以利其陰。復增熱以助其陽。故熱甚脈浮。遂成危證也。誤下誤火亦危。總宜以涼解為主。夫所傷者寒。所發者熱。而曰溫何也。蓋冬之傷寒。必先天氣溫。暖開發腠理。忽然寒氣襲之。故受傷。又以所傷不甚。故不即病。乘少陰之虛。而伏於其經。至春木旺。其氣溫和。復熱尚遠。故所發之病。不得仍謂之寒。不得遂謂之熱。而謂之溫也。適當春時。故謂之春溫也。茲據仲景傷寒論中所及溫病而條疏之。仲景曰。太陽病。發熱而渴。不惡寒者。為溫病。蓋以邪自內發。表裏俱熱。津液必耗。故渴。內方喜寒。故不惡寒。三四日後。或腹滿。或不利者。皆由熱也。未顯他經之證。故曰太陽。以與少陰為表裏。邪之伏既在少陰。裏邪之發。自在太陽。表也。仲景又曰。若汗發已。身灼熱者。名曰風溫。風溫為病。脈陰陽俱浮。自汗出。身重多眠。鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視失溲。若被火者。微發黃色。劇則如驚。時瘧。癰。若火重之一逆尚引。

宜大柴胡湯雙解散

旁痛寒熱口苦者。宜小柴胡湯去參半薑有治脈微緊兼惡寒頭痛者。宜梔子豉湯或五苓散有治暴感外邪頭痛如破者。宜葛根湯或白湯邪有治熱在上焦脈洪大而數外熱譫妄者。宜三黃湯有治應下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

證下後熱不去或暫解復熱須再下者。宜承氣湯有治下後熱不止脈澀咽痛胸滿多汗熱傷血分宜吐者。宜瓜蒂散

病求浮緊之脈亦疎矣。其脈法有如此者。夏熱病脈亦同此看法。周氏謂載溫病治法最善。故此篇多採用之。

脈法 靈樞曰。尺膚熱甚。脈盛躁者。病溫也。脈訣曰。陰陽俱盛。病熱之極。浮之而滑。沉之散澀。溫

病脈散於諸經。各隨所在。不可指名。脈法曰。溫病二三日。身熱腹滿頭痛。食飲如故。脈直而疾。八日

死。溫病四五日。頭痛腹滿而吐。脈來細而強。十二日死。溫病八九日。頭身不痛。目不赤。色不變。而反利

脈來澀。按之不足。舉之却大。心下堅。十七日死。溫病汗不出。出不至足者死。醫鑑曰。溫病後。僕大熱

脈細小者死。溫病下利腹中痛者死。證也。

溫病原由證治 丹溪曰。夏至前發為溫病。夏至後發為熱病。謂之伏氣。傷寒所謂冬傷於寒。春必病

溫是也。正傳曰。溫病初證。未知端的。先以荊防敗毒散治之。看歸在何經。隨經施治。又曰。治法切不

可作傷寒正治。而大汗大下。但當從乎中治。而用少陽之小柴胡湯。陽明之升麻葛根湯。如減治之。

陶節菴曰。問曰。傷寒溫病。何以為辨。答曰。溫病於冬時感寒所得也。至春變為溫病耳。傷寒汗下不愈

而過經。其證尚在而不除者。亦溫病也。經云。溫病之脈行在諸經。不知何經之動。隨其經之所在而取

之。如太陽病頭疼。惡寒汗下後。過經不愈。診得尺寸俱浮者。太陽病溫也。如目疼。惡寒身熱汗下後。過

經不愈。診得尺寸俱長者。陽明病溫也。如胸脇痛。汗下後。過經不愈。診得尺寸俱弦者。少陽病溫也。如

腹滿嘔乾。過經不愈。診得尺寸俱沉細者。太陰病溫也。如口燥舌乾而渴。過經不愈。診得尺寸俱沉者。

少陰病溫也。如煩滿囊縮。過經不愈。診得尺寸俱微緩者。厥陰病溫也。是故隨其經而取之。隨其證而

治之。如發斑乃溫毒也。又曰。治溫大抵不宜發汗。過時而發。不在表也。已經汗下。亦不在表也。經曰。不

惡寒而反渴者。溫病也。蓋其熱自內達外。無表證明矣。又曰。溫毒者。冬月感寒毒氣。至春始發也。表

證未罷。毒氣未散。故有發斑之候。心下煩悶。嘔吐欬嗽。後必下利。寸脈洪數。尺脈實大。為病則重。以陽

氣盛故耳。通用元參升麻湯以治之。周禹載曰。二陽搏。病溫者。死不治。雖未入陰。不過十日死。二陽

者。少陽陽明也。又曰。溫病發於三陰。脈微足冷者。難治。又曰。溫病大熱。脈反細小。手足逆冷者。死。又曰。

溫病初起大熱目昏譫語脈小足冷五六日而脈反躁急嘔吐昏沉失血瘧瘧。古本焦黑脈促結代小者皆死。又曰溫病汗後反熱脈反盛者死。又曰溫病誤發汗狂言不能食脈反躁盛者皆不治。葉天士云曰冬傷於寒春必病溫者重在冬不藏精也。蓋煩勞多慾之人陰精久耗入春則裏氣大泄木火內然強陽無制燔燎之勢直從裏發始見必壯熱煩渴口乾舌燥之候矣。故主治以存精液為第一。黃芩湯堅陰却邪即此義也。再者內之溫邪欲發在外之新邪又加葱豉湯最為提促表分可以肅清。又曰風溫者風為天之陽氣溫乃化熱之邪兩陽重灼先傷上焦種種變幻情狀不外乎三陰為病數頭脹汗出身熱欬嗽必然並見當與辛涼輕劑清解為先大忌辛溫消散劫燥清津。太陰無肅化之權救逆則有蔗漿蘆根玉竹門冬之類也。又忌苦寒沉降損傷胃口。陽明頓失循序之司救逆則有腹脹連中之類也。大凡此證驟變則為痙厥緩變則為虛勞其主治之方總以甘藥為要或兼寒或兼溫在分通變可也。

治春溫病方二十九

黃芩湯主方 黃芩三兩 炙甘草二兩 白芍各二兩 大棗十二枚 擘碎

黃芩加半夏生薑湯治嘔吐 黃芩三兩 炙甘草二兩 白芍各二兩 大棗十二枚 擘碎 半夏半升 生薑一

洗一收熱去而利自止也 甘草湯治大熱 甘草二兩

桔梗湯治喉痛 桔梗一兩 甘草一兩 此方用桔

黃連阿膠湯治心煩 黃連二兩 阿膠一兩 此方用

小柴胡湯治三陽 柴胡半斤 黃芩二兩 白芍二兩 半夏半升 生薑一

大柴胡湯治心煩 柴胡半斤 黃芩二兩 白芍二兩 半夏半升 生薑一

大承氣湯治心煩 大黃四兩 芒硝三升 枳實五枚 芍藥五

大承氣湯治心煩 大黃四兩 芒硝三升 枳實五枚 芍藥五

雙解散 三陽 黃芩 結梗各一兩 炙甘草二兩 薄荷 當歸 白芍 大黃 芒硝各五錢 石膏

取末三錢加生薑三片煎

梔子豉湯 惡寒頭痛 山梔十四枚 香豉四錢 綿裹煨

益元散 甘草 滑石

涼膈散 各二錢 連翹 白芷 炙甘草五分 黃芩 大棗一枚 芒硝

萬根葱白湯 暴感 川芎二錢 去葛根 加白芍 大棗名 增損 葛根 葱白 湯能治感冒頭痛

三黃石膏湯 三焦熱 葱白二 黃芩 黃連 澄清地 煎水煎服 半日許 不出汗再服 石膏 五錢 麻黃六分 杏仁 三錢

縮去疎麻黃 加大黃芒硝 節菴殺車梔法加細茶一攪

葶藶苦酒湯 血熱 葶藶三錢 搗研 水煎作 苦酒三合 取汁為度

小承氣湯 腹滿 厚朴 大黃

調胃承氣湯 厚朴 大黃 芒硝

黃連解毒湯 煩渴 黃連 山梔各錢半 黃芩

葶藶湯 風溫 葶藶一錢 杏仁 石膏二錢 白薇 麻黃 川芎 葛根

麻黃升麻湯 發汗 麻黃 升麻 石膏 乾薑 白芍 此條正方如欲借治誤汗風溫須去二麻薑朮用以收汗愈 茯苓

陽旦湯 冬溫 桂枝 白芍 甘草 枳實 茯苓 一麻黃 石膏 一厚朴

升麻葛根湯 發斑 升麻 葛根 芍藥 甘草 一錢半

犀角黑參湯 犀角 黑參 人參 升麻 甘草

黃芩加生薑湯 溫瘧 黃芩 大棗 生薑

人參白虎湯 又

犀角大青湯 斑不透 犀角 大青 元參 升麻 黃連 黃芩 黃柏 山梔 外感 春溫方



北京中醫藥大學圖書館版權所有

犀角地黃湯斑色紫 犀角 扁柏汁 磨金磨汁 丹皮 加鵝節汁 磨活 羌活 獨活 柴胡 前胡 風各一錢 人參 甘草 五分

荆防敗毒散溫病初起 枳殼 荆芥 川芎 防風 各一錢 人參 甘草 五分

夏熱病源流

夏熱少陰病也。經曰：冬傷於寒，夏必病熱。則知熱病之由於伏寒。與春溫同。熱病之伏寒，伏於少陰。春溫同也。春溫之寒，傷於冬而發於春。夏熱之寒，傷於冬而發於夏。同一伏寒，而發有異時者，有強弱邪有重輕，感觸有異故也。同一伏寒，發於春而病名溫，發於夏而病名熱者，以春氣溫，故病當其時亦曰溫。夏氣熱，故病當其時亦曰熱也。春溫之伏寒，伏於少陰而發，必由於少陽。以當春而病，少陽司令，故少陽即為伏寒所出之途。夏熱之伏寒，伏於少陰而發，則由於陽明。以當夏而病，陽明司令，故陽明即為伏寒所出之途也。至兼見之經不一。溫與熱病同。溫病主方用黃芩湯，以熱尚淺，不必大為滌蕩也。熱病主方用白虎湯，以熱更熾，故必重為清肅也。春溫之外，有不必盡由伏寒，由現感春時之邪而病，亦名溫者。夏熱之外，亦有不必盡由伏寒，由現感夏時之邪而病，亦名熱者。春溫本自內達外，無表證有表者，為重感熱邪。治法必先撤外風邪。治法必先撤外邪。而後用黃芩湯。夏熱亦自內達外，無表證有表者，為重感熱邪。治法亦必先撤外邪。而後用白虎湯。此春溫夏熱固為異病而同源也。茲據仲景傷寒書之言，熱病者，諄為論仲景曰：傷寒脈浮滑，此表有熱，裏有寒。白虎湯主之。蓋以浮為風脈，知不獨傷於寒矣。滑為裏熱，滑且浮，知不獨熱在裏矣。故表有熱，不言裏而裏之熱可知。裏有寒，乃所以發熱之由。雖言裏寒，而表裏之皆熱可知。故非白虎湯不能治也。仲景又曰：三陽合病，腹滿身重，難以轉側，口不仁而面垢，譫語遺尿，發汗則譫語下之則額上生汗，手足逆冷。若自汗出者，白虎湯主之。蓋以腹滿熱本病也，身重又濕病也，口不仁等，又陽病也。此因中暑濕，引動伏寒，齊出為病。故曰三陽也。如此熱勢自劇，故不可汗而致津液外亡，不可下而致陰竭於下。陽脫於上，故必仍自汗，方可用白虎。若誤汗下而證如上，不得專用白虎也。值人參、甘草、五分，傷寒脈滑而厥者，裏有熱也。白虎湯主之。蓋以滑者，邪實也。而乃曰厥是熱深厥深之謂。故曰裏有熱，仲景

又曰傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之蓋以熱病無不發熱汗出者今脈浮無汗風邪襲表矣故必先辛涼解表然後熱可治渴欲飲邪耗津液也無表證邪已解也然其時元必虛矣故必加人參仲景又曰傷寒無大熱口渴渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之蓋以熱病無不燥渴且煩者乃曰無大熱以背微惡寒也背為太陽經位惡寒必正氣虛矣故必加人參仲景又曰陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則燥心憤憤反譫語若加燒針必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎滑者梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之蓋以熱病而見傷寒浮緊之脈以本由伏寒止發於夏故反惡熱不惡寒而為熱病也腹滿等皆陽明證以本由少陰之伏寒故特見咽燥之本證也緊而兼浮其重襲風邪可知若其時兼用梔子豉頭解外繼用白虎治本得其法矣倘誤汗以耗液誤燒針以燥血誤下以亡陰自必變生諸證漸至難救觀古上胎滑外邪尚在可知渴而口乾舌燥外邪內入可知故必用梔豉白虎二湯也其加人參以誤治必傷液也若脈浮云云則浮為虛而熱已入膀胱矣治以猪苓湯者此之小便不利由於血分故以阿膠補虛滑石洩熱非如傷寒之便不利由於氣分必用白朮等也仲景又曰陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便也蓋以汗多之故而不用猪苓因津液之耗不可再洩也值處驂仲景又曰傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之蓋以誤為吐下而熱邪不但不衰反為更甚故陽外虛而惡風陰內亡而燥煩大渴故非本湯不可仲景又曰服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之蓋以誤認為風而妄投辛熱之藥津液竭矣故有如是之證而必當用本湯也以上皆仲景妙法無可易者其言熱病而皆冠以傷寒何歟蓋以熱病由於冬月傷寒之伏邪雖發出而為熱病其原實由於寒故冠以傷寒字追其始也其治法以白虎湯為主者又以熱病自下發上自內發外必經陽明陽明必以石膏之

辛涼乘勢升散知母之苦寒清少陰伏邪之原甘草粳米調養中州良為妙法今人不明此旨誤以白虎

治傷寒既非表藥又非下藥不大謬乎總緣不知熱病之為熱病傷寒之為傷寒故冒昧若此也蓋所謂

熱病者其時必夏至後炎暑司令相火用事之時也其證則止發熱身痛而不惡寒但大熱而不大渴之

證也傷寒之時宜其時乎傷寒之證宣如是證乎故益知仲景之法之妙也然而熱病之為證更有可證

列者如熱病脈應洪大反見浮緊是又感夏時暴寒其實內伏已發故浮之則緊若重按則應仍洪盛也

宜通解散去麻黃蒼木加芍白香豉或先以蓮鬚如熱病凡客邪所感不論脈浮脈緊惡風惡寒宜解不

宜解者有通治之法如桂枝散去芍黃或再加白木白如熱病兼飢兼喘藥必兼治如生白地膚皮喘如

粉厚朴如惡熱煩渴腹滿舌黃燥或黑乾五六日不大便須用下法宜涼膈散三如熱病又兼暑濕必兼

清暑濕宜涼膈散合並小便不利兼利水瀉竹葉石膏如熱病兼風痰須先用探吐再以涼藥熱飲被覆

取汗百無一損之法如探吐再盡劑服之如誤用辛溫藥致發斑喘滿謔語昏亂則解之宜黃連解毒

如屢下後熱勢猶盛不便再下或諸濕內盛小便黃澀大便溏小腹滿者欲作利也則解之宜黃連解毒

病之證治亦既備矣若夫神明其間勿致妄錯是在臨證時悉心辨之庶乎其可此篇亦開條周

脈法靈樞曰熱病脈靜汗已出脈盛一逆也死不治醫鑑曰熱病得汗脈安靜者生躁急者死及

大熱不去者亦死又曰熱病七八日當汗反不得汗脈絕者死宜與春溫脈法參看

夏熱原由證治丹溪曰夏至前發為溫病夏至後發為熱病謂之伏氣傷寒正傳曰治熱病切不

可作傷寒立治周禹載曰熱病七八日脈微小澀血口乾一日半而死脈代者一日死熱病七八日

脈不躁或躁不散數三日中有汗三日不汗四日死熱病已汗脈尚躁喘且復熱喘甚者必死熱病不

知痛處耳聾不能自收口乾陽熱甚陰頗有寒者熱在髓死不治熱病汗不出大額發赤噦者死熱病

洩甚而腹愈滿者死熱病目不明熱不已者死熱病汗不出嘔血下血者死熱病舌本爛熱不止者死

熱病咳而衄汗出不至足者死熱病熱而瘧者死腰折瘰癧齒禁斷也陶節菴曰冬月感寒不即病

熱病咳而衄汗出不至足者死熱病熱而瘧者死腰折瘰癧齒禁斷也陶節菴曰冬月感寒不即病

至春夏時其伏寒各隨時氣改變。為溫為熱者。因溫暑將發。又受暴寒。故春變為溫病。既病之後。不得復言其為寒矣。所以仲景有云。發熱不惡寒而渴者。其理可兼溫病也。暑病亦然。比之溫病。尤加熱也。不惡寒。則病非外來。渴則明其熱自內達。且無表證明矣。治溫暑。大抵不宜發汗。以過時而發。不在表也。其伏寒至夏。又感暴寒。變為暑病。暑病者。即熱病也。取夏火當權而言暑字。緣其溫熱二證。從冬時伏寒所化。總曰傷寒所發之時。既異。治之不可混也。若言四時俱是正傷寒者。非也。此二者皆用辛涼之劑以解之。若將冬時正傷寒藥通治之。定殺人矣。辛涼者。羌活沖和湯是也。

溫熱指歸

柯韻伯曰。內經論傷寒而反發熱者。有二義。有當時即發者。曰人傷於寒。即為病熱也。有

過時發熱者。曰冬傷於寒。春病必溫也。有隨時易名者。曰凡病傷寒而成溫者。先夏至日為病溫。後夏至日為病熱也。夫病溫熱。當時即病者。不必論。凡病傷寒而成者。雖由於冬時之傷寒。而根實種於其人之鬱火。內經曰。冬藏於精。春不病溫。此是冬傷於寒。春必病溫之源。先夏至為病溫。後夏至為病熱。申明冬不藏精。夏亦病溫之故。夫人傷於寒。則為病熱。其恒耳。此至冬夏而病者。以其人腎陽有餘。好行淫慾。不避寒冷。爾時雖外傷於寒。而陽氣足禦。但知身著寒。而不為寒所病。然表寒雖不得內侵。而虛寒亦不得外散。仍下陷入陰中。故身不知熱。而亦不發熱。所云陽病者。上行極而下也。冬時收藏之令。陽不遽發。寒愈久而陽愈匿。陽日盛而陰愈虛。若寒日少而蓄熱淺。則陽火應春氣而病溫。寒日多而鬱熱深。則陽火應夏氣而病熱。此陰消陽熾。從內而達於外也。叔和不知此義。謂寒毒藏於肌膚。至春變為溫病。夫寒傷於表。得熱則散。何以能藏。設無熱以禦之。必深入臟腑。何以止藏於肌膚。且能藏者不能變。何以時換而變其所藏乎。不知原其人之自傷。而但咎其時之外傷。只知傷寒之因。不究熱傷其本。妄擬寒毒之能變熱。不知內陷之陽邪。發見其本來面目也。又謂辛苦之人。春夏多溫熱病。皆因冬時觸寒所致。而非時行之氣。不知辛苦。動搖筋骨。凡動則為陽。往往觸寒即散。或因饑寒而病者。有之。或因勞倦而發熱者。有之。故春夏因虛而感。時行之氣者。不少矣。若夫春夏溫熱。由冬時觸寒所

致者。偏在飽暖淫慾之人。不知持滿竭津耗真陽。強不能容。精失守而陰虛。故遺禍至春夏也。內經論之脈證治法甚詳。學者多不得其要領。仲景獨挈發熱而渴不惡寒為提綱。洞悉溫病之底蘊。今內經冬不藏精之指熱論以口燥舌乾而渴屬少陰。少陰者封蟄之本。精之處也。少陰之表名曰太陽。太陽根起於至陰。名曰陰中之陽。故太陽病當惡寒。此發熱而不惡寒。是陽中無陰矣。而即見少陰之渴。太陽之根本未虛露矣。於此見逆冬氣。則少陰不藏。腎氣獨沉。孤陽無附。而發為溫病也。溫病證治散見六經。如傷寒發熱不渴。服湯已渴者。是傷寒溫病之關鍵。去而執罷。即傷寒欲解證。寒去而熱不解。是溫病發見矣。如服桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脈洪大者。即是溫熱。猶擬用白虎加人參預保元氣。於清火之時。是凡病傷寒而成溫者之正法也。因所傷之寒邪隨大汗而解。所成之溫邪隨大汗而發。焉得不虛設。不如參則熱邪因白虎而歸。安得寒邪不因白虎而來耶。是傷寒者當補。治病必求其本。其如服柴胡湯已渴者。屬陽明也。以法治之。夫柴胡湯有參甘芍藥。皆生津之品。服已反渴。是微寒之劑不足以解溫邪。少陽相火直走陽明也。是當用白虎加人參法。若柴胡加人參法。非其治矣。夫相火寄甲乙之間。故膽肝為發溫之原。腸胃為市。故陽明為成溫之藪。若夫溫熱不因傷寒而致者。只須扶陰抑陽。不必補中益氣矣。且溫邪有淺深。治法有輕重。如陽明病脈浮發熱渴飲水。小便不利者。諸苓湯主之。發熱在裏不得越身體發黃。刻欲飲水。小便不利者。茵陳湯主之。少陰病得之二三日。咽燥口乾者。大承氣湯急下之。厥陰病下利欲飲水者。白頭翁湯主之。此仲景治溫之大畧也。夫溫與熱偶感天氣而病者。輕因不藏精者。其病重。此為自傷。若再感風土之異氣。此三氣相合而成溫疫也。溫熱利害。只在一人。溫疫移害。禍延隣里。今人不分溫熱溫疫。渾名溫病。令人惡聞。以辭害義矣。吳又可溫疫論。程郊倩熱病註。俱有至理。愚不必復贅。按此篇原本溫熱俱作溫暑。以熱病當暑而發。故即言暑。開者不至。混淆耳。非中暑傷暑之暑病。其實夏熱病也。今暑字俱改作熱。欲令

治夏熱病方十一

白虎湯甘草 石膏 粳米 和母

人參白虎湯通治 甘草 石膏 粳米

通解散鹹寒 麻黃 甘草 石膏 滑石

連翹白香豉湯水煎 連翹 白香豉 生薑

雙解散宣解 防風 麻黃 川芎 甘草 薄荷 當歸 山梔 各二兩 芒硝 各五錢 每服末三錢

三片薑

涼膈散芒硝 各二錢 連翹 山梔 仁 白芍 黃芩 大黃

三乙承氣湯厚朴 枳實 芒硝 甘草

天水散暑濕

竹葉石膏湯利水 竹葉 石膏 粳米

黃連解毒湯黃連 山梔 各錢半 黃芩 蒼朮 生地

羌活沖和湯細辛 白芷 黃芩 蒼朮 生地

濕溫證源流

濕溫暑濕病也。活人書所謂先傷於濕，又中於暑是也。蓋中暑則速濕，濕則緩固，知先受濕而後中暑也。濕因暑邪遏抑陽氣，故必脘冷腹滿，暑挾濕邪，鬱蒸為熱，故必頭痛，妄言多汗，其脈陽濡而弱，陰小而急。浮為陽，沉為陰也。濕傷血故沉按之則陰脈小，而急暑傷氣故浮，候之則陽脈濡而弱也。凡濕溫證，切不可發汗。汗之名重暈，必死。白虎湯如有寒熱外邪，必加辛涼解表之藥一二味，如濕氣勝，一身盡痛，小便不利，大便反快，急宜祛濕，如蒼朮、白虎湯，如有寒物停滯，及中寒則宜溫之，必小便清，自然後可。如赤澀而少，斷不可溫，宜針氣，香薷飲清。王宇泰曰：昔人治濕溫，通身皆潤，足冷至膝下，腹滿不省人事，六脈皆小弱而急，問所服皆陰病藥，此非病本重，乃藥令病重耳。以五苓合白虎十餘劑，少甦，更與清燥湯調理。



而安。凡陰病厥冷。兩臂皆冷。令腔冷臂不冷。則非下厥上行。故知非陽微寒厥。而合用祛熱藥也。

脈法 仲景曰。太陽病。關節痠痛而煩。脈沉而細者。此名中濕。亦曰濕痺。其候小便不利。大便反快。但

當利其小便。陶節菴曰。濕溫之脈寸濡而弱。尺小而急。

濕溫證治 活人書曰。濕溫與中暑同。但身涼不渴耳。本事方曰。一人季夏得病。胸項多汗。兩足逆

冷。謔語。予診之。其脈關前濡。關後數。是濕溫。蓋先傷暑。後受濕也。先用人參白虎湯。次服蒼朮白虎湯。

足漸溫。汗漸止。三日而愈。方廣曰。冒暑遭雨。暑濕鬱發。四肢不仁。或半身不遂。或入浴暈倒。口眼喎

斜。手足不仁。皆濕溫類也。宜苓朮湯。茯苓白朮湯。陶節菴曰。素傷於濕。因時中暑。濕與熱搏。即為濕

溫。其人胸腹滿。身痛壯熱。妄言自汗。兩脰疼。倦怠惡寒。若發其汗。使人不能言。且聾。不知痛處。其身青

面色變。是醫之殺人。也。華氏醫案曰。病起旬日。猶然頭脹漸至耳聾。正如內經所云。因於濕首如裹。

此呃忒鼻衄。皆邪混氣之象。況舌色帶白。咽喉欲閉。邪阻上竅。空虛之所。諒非苦寒直入胃中。可以治

病。病名濕溫。不能自解。即有昏痙之變。醫莫泛稱時氣而已。宜連翹銀花牛蒡子馬勃射干金汁。又曰。

體壯有濕。近長夏陰雨潮濕。著於經絡。身痛自利。發熱。仲景言濕家大忌發汗。之則變痙。厥來小

弱而緩。濕邪凝遏。陽氣病。名濕溫。濕中熱氣。橫沖心包。絡以致神昏。四肢不煖。亦手厥陰見證。非與傷

寒同法也。宜犀角連翹心元參石葛銀花野赤豆皮煎送至寶丹。

治濕溫方二十二

蒼朮白虎湯 總治 知母 蒼朮 石膏 粳米

十味香如飲 木瓜 香茹 扁豆 厚朴 茯苓 甘草

清暑益氣湯 神麴 人參 黃柏 甘草 黃耆 陳皮 酒當歸 白朮 麥冬 五味子 青皮 陳皮

天水散 散肺 滑石 六兩 許名碧玉散 能涼肝 加硃砂少許 名益元散 能清心

五苓散 茯苓 白朮 澤瀉

南京中医药大学图书馆版权所有

陽毒發斑陽邪亢極病也亦或有誤服辛熱而成者金匱云陽毒之為病面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治升麻鼈甲湯主之此陽毒之病所以昭揭於千古也蓋以人傷寒皆為熱病然邪在陽經久而熾盛則為毒故有陽毒之病其始陽熱之氣滯於榮衛之間因而結聚於胃上冲咽喉上焦之熱極矣而肝脾之陰於是不交其發現也而為陽明之氣所注火熱盛故面斑如錦咽與喉雖有陰陽之分為火熱所冲故痛則俱痛心本主血陽經熱盛心火并之故化為膿唾者因其病在上焦也夫陽邪成毒其為病本非傷寒傳經之比然經脈遞運五日經氣未徧猶為可治至於七日陰陽經氣已週而再行矣安可治乎仲景用升麻合生甘草以升陽散熱為君雄黃解毒為臣鼈甲當歸以理肝陰為佐蜀椒以宣導熱邪為使其製方之法實因熱邪與氣血相搏不容直折故病雖見於陽反以陰法救之並罪陽毒起於陰經而用鼈甲之陰藥也況古人云病在陽者必兼和其陰此仲景於陽毒而用鼈甲之旨乎然而病之由來其端不一又有虛熱熾甚而毒不化者宜陽毒初起湯便結去射干加又有吐下未當邪陷於內而壯熱頭項強痛燥悶不安或狂言譫妄見妄聞或亦面生斑紋口唾膿血或並舌卷焦黑鼻如烟煤或更下利黃赤六脈洪大而數者宜犀角黑參湯切不可用下藥勢甚者以青布浸冷水搭病人胸膈必喜熱即易之須臾得睡

陽毒證治 醫鑑曰三陽病深必變為陽毒或有失於汗下或本陽證誤用熱藥使熱毒陷深發為狂亂面赤眼紅身發斑黃宜黑奴丸三黃石膏湯消斑青黛飲 陶節菴曰傷寒先觀兩目或赤或黃赤為陽毒脈洪大有力燥渴者輕則三黃石膏湯三黃巨勝湯重則大承氣湯下之醫鑑節菴二則皆是傷寒中之病本各不同然方藥亦有可用者故亦附載于此

陰毒發斑陰邪深極病也金匱曰陰毒之為病面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒主之此又陰毒之病所以昭揭於千古也蓋陰毒云者乃寒邪直中陰經久而不解斯成毒也雖然直中陰經究何經歟實中於腎也中於腎遂浸淫及於肝脾也故面目為肝脾之精所布