

內臺方議

順宜堂藏板

金鏡內臺方議序

醫道與儒道通素問起於軒黃難經起於秦越猶  
之經也醫方始於張仲景猶之傳也漢唐以後青  
囊一術各標識解猶之註疏也膠柱刻舟者依畫  
樣之臨摹翻案倒局者哆金針之暗渡於是有過  
高者出謂方書可付龍祖曰醫者意也夫以意爲  
文猶自誤以意爲方則誤人方可廢乎但釋方與  
用方者不免毘於陰陽耳仲景之有內臺方也人

盡習之至建安許宏之有方議未流傳也余得而  
諦觀之虛實強弱有稟燥濕寒熱有氣君臣佐使  
有序因革損益有宜大都問答彷彿之素問釋疑彷彿  
之難經令不知醫者自病自藥簡方俱可無誤令  
深於醫者鑑輕重權衡毫釐千里之辨不敢輕下  
一七譬之解經者訂註疏之訛亦補經傳之缺以  
仁術生人較之以學術殺人者不大有補於世哉  
信醫道之通於儒也而余尤念醫道之通於治蓋

亦有脉與治焉元氣神氣張弛各以其時猶之治  
本治標緩急一隨其候若外邪宜用治標法而反  
泄神氣以填之內虛宜用治本法而反弛神氣以  
潰之恐望氣察色俞跗已却走矣信惟具醫國全  
副精神達權通變固壽元於消息之微轉生機於  
呼吸之介而後旺者不衰衰者可旺伊耆世界將  
復見之則余之流傳此方議并載穴道經絡圖以  
當隔垣之視也豈直以醫道哉然儒者而知此醫

道也於治道思過半矣

西蜀馮士仁題

金鏡內臺方議目錄

卷之一

治傷寒湯方一百一道

桂枝湯一

桂枝加葛根湯二

桂枝加厚朴杏子湯三

桂枝加附子湯四

桂枝去芍藥湯五

桂枝去芍藥加附子湯

六

桂枝麻黃各半湯七

桂枝二麻黃一湯八

桂枝去桂加苓朮湯九

桂枝新加湯 十

桂枝加桂湯 十一

桂枝加芍藥湯 十二

桂枝加大黃湯 十三

桂枝越婢湯 十四

桂枝甘草湯 十五

桂枝救逆湯 十六

桂枝龍骨牡蠣湯 十七

桂枝人參湯 十八

桂枝附子湯 十九

卷之二

麻黃湯 二十

麻黃杏子湯 二十一

麻黃連翹赤小豆湯 二十二

麻黃附子細辛湯二十  
麻黃附子甘草湯四十

麻黃升麻湯五十

卷之三

大青龍湯六十

小青龍湯七十

葛根湯八十

葛根黃連黃芩湯九十

葛根加半夏湯三十

白虎湯一

人參白虎湯二十

卷之四

小柴胡湯

三十

大柴胡湯

三十

柴胡桂枝湯

三十

柴胡桂薑湯

三十

柴胡加芒硝湯

三十

柴胡加龍骨牡蠣湯

三十

八

小建中湯

三十

卷之五

小承氣湯

四十

大承氣湯

四十

調胃承氣湯

四十

桃仁承氣湯

四十

小陷胸湯

四十

大陷胸湯

四十

抵當湯

四十  
六

十棗湯

四十  
七

卷之六

黃連瀉心湯

四十  
八

附子瀉心湯

四十  
九

半夏瀉心湯

五十

生薑瀉心湯

五十  
一

甘草瀉心湯

五十  
二

茯苓桂枝白朮甘草瀉心湯

五十  
三

茯苓桂枝甘草湯

五十  
四

黃芩湯

五十  
五

黃芩加半夏生薑湯

五十  
六

六

日錄

目錄

三

心導樓

抄本

卷之七

四逆湯 五十

四逆加人參湯 五十

當歸四逆湯 五十

當歸四逆加茱萸湯 六十

四逆加猪膽汁湯 六十

通脉四逆湯 六十

茯苓四逆湯 六十

白通湯 六十

白通加猪膽汁湯 六十

附子湯 六十

乾薑附子湯 六十

木附湯 六十

真武湯 六十

卷之八

梔子豉湯 七十

梔子厚朴湯 七十

梔子乾薑湯 七十

梔子生薑豉湯 七十

梔子甘草湯 七十

梔子柏皮湯 七十

厚朴薑夏草參湯 七十

旋覆代赭湯 七十

赤石脂禹餘糧湯 七十

吳茱萸湯 七十

猪苓湯 八十

卷之九

卷之九

卷之九

心導

甘草附子湯

一 八十

甘草乾薑湯

二 八十

芍藥甘草湯

三 八十

甘草湯

四 八十

炙甘草湯

五 八十

芍藥甘草附子湯

六 八十

茯苓甘草湯

七 八十

黃連湯

八 八十

黃連阿膠湯

九 八十

乾薑黃連人參湯

九十

卷之十

桃花湯

一 九十

猪膚湯

二 九十

桔梗湯

三 九十

苦酒湯

四 九十

白頭翁湯

九十

半夏散及湯

九十

枳實梔子湯

九十

竹葉石膏湯

九十

茵陳蒿湯

九十

蜜煎導方

一百

豬膽汁方

一百

卷之十一

治傷寒散方七道

五苓散

一百

四逆散

一百

瓜蒂散

一百

文蛤散

一百

白散

一百六

燒棍散

一百七

牡蠣澤瀉散

一百八

卷之十二

治傷寒丸方五道

理中丸

一百九

烏梅丸

一百十

大陷胸丸

一百十

抵當丸

一百十二

麻仁丸

一百十三

右傷寒內臺正方一百十三道皆張仲景所

述更欠少一方乃禹餘糧是也

附藥性品製

用葯加減法

論分兩

金鏡內臺方議卷之一

建安許宏集

古吳程永培校

桂枝湯

治自汗惡風頭疼體痛發熱脉浮緩名曰中風

桂枝

芍藥

各三兩

甘草

二兩

生薑

三兩

大棗

十二枚

右咬咀以水七升慢火煎至四升去滓適寒

温服一升服已須臾歎稀粥以助藥力以被