

济阴纲目



濟陰綱目卷之二

吳興 金德生閩風父輯著

金斗

張孫振公武父訂正

西陵 江 淇懔漪子箋釋

天都

查

望于周父參閱

○經閉

○論經閉由二陽之病治宜瀉心火養脾血

瀉心火養脾血是從本文之義愚謂當原隱曲推解益人有隱情曲意難以舒其衷者則氣鬱而不暢則心氣不開脾氣不化水穀日少不能變化氣血以人二陽之血海矣血海無餘所以不月也傳為風消者陽明主肌肉

氣上迫肺心氣不得下通故月事不來先服降心火之劑後服局
愈消也又經曰月事不來者胞脉閉也胞脉屬於心絡於胞中今
味不化則經不足故其病則不能隱曲脾土已虧則風邪勝而氣
胃熱也心脾受之心主血心病則血不流脾主味脾病則味不化
發心脾有不得隱曲故女子不月其傳為風消王啓玄註曰大腸
潔古曰女子月事不來者先瀉心火血自下也內經曰二陽之病

血不足則肌肉不榮其不消瘦平風之各火之化也故當根不得隱曲上看乃有本
宜方固有法然不必太泥因人易轍可也
據此論當有四證如胃熱包絡熱勞心熱三證皆有餘宜瀉火養血是矣而所言脾胃久虛致經水斷絕一症又當以

方中五補丸後以衛生湯治脾養血也

○論經閉不行有三治宜補血瀉火

東垣曰經閉不行有三婦人脾胃久虛形體羸弱氣血俱衰而致

經水斷絕不行或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脈

津液所化津液既絕為熱所燥肌肉漸瘦時見渴燥血海枯竭病

名曰血枯經絕宜瀉胃之燥熱補益氣血經自行矣此病或經適

行而有子子亦不成而為胎病者有矣此中焦胃熱結也或心包絡脈洪

數躁作時見大便秘澀小便雖清不利而經水閉絕不行此乃血

海乾枯宜調血脈除包絡中火邪而經自行矣此下焦胞脈熱結也或因勞

心心火上行月事不來者胞脈閉也胞脈者屬於心而絡於胞中

今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來宜安心補血瀉火經自



補脾胃為主
豈得捨而勿

行矣。此上焦心
肺熱結也

論耶。蓋水人
於經其血乃

婁氏曰。右東垣。潔古治血枯之法。皆主於補血。瀉火也。補血者。四

生穀入於胃
脈道乃行水

物之類。瀉火者。東垣分上中下。故火在中則善食消渴。治以調胃

去榮散穀消
衛亡况脾統

承氣之類。火在下則大小便秘澀。治以玉燭之類。玉燭者。四物與

諸經之血而

調胃承氣等分也。火在上則得於勞心。治以芩連及三和之類。三

以久虛之脾

和者。四物涼膈等分也。潔古先服降心火之劑者。蓋亦芩連三和

胃以致氣血

王燭之類。後服五補衛生者。亦補氣之劑也。

俱衰者可不
為之補益乎

○論經閉因肝勞血傷

即此以分虛
實明是四證

駱氏曰。經云。有病胸脇肢滿妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液

無疑而妻全
善乃遺補虛

先唾血。四肢清。目眩時時前後血。病名曰血枯。此年少時因大脫

一證何歟
此病机也宜

血。或醉而入房。虧損腎肝。蓋肝藏血。受天一之氣。以為滋榮。其經

知

胸脇滿證人皆伐肝豈知血枯之故宜養肝血也當須識此

既分肝脾當分兩治

發肝未發極

上貫膈布脇肋若脫血失精肝氣已傷肝血枯涸不榮而胸脇滿妨於食則肝病傳脾而聞腥臊臭出清液若以肝病而肺乘之則唾血四肢清目眩時前後血出皆肝血傷之症也

○論經閉因勞當大補脾胃

良方云婦人月水不通或因醉飽入房或因勞役過度或因吐血失血傷損肝脾但滋其化源其經自通若小便不利若頭眩痛腰背作痛足寒時痛久而血結於內變為癥瘕若血水相併脾胃虛弱壅滯不通變為水腫若脾氣衰弱不能制水漸漬肌肉變為腫滿當益其津液大補脾胃方可保生王節齋曰婦人女子經脉不行多有脾胃損傷而致者不可便認作經閉死血輕用通經破血之藥遇有此證便須審其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少



是伯有肝氣
鬱滯以致脾
土失運不能
化血者又須
和肝氣為要
學者知之

食惡食泄瀉疼痛或因誤服汗下攻剋藥傷其中氣以致血少而
不行者只宜補養脾胃用白朮為君茯苓芍藥為臣佐以黃芪甘
草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等分脾肝藥能生血而經自行矣又
有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補脾若脾胃無病果有血塊
凝結方宜行血通經不愈天葵木賊黃芩知母續命散少思慮則

○論室女經閉成勞因思慮傷心

寇宗奭曰夫人之生以氣血為本人之病未有不先傷其血氣者
若室女童男積想在心思慮過度多致勞損男子則神色消散女
子則月水先閉蓋憂愁思慮則傷心而血逆竭神色先散月水先
閉且心病則不能養脾故不嗜食脾虛則金虧故發嗽腎水絕則
木氣不榮而四肢乾痿故多怒鬢髮焦筋骨痠若五臟傳遍則死

此用青蒿者
亦不妨以其
清氣中熟也
暗室一炬

亦須兼脾益
胃陽助陰主
治有誤也

自能改易心志用藥扶持庶可保生切不可用青蒿至蟲等涼血
行血宜用栝子仁丸澤蘭湯益陰血制虛火
薛氏曰經云五穀入於胃其糟粕津液宗氣分爲三隧故宗氣積
於胸中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸榮氣者泌其津液注之於
脉化以爲血以榮四肢內養五臟六腑若服苦寒之劑復傷胃氣
必致不起

一室女年十七病久不愈天癸未通發熱咳嗽飲食少思欲用通
經丸余曰此蓋因稟氣不足陰血未充故耳但養氣血益津液其
經自行彼惑於速効仍用之余曰非其治也此乃剽悍之劑大助
陽火陰血得之則妄行脾胃得之則愈虛後果經血妄行飲食愈
少遂致不救

既有避年之
名不必強求
其治

脉經云。有一婦將一女子。年十五時來診。言女子年十四時經水
自下。今經反斷。其母言恐怖。師曰。若是夫人親女。必夫人年十四
時亦以經水下。所以斷此為避年。勿怪。後當自下。此真氣猶怯。藥
賦素弱而然也。宜固天元真氣。使水升火降。則五臟自和而經脉
通矣。

○論經閉因積冷結氣
要略曰。婦人之病。因虛積冷結氣。為證經水斷絕。至有歷年血寒
積結。胞門寒傷。經絡凝堅。在上嘔吐涎唾。久成肺癰。形體損分。在

中盤結。繞臍寒疝。或兩脇疼痛。與臟相連。或結熱中。病在閔元。脉
數生瘡。肌若魚鱗。時着男子。非止女身。在下未多。經候不勻。令陰
掣痛。小腹惡寒。或引腰脊。下根氣衝。氣衝急痛。膝胫疼痛。煩奄忽眩

據此吐法能
李子和者則
可在他人則
不可用吐固
是法然而
虛者不宜

胃狀是厥顛或有憂慘悲傷多噦此皆帶下非有鬼神久則羸瘦
脉虛多寒三十六病千變萬端審脉陰陽虛實緊弦行其鍼藥治
危得安其雖同病脉各異源予當辯記勿謂不然

○論經閉因痰飲所隔

張子和云凡婦人月事不來用茶調散吐之次用玉燭散芎歸湯
三和湯桂苓白朮散之類降心火益腎水開胃進食分陰陽利水
道之藥也

一婦人月事不行寒熱往來口乾煩赤飲食少且暮聞欬一二聲
諸医皆用重砭水蛭乾漆礪砂芫青紅娘子沒藥血竭之類惟戴
人不然曰古方雖有此法奈病人服之必臍腹發痛飲食不進乃
命止藥飲食必進內經曰二陽之病發心脾心受之則血不流故



惟有癆者可
用亦須形病
俱實

形盛氣突病
其藥當然非
輕試之法惟
之

女子不月既心受積熱宜抑火升水流溫潤燥開胃誘食乃涌出
痰一二升下泄水五六行溫水上下皆去血氣自然滑流月事不
爲水溫所隔目依期而至矣亦不用重蟲水蛭之類有毒之藥如
用之則月經總來小澀反閉他證生矣凡精血不足宜前之以食
大忌有毒之藥偏勝而致天關多矣

一婦人年二十四歲經水不行寒熱往來面色痿黃唇焦頰赤時
咳三二聲問其所服之藥黑神散烏金丸四物湯燒肝散驚風散
建中湯寧肺散鍼艾千百轉劇家人意倦不欲求治戴人憫之先
涌痰五六升午前涌畢午後進食餘證悉除後二日復輕涌之又
去痰一二升食益進不數日以下通經散蕩痰一二升數日去痰
皮數重小者如蟬片大者如葦膜不月餘經水自行神氣大康矣

○論下利經斷利止經來

脉經曰婦人下利而經水反斷者何也師曰但當止利經當自下勿惟所以利不止而經斷者但下利亡津液故經斷利止津液復經當自下若婦人血下咽乾而不渴其經必斷此榮不足本自有微寒故不引飲渴而引飲者津液得通榮衛自和其經必復下

○論經閉總因血滯血枯

李氏曰婦人以血為主天真氣降壬癸水合腎氣全盛血脉流行當以三旬一見以象月盈則虧故日月經上行與產後一般若其時餘血一占未淨或外被風寒及溫冷暑熱邪氣或內傷生冷七情鬱結為痰為瘀凝積於中曰血滯或經止後用力太過入房太甚及服食燥熱以致火動邪氣盛而津液衰曰血枯

驚則氣亂故
錯經妄行

怒則氣逆上
冲甚則嘔血

總結

良方云經後被驚則血氣錯亂妄行逆於土則從口鼻而出逆於
身則血水相搏變為水腫。怒則氣血逆於腰腿心腹背脇手足
之間重病經行則發過期則止。怒極傷肝則有眩暈嘔血癰血
風瘡瘍等病。加之經血滲漏於其間遂成瘀血生瘡淋瀝不絕。溫
熱相搏遂為崩帶。血結於內變為癥瘕。凡此妄證百出。不過血滯
與枯而已。但血滯亦有虛熱血枯亦有虛熱。故重則經閉不通以
滯枯分言。輕則經水不調。止言虛為熱而已。○血滯經閉宜破者
原因飲食毒熱或暴怒凝瘀積痰。直須大黃乾漆之類。推陳致新
俾舊血消而新血生也。若氣旺血枯起於勞役憂思。却宜溫潤滋
補。或兼有痰火濕熱。尤宜清之涼之。每以肉桂為佐者。熱則血行
也。但不可純用峻藥以虧陰道。至於耗氣益血之說。雖女科要法

以肝藏血時
主氣也

但血爲氣配。氣熱則熱。氣寒則寒。氣升則升。氣降則降。氣行則行。氣滯則滯。如果鬱火氣盛於血者。方可單用香附丸散。抑氣散當加木香。檳榔。枳殼。以開鬱行氣。若氣亂則調氣。冷則溫。氣虛則補。男女一般。陽生則陰自長。氣衰則血亦涸。豈可專耗其氣耶。論者多泥叔和血旺氣衰。不知叔和論肝肺二脉。則宜肝旺於肺。其實氣血平和。有孕故繼曰。兩臟通和。但婦人見偏性。鄙婢妾志。不得伸鬱怒。無時不起。故香附爲女人仙藥。經曰。邪氣勝則實。正氣奪則虛。可不悟諸大槩。只虛熱痰氣四證而已。不調亦大相同。隨證調治。飲食調和。自然血氣流通。更有凝滯。然後可用紅花當歸散。紫葳散。通經丸。導經丸之類。虛者只用當歸散以通之。通後又須養血益陰。使津液流通。苟不務氣血充和。而惟以毒藥攻逼。是求

千金於乞丐必死而後已

○論經閉大法

丹溪云經不通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱銷血或因
久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血或因痢疾失
血治宜生血補血除熱調和之劑隨證用之或因七情傷心心氣
停結故血閉而不行宜調心氣通心經使血生而經自行矣

也又為心主血也

○脉法

脉經曰腎脈微瀦為不月經閉脉法備前調經閉當參看

○治血枯經閉

玉燭散治胃熱消渴減食漸瘦津液為熱燥竭以致血海乾枯

惟心病氣安胃熱者方可

此即四物湯與調胃承氣湯合方也



此治勞心之
實熱者也如
心虛而熱收
於內與夫心
虛而上衰者
不宜妄用

當歸

川芎

白芍藥

地黃

大黃

芒硝

甘草

各等

右剉每服八錢水煎食前服

三和湯

治勞心心火上行以致胞脉閉塞月事不來

此即四物湯與源脈

方也

當歸

川芎

白芍藥

地黃

大黃

朴硝

黃芩

梔子

連翹

薄荷

甘草

各等分

右剉每服八錢水煎服

二黃散

治婦人室女經脉不通服之如神

大黃

燒存性二錢

生地黃三錢

右為末作一服空心好酒調下

二氣丸

治月水不調斷絕不產面黃肌瘦憔悴不思食有燥熱



以醋熬大黃
作膏引之入
丹以行血也
四方俱用大
黃而配合不
離四物自有
輕重緩急不
同宜加詳之
心胞是多血
之經此胞脉
當指心胞而
言
熟地以補天
一之水入參
以生天一之
炁所謂水生
於氣也炁氣
不降則水不

以柴胡引子相泰服之

大黃

四兩另為末醋一升慢火熬為膏子

當歸

白芍藥

各二兩

右為末

以膏子和丸如桐子大每服二十丸淡醋湯下食前服

日進三服

五補丸

補諸虛安五臟堅骨髓養精神凡胞脉閉先服降心火

之劑後服此丸及衛生湯以治脾養血也

熟地黃

人參

牛膝

酒浸去蘆焙乾

白茯苓

地骨皮

各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三五十丸空心溫酒下

衛生湯

當歸

白芍藥

各二兩

黃芪

三兩

甘草

一兩

右為末每服半兩水二盞煎至一盞空心溫服○如虛者加人



北京中医药大学图书馆藏

生故用曰茯苓

以降天氣

地骨皮以清

氣中之火牛

膝引之下行

此立方之大

意也

五神丸補水

之源衛生湯

行已生之血

蓋地黃茯苓

人參俱補裏

氣之不足而

黃芪甘草又

蓋表氣之不

足當歸芍藥

行肝血之不

足有先后天

之意焉

參一兩

潔古先服降心火之劑者蓋亦苓連三和玉燭之類。後服五補

衛生者亦補氣之劑也。

栢子仁九 治血虛有火月經耗損漸至不通日漸羸瘦而生潮

熱並治室女思慮成勞經閉慎勿以毒藥通之宜此兼服澤蘭

湯。

栢子仁炒另研牛膝酒洗卷栢各半澤蘭葉續斷各二

熟地黃三兩酒浸半日

右為細末煉密丸如桐子大空心米飲下三十丸

澤蘭湯 治證同前 妙在澤蘭為君

澤蘭葉三兩當歸酒洗芍藥炒名甘草五

