

增校本草從新

上海
廣益書局
印行
六

藥上集

萬應心

通什水
神散原安

通什水
神散原安

竹葉天竹黃琥珀



辛淡甘寒涼心緩脾消痰止渴除上焦風邪煩熱傷寒上焦治法以竹葉石
 竹葉生長甫及一年者為嫩而有力 竹根同葉煎湯洗婦人子宮下脫
 上而微寒涼心經去風熱刺竅豁痰鎮肝明目功同竹瀝而性和緩無寒滑
 之患治大人中風不語小兒客忤驚癇為尤宜 人用亦能寒中 出南海
 大竹之津氣結成即竹肉 片片如竹節者真 以上苞木類

淡滲傷陰凡陰虛內熱火炎水虧者勿服若血少而小便不利者服之反致燥急之苦 松脂入土年
 久結成韓保昇曰楓脂 以手心摩熱拾芥者真以柏子仁入瓦鍋同煮半日擣末

茯苓



甘平益脾寧心淡滲利竅除濕色白入肺瀉熱而下通膀胱能通心氣不腎
 然必上行入肺清其氣源而後能下降利水故 治憂鬱悸心下結痛寒熱
 煩滿口焦舌乾治火下降則熱除 效逆嘔噦膈中痰水水腫淋瀝泄瀉道精

因濕熱故宜小便結者能通多者能止或則便寒 生津止渴則津生 功專行水伐腎小便不禁虛
 寒精滑及陰虧而小便不利者皆勿妄投 松根靈龜結成屋雲南色白而堅實者佳去皮產浙江者
 雖其力甚清近今茯苓 赤茯苓通利 內言入肺膀胱氣分赤者入心小腸氣分時珍曰白而 並

本草竹葉天竹黃琥珀茯苓

通行水

通行水

高消精

散風濕

茯苓神豬苓雷丸

心脾白勝利濕熱赤勝
使不煩渴大便溲小便數
流氣飲腫以上施宜汗疏



有害莖葉並用忌火

胎動腹痛桑寄生兩半阿膠艾葉各半兩水送下第一服
去津濕服或去艾葉只治漏胎生桑寄生兩半一服之

以上寓木類

終

專能行水治水腫膚脹以皮石皮之義皮成則膚之凡腫而
 主治與茯苓同而人心之用具多開心益智安魂養神療心虛驚悸多志善
 忘即茯苓抱根生者入心之用多去皮及中木 茯苓神心木名黃療諸筋攣
 縮偏風喝斜心掣健忘木心木一兩乳香一錢石脂研名散每服二錢
 二茯苓俱惡白飲畏地榆秦艽蠶甲雄黃忌醋 而夜夜之七日愈
 苦甘淡平泄瀉利竅入膀胱腎經升而能降發汗開膜利濕行水與茯苓同
 而泄較甚治傷寒濕熱大熱 經疏曰大熱利小便懷消渴熱腫脹淋濁瀉利
 痰癰 瘰癧多由暑著多乘濕經 宗爽曰損腎皆目潔古曰淡滲燥亡津液無
 濕者勿服 多生楓樹下塊如豬屎故名 馬屎曰通絡藥曰苓白而實者
 苦寒有小毒入胃大腸經功專消積殺蟲 苓即藥也古字通用白而實者
 士曰此應聲蟲也但取本草不應者 殺蟲之外無他長能令人陰痿 竹
 之餘氣得露濕而生故名大小如粟竹刀刮去黑皮甘草水浸一宿酒洗蒸
 或炮厚朴芫花為使惡葛根 宋二兩粉四兩攪之
 苦堅腎助筋骨而固齒長髮甘益血止崩漏而下乳安胎舒筋絡而利關節
 和血脈而除痹痛外科散瘡瘍退風濕 海外落山地暖不蠶桑無採得之
 苦氣化濃露自然生出有言鳥啣他子遺樹而生者非也他樹多寄生恐反

本草綱目

卷九

茯苓神豬

雷丸

終

本草從新卷十 果部 五味

山果 梨果 滋味類

杏

仁



辛苦甘溫而利有小毒為肺降氣行痰解肌除風散寒利胸膈氣逆通大腸
氣秘東垣曰杏仁下喘治氣喘桃仁應在治血便秘當分氣血疎導
桃仁陳氣書便難而喘氣秘者用杏仁陳皮治血便秘當分氣血疎導
通道故並以陳皮佐之杏仁藥宛在上陳皮在下氣之使潤燥消積近之
則治時行頭痛上焦風燥效逆上氣凡舍煩熱喘促其毒性又能殺蟲治

瘡割錫毒狗毒肉積
惡齒根黃芩黃著

因虛而效嗽便閉者忌之雙仁者殺人
杏子酸熟有小毒慎人孕婦忌

去皮尖炒研發散連皮尖研得火良

潤肺下

仁杏仁



甘平止咳下氣消心腹逆悶 有濕痰者勿服 以其性潤也
譬如鷄子者真仁形圓皮黃大直者名甜杏
仁出山東河南不入藥

形扁皮白尖

潤肺下

烏梅



酸澀而溫脾肺血分之果滿腸斂肺肺欲收急食 止血涌痰消腫解毒生津
止渴甲時珍曰梅於冬而實於夏得木之氣故最酸有酸則津生
久嗽瀉痢血痢尤良 惡下有四乾兩通時液飲食酸則津生
肉一狀研細合鹽茶 瘡癰霍亂吐逆反胃下血血崩安胎厥
入醋一服而安 病有當發表者大忌酸收誤食必為害 青梅兼黑為

去黑惡蝕惡肉疽愈後有肉瘡起燒存生研 瘡癰霍亂吐逆反胃下血血崩安胎厥
烏梅酸汁末敷之肥澤 九棗大納入下部少時即通 瘡癰霍亂吐逆反胃下血血崩安胎厥
瘡用 瘡癰霍亂吐逆反胃下血血崩安胎厥

酸澀鹹平功用略同烏梅治瘰癧瘰癧什牙關緊閉喉內暗探牙報涎出即開蓋酸先入筋驚癰喉癰瘰

白梅



核隔氣取半青半黃梅子每個用鹽一兩淹一日夜晒乾又晒至水盡
出每用一核含之養汁入喉二兩餘緣續定通喉破內封埋地百日取
年者治一人收二年者治二人神效一敷乳癰腫毒刺入肉中此藥吞肉
之即收刀箭傷瘡即止血多食損傷傷筋經日破走筋病無多食破若
之即收刀箭傷瘡即止血多食損傷傷筋經日破走筋病無多食破若

葉沉黃苦水經夏不旋有驗

根葉治休息痢反霍亂煮濃汁飲之

桃仁



度後陰腫桃仁搗研傳之俱妙

苦平微甘苦以泄血滯甘以緩肝氣而生新血則肝氣強肝苦急急食甘以
理通大腸血秘治熱入血室血熱血燥血痞損傷積血血刺經閉發逆上氣和
則氣皮膚瘙癢發熱如狂若小腹滿痛小便傷陰氣泡去皮夫炒研碎體仁者有毒不可用香附為使并爛藥麝之

桃花



苦平下溜水除痰飲消積聚利二便療風狂發熱頭壯陽偏癱瘓花柳毒女使夫
樹食花散盡有是還愈以能治痰飲花柳毒女使夫
如傾六日行至數百行皆因下不飲一花柳毒女使夫
實有餘之證若無故而因除百病美顏色諸說而服之為害不小三月

三日採花揀淨以絹袋盛懸檐下陰乾干葉者勿用

桃葉



苦平殺蟲發汗凡傷寒風癰發汗不出以火燒地用水洒之布乾桃葉於上
沙皆可如采嫩者名桃心入藥尤勝桃子生酸甘熱微毒多食令人有
熱生癰瘡有損無益五果列此為下以此與桃最是不落者正月採之若微

補腎

補肺
潤心
潤肺
補腎

源心
肺利
小腸
大

栗

大

栗

梨

溫有小毒 辟邪祛寒 白兔頭 廣乾 桃一兩 黑丑 一合 為末 順氣 脂調 搽之

鹹溫厚腸胃補腎氣 羊乳 小兒不可多食生則難化熟則滯氣 小兒疳積 生嚼粟子



也如腎虧腹脹之類凡用藥者能通之脾虛者指不食之脾虛者指不食之脾虛者指不食之
兒疳病亦禁生者尤為不利 止產肥潤堅 實者佳 金華南藥及微露所產皮薄而嫩花紋甚細而可
用皆不堪入藥宏景曰南藥大惡不堪咬碎 殺為梅毒忌葱魚同食 頻洗服之 食者寒胃三升煎水
頃曰江南出者堅燥少脂不可入藥



甘寒微酸涼心潤肺利大小便 丹溪曰梨者利也止嗽消痰清喉降火生之
六腑之熱然之可滋五臟除煩解渴潤燥消風人知其清火清痰之妙醒酒解毒
之陰實大宜生虛火宜飲之酒後飲之尤為宜 治傷寒發熱熱嗽痰喘中
風失音 治小兒心驚 治小兒驚風 治小兒驚風 治小兒驚風 治小兒驚風

忌用 搗汁用熱膏亦良加薑汁蜂蜜佳清痰止咳與棗腹相間收穢則不爛
生用甘冷潤肺止咳嗽清胃理焦煩乾柿甘寒而滑瀉腸止洩潤肺寧嗽干消宿血治肺癰熱效 虛實

肺病
咳嗽
喘急

肺病
咳嗽
喘急

破字
破字
破字

柿



後飲過飽血反胃神乾則水不飲水愈腸風下血得漏相與大腸
乾則水不飲水愈腸風下血得漏相與大腸
柿霜乃其津液生津化痰清上焦心肺之熱
為九佳治咽喉口舌瘡痛柿性頗寒肺經無火及風寒作嗽冷痢滑洩者
忌之 若與蟹同食令人腹痛作瀉 柿蒂止呃逆氣喘生加丁香生薑取

其開鬱散
亦化治之法

木



酸當而溫和脾理胃飲肺伐肝化食酸能收則止渴生津氣脫能收氣滯
能分調營衛利筋骨初起者將之即去濕熱消水脹治霍亂轉筋胃傷脾
不收則胃氣上逆下泄甚則肝木乘脾而筋脈之轉也時珍曰肝主筋
以木治之則風寒濕熱其走筋以平肝邪乃土中寓木以助金也
陳者良忌

瓜

氣主四肢或寒濕濕于足利或胃受濕熱之上肝熱於脾下流注足則成脚氣
及食何物乃木也切腰足無力多食損齒及骨病癰閉敗血大甚則一日木
木瓜有笑謂諸人曰去此物身即健矣不必用藥也于足盡授江中噴之時即如舊
鐵瓜反花瘡瘡木除望最

山



酸甘微溫健脾行氣消食磨積凡食老難於肉投數枝則易爛其消肉之功
知散於化痰殺小兒痘疹行乳食停留止免枕作痛諸名兒枕瘡少服可
療小腸疝氣治者多食令人嘈煩易飢反伐脾胃生發之氣相宜者服山
查即解一補胃中無積及脾虛惡食者忌服 有大小二種小者入藥一名

棠連子去皮核
亦有用
化食

理氣
中氣
清氣

瀉肝破
氣散積

橘皮



用
廣廈為勝友厚不脆有豬棕紋
名用二陳湯
已而

辛能散溫能和苦能燥能瀉為脾肺氣分之藥
者調中快膈導滯消痰
大治痰濕以健脾順氣而痰自下
定嘔止嗽利水破
癥宣通五臟統治百病皆取其理氣燥濕之功入和中藥則留白入疏通藥
則去白去白名橘紅兼能除寒發表皮能發
氣雖中和亦損真元無滯勿
用
廣廈為勝友厚不脆有豬棕紋
名用二陳湯
已而

青皮



起使須忌痛燥喉令汁
草即解毒餘如沒藥橘葉
可治最發汗辛善發散
氣全
消也
食辛以散之酸
泄之以苦降之也
此核治痛腰痛冷痛去皮炒

辛苦而溫色青氣烈入肝膽氣分疏肝瀉肺
榮胡疏上焦肝氣
青皮疏下焦肝氣
痛多怒久癰結癖入肝散邪入脾除痰胸膈氣逆
陰乳母或因念怒鬱結因味酸積滯胸膈陰之氣不行故致生結
陽沸故熱甚而化膿或因怒鬱結因味酸積滯胸膈陰之氣不行故致生結
透自可消散治法宜以青皮疏肝滯為主再如石膏清胃散結
金銀花蒲公英皂角刺當歸皆可隨宜用之少壯未久則四逆名乳嚴不
氣虛及有汗者忌用
如人至老如人年少壯未久則四逆名乳嚴不
去剝切片醋拌炒
肉生痰聚氣
陳久者良
根葉功用

辛苦酸溫入肺脾二經理上焦之氣而止嘔進中州之食而健脾除心頭痰水治痰氣欬嗽
氣痛性雖中和單用多用亦損正氣須與參朮並行乃有相成之益爾
陳久者良
根葉功用

氣滿肺下

香櫟香



略同

苦甘酸辛而平下氣消食快膈化滯解酒毒治飲酒人口氣去腸胃中惡氣散憤懣之氣療妊婦不思食口淡愈疾氣欬嗽用香樂去核切炒餅內浸酒盪能去濁惡之氣無滯而虛者禁之孕婦氣虛者勿與此袖之屬也其黃而小者為蜜爾其大者謂之朱樂最大者謂之香樂今人誤稱爲香圓不知香圓即佛手柑也香樂夏初生白花六月成實至冬黃熟今人於六七月間採其小實曬乾至十月偽枳寔枳殼



葉杞 枕紅花



酸 濡 甘 溫 生 津 治 消 渴 洩 精 水 痢 小 兒 疳 癆
頭 髮 豎 黃 潔 癯 瘦 藥 者 乾 末 和 醋 傳 多 食 發 熱

苦平清肺和胃而降氣氣下則火降痰消氣有餘便是治熱欬嘔逆口渴時
曰火降痰消則嘔者不嘔逆者一婦肺熱久嗽生痰如火燥肌瘦將成勞以
不逆渴者不渴欬者不欬矣枇杷葉熬炙紫苑杏仁桑皮水通等分大
黃減半蜜丸櫻桃大食後夜即吞含化一丸未終劑而愈
重三錢蒸氣足拭淨毛毛射肺治胃病薑汁塗炙黃治肺病蜜水塗炙黃

枇杷甘酸平止渴下氣利肺氣止吐逆除上焦熱潤五臟多食發痰熱傷脾同炙肉及熱飢食令人患熱黃痰

酸甘溫去痰止嘔消食下氣生津和利五臟能滌腸胃除煩懣惡氣燒灰服斷下痢甚驗 多食令人

和利五
生津

高腸壯
用藥精

一名白
破帶去
腐潰

補命門
利三焦

楊梅



石榴皮



瘡出血

銀杏



胡桃



食熱血損當反筋忌生葱同食發瘡致疾 杭州蘇州最善膏時酸紅炭
夢寐味如蜜鹽藏蜜清糖收火清火俱佳 衛生藥之甘草 根皮解砒毒煎
反油潤空溫人傷 釘之即除

酸瀉而溫能瀉腸止泄痢下血 崩帶脫肛 以石榴皮陳壁土如明礬少
研末敷而又能殺蟲浸木汁黑如墨烏鴉方綠雲油中用之 能感隔成痰
痢積未盡者服之太早反為害也 忌鐵器 酸石榴治瀉痢崩中帶下過
食損肺壞齒 榴花千葉者心熱吐血又研末吹鼻止衄血立效亦敷金

甘苦收瀉飲食溫肺益氣 色白 定痰哮喘嗽縮小便葉濁 帶濁赤者
二酸亦有因皮而無湯氣分從肺入腸來並有寒熱 生食降濁痰解酒消毒殺
蟲花亦有人不得見性陰 漿澤手面洗油膩之功可以類推 多食則收瀉
太過令人壅氣腫脹小兒發驚動疳

味甘性熱肉潤皮滑 皮破肺定喘 國腎精今華中 通命門利三焦潤腸胃
悅肌膚溫肺補腎治痿癱陰痿補骨脂一木一火大補下焦 胡桃屬木破故
物生之妙云 命門者三焦之母 命門火者三焦之根 命門火者三焦之根
物生之妙云 命門者三焦之母 命門火者三焦之根 命門火者三焦之根
物生之妙云 命門者三焦之母 命門火者三焦之根 命門火者三焦之根

為生命之原相火之主精 萬生之原相火之主精 萬生之原相火之主精
也難經誤以右腎為命門 萬生之原相火之主精 萬生之原相火之主精
而惡燥胡執類其狀皮內 萬生之原相火之主精 萬生之原相火之主精
缺潤燥而胡血使精氣內 萬生之原相火之主精 萬生之原相火之主精
充血脈通利諸症有除矣 三焦通利致土而虛寒喘嗽 萬生之原相火之主精
萬生之原相火之主精 萬生之原相火之主精 萬生之原相火之主精

補血益氣

宜飲寒

補心脾

宜清肺

榛



果類

中時時服即成湯便時枕置如前數時必愈速如宜服豆而痰消止其開幼子病後喘急
全服人多胡桃湯服之愈明日去皮嚼碎作仍連皮用信宿而厚皮能飲也 同慈白蜜茶痔煎
散下而腰脚虛痛內而心腹諸痛外而瘡腫諸毒皆可除也 動風痰助腎火肺有痰熱命門火熾
者勿服 潤燥養血去皮飲連皮 油者有毒故殺毒治瘡 殼外青皮壓油為乾脂

甘平調中開胃益氣力實腸胃令人不飢健行 久留最易油壞 以上山

荔枝



荔枝反火病人尤忌之

甘溫而溫散滯氣辟寒邪治胃脘痛婦人血氣痛 銀存性正 實一兩為
下名痛散 其實雙結而核肖星丸也 腎子 故治癰疽卵腫有連類象形之
義 酸存性酒調服加茴香青 無寒濕滯氣者勿服 燒存性 荔枝甘酸
皮各炒為末酒服亦良 熱解煩渴止呃逆 荔枝末 調下立止 多食令人發熱煩渴銀腫血病
穀發痘瘡人解荔枝熱 如 不消通以本物消之之意 花皮根喉痹腫

痛煎汁含嚥

龍眼



甘平潤補心長智一名悅胃培脾療健忘與怔忡能安神而熟寐一切思慮
過度勞傷心脾反血不歸脾諸證 歸脾湯用為 向導者五味入口甘先歸脾
及吐血血崩腸風下血等證 歸脾湯能引血歸脾而血耗致有健忘怔忡驚悸
家用龍眼肉細嚼待津液生和津酒而熱此即服王褒之法也
甘溫酸平清肺開胃下氣除煩生津 解酒利咽 喉解諸毒河豚毒投入反魚
骨硬煮汁 核主治異癰癰 凡解河豚毒及治諸急骨哽如無鐵棧仁
甘平而潤胃切喉痛研爛敷之 存性研末每服二錢空心酒湯調下



石

一

滋養枝核龍眼肉嫩

四

段蟲

潤燥

瀉氣行
水破瘀
攻堅

瀉下
通利水

一名大
室一石
木解酒

植子海松子積榔 大腹皮 枳椇子



甘瀉而平緩蟲積宜食之瘰癧消積丹溪曰此貼家果也多食引火入肺大腸受傷反緩豆食種子七枚以愈為度

甘溫而香潤肺開胃散水氣除諸風治肺燥咳嗽松子一兩胡桃二兩研使虛秘同柏子仁麻子仁等分研便溲精滑者勿與有濕痰者亦禁



失長破之作錦紋者宜

水浸

諸氣至下極氣虛下陷者所當遠避諸氣至下極氣虛下陷者所當遠避

下極攻堅去脹消食行痰下水除風醒酒殺蟲治瘕癖癥結瘰癧癰疽水腫

苦溫破滯平溫散邪瀉胸中至高之氣使之下行性如鐵石能墮諸藥至於

御氣御氣冲心者尤須用之大小便氣秘裏急後重或同木香枳殼墜

辛泄肺溫和脾下氣寬胸行水通大小腸治水腫脚氣后腰痠痛癰疽霍亂

稍涉虛者勿用取皮酒洗黑豆湯再洗洗之即除忌火取皮酒洗黑豆湯再洗洗之即除忌火

積榔同功而力稍緩形亦異積榔相似腹大而扁積榔同功而力稍緩形亦異積榔相似腹大而扁

甘平去濕除煩潤五臟解酒毒甘平去濕除煩潤五臟解酒毒

距故從名經需黃赤其甘木皮治五痔和五臟

解利肺補

一名蜀椒 一名蜀椒 一名蜀椒

通行

一名蜀椒 一名蜀椒 一名蜀椒

落花生



辛甘而香潤肺補脾和平可貴 出閩廣藤生花落地而結實故名 炒用 以上夷果類

辛大熱有毒入肺發汗散寒治風寒欬嗽入脾暖胃燥濕消食除脹治心腹冷痛吐瀉痢疾飲水腫入右腎命門補火治腎氣上逆火歸元陽衰洩精漫數陰汗有人冷氣入心裏腫滿疼門欬或以下布氣散厚半寸包破血通經降服安蛇黃明此則伏火通日再易以消為度或以往來連亦長辟疫伏邪殺鬼疰蟲黃明此則伏火通日再易以消為度或以往來連亦長破血通

脈消癢痺行肢節利機關

命門火衰有寒濕者宜之陰虛火旺之人在所大忌火自水中生多散其

也 蜀產肉厚皮皺為川椒比秦椒略小去開口者能殺微炒去汗搗去裏面黃殼取紅用紅椒得鹽

良於杏仁為使畏雄黃附子防風欬冬涼水麻仁中其善者用涼水麻仁漿解之

椒目



苦辛小毒類行水道不行穀道消水蠱除脹定喘 根辛熱殺蟲煎湯洗脚氣及濕瘡

秦椒



辛苦溫有毒溫中散寒燥濕除風下氣殺蟲治上黃明此則伏火通日再易以消為度或以往來連亦長欬吐逆病癰風濕寒痺利五臟去老血療久痢月閉腹中冷痛瘧後餘疾惡血痢腹痛 禁忌修治保同川椒 此川椒味短欬依惡苦蔓防藥黑雄黃手足心腫風也椒

辛大熱有毒溫中下氣快膈消痰治寒痰食積腸滑冷痢陰毒腹痛胃寒吐水牙齦浮熱作痛合為殺一切魚肉蠶蠶毒劉伯溫多能部毒方蜈蚣破傷胡散喉閉之即不痛 世人因其快膈者之音定誤損肺志氣動火動血損

燥快扁
消痰

宜散風
寒濕下
疏肝

濕熱清
神消食

胡椒

吳茱萸

茶



齒昏目發瘡痔嗽毒必陰氣至足者方可用 單澄茄即胡椒之大者乃一
類二種主治略同亦易得

辛苦大熱有小毒疏肝燥脾溫中下氣除濕解鬱去痰設蓋開腠理逐風寒

治厥陰頭痛陰毒腹痛嘔逆吞酸

日一發頭痛背寒嘔酸不得食一方名吳仙丹

吳茱萸湯治七次與此茶等小蜜丸服之而愈

疝奔豚瘕瘵痔疾腸風脚氣水腫口舌生瘡

氣逆裏急宜此性雖熱而引熱下行

利大腸墮下虛後餘血 損氣動火皆曰發瘡病非憂滯有濕者勿用即有寒濕者亦宜酌量少

用 開口陳久者良寒湯泡去苦烈汁止嘔黃連水炒治疝鹽水炒治血醉炒慈丹參硝石畏紫石英

苦甘微寒下氣消食去痰熱除煩渴清頭目

走清頭目安答曰其 醒神睡能清神聖云云

下清則上自清矣 醒神睡能清神聖云云

每與茶等分煎服名茶飲治赤白痢茶助陰

非中冷中風由痰厥平調並能消暑解酒食毒

單煮茶急飲吐直吐山膽汁乃已渴而即愈

最能 去油 酒後飲茶引入膀胱腎經患癰疽水腫空心尤忌 味甘而細者良 茶葉天地至清之氣處於清

苦寒有小毒陽明胃吐藥能吐風熱反延上膈宿食 吐去上焦之邪經所謂其高者因而越之在上者

吳茱萸茶瓜蒂

一名瓜
丁宜水

渴暑熱

和中潤

補和中

補和中
和血

瓜蒂



無實邪者切勿輕投
當吐而胃弱
昔代以參藜

瓜葉無髮搗汁塗之即生



西瓜 甘蔗 白沙糖 紫沙糖

本草綱目

卷一

西瓜 甘蔗 白沙糖 紫沙糖

通以赤小豆之酸吐去上焦有邪之物則木得舒易天
漢曰吐中就有發散之美子日和諸汗法古方多有之
之故吐中就有發散之美子日和諸汗法古方多有之
藥汗其以此夫治風眩頭痛懷不眠願痛喉痹上脫痞
水腫黃疸或合小豆煎或濕熱諸病類編云一女子病
眼貼三進而病如瘧人溺後勿食辛病者不拘損胃傷
已午以前行之病如瘧人溺後勿食辛病者不拘損胃傷
甜瓜性冷有小毒損陽下痢者凡瓜皆冷早育尤甚

甘寒瓜性寒暴之尤寒諸含賦云瓜解暑除煩利便醒酒止渴清熱
關云有人苦目病或冷或熱性寒瓜皮切片暴多食傷脾助濕
乾日服之速愈由其性冷降火故也
瓜致秋來成症少食有寒濕者忌之

甘微寒和中助脾除熱潤燥消痰止渴解酒毒利二便治嘔噦噎膈反胃
汁大便秘結外臺方謂或搗汁胃寒嘔吐中滿滑瀉勿食
口乾渴用蔗漿汁半青果米

甘溫補脾緩肝潤肺和中消痰治嗽中滿者勿服多食助
四合煮粥日食一大極潤心脾
甘溫補脾緩肝潤肺和中消痰治嗽中滿者勿服多食助

者為冰糖食口爽沙
功用與白者相倣而稍遜和血則紫者為優和而惡寒自行也
至紫黑色其性較白沙糖更溫生胃火助濕熱損齒生蟲作湯下小兒尤散
誤矣水一杯服白湯調亦可以上諸類

者為冰糖食口爽沙
功用與白者相倣而稍遜和血則紫者為優和而惡寒自行也
至紫黑色其性較白沙糖更溫生胃火助濕熱損齒生蟲作湯下小兒尤散
誤矣水一杯服白湯調亦可以上諸類

者為冰糖食口爽沙
功用與白者相倣而稍遜和血則紫者為優和而惡寒自行也
至紫黑色其性較白沙糖更溫生胃火助濕熱損齒生蟲作湯下小兒尤散
誤矣水一杯服白湯調亦可以上諸類

者為冰糖食口爽沙
功用與白者相倣而稍遜和血則紫者為優和而惡寒自行也
至紫黑色其性較白沙糖更溫生胃火助濕熱損齒生蟲作湯下小兒尤散
誤矣水一杯服白湯調亦可以上諸類

古名補
實心精
清精潤

開胃去
濕熱

清精

清血

生涼血
散瘀熱
胃甜心
五

蓮子 蓮子 蓮子 蓮子 蓮子 蓮子 蓮子 蓮子 蓮子 蓮子



甘平而清能交水火而攝心腎安靜上下君相火邪
心腎有 諸達九清精氣厚腸胃治脾泄久痢白濁夢遺女人崩帶一切血病
大便 燥者勿服 去心皮熬熟焙乾得枸杞白朮山藥茯苓良 蓮子中青心苦
寒清心去熱 眼赤作痛蓮子末一匙
苦寒清心除煩開胃進食去濕熱 願治噤口痢
黃連人參 諸證 無濕熱而虛寒者勿服蓮之黑而沉水者
石蓮人參 頂西乃何用
石蓮產野中 石蓮產野中者百年不壞人得食之
不苦 甘平而清者與蓮子同功清心通腎益血固精烏髮黑髮
諸血小便不利者勿服 忌地黃葱蒜

瀉平解熱毒消痰血療瘡後血悶
和地黃研汁入 止吐衄淋瀝一切血證

生用甘寒涼血散瘀
如誤服 生用甘寒涼血散瘀
上沖 生用甘寒涼血散瘀
蟹毒 生用甘寒涼血散瘀
金瘡 生用甘寒涼血散瘀
天泡 生用甘寒涼血散瘀
市中所賣 生用甘寒涼血散瘀
蓮花貼 生用甘寒涼血散瘀
天泡 生用甘寒涼血散瘀

經宮升
陽散症

古名艾
一名俗名

一名雞
現補腎
清精

一名烏
地來一名
熟消食

通行血

荷葉



升消耗散虛者松之

苦平其色青其形仰其中空其氣震震震即感少陽甲膽之氣燒飯含藥裨助脾胃而升發陽氣濕古根木凡用痘瘡倒壓者用此發之木胡葉等分下能散瘀血留好血治吐衄崩淋損傷虛癰一切血證洗腎囊風酒服三錢治遺精吐衄東垣曰雷頭風燈頭面疔瘡腫痛寒熱狀如傷寒病在三陽不可用寒藥宜刺破後敷過清涼湯治之荷葉一錢升服茶末各五錢煎

艾



甘寒安中消暑止渴解酒多食傷人王食貨或使記以三角四兩者為艾兩角兩角三角四角之味者為艾後凌昆隨月而然猶寒乾之向日有

實



甘和而濡補脾固腎助氣滋精治夢遺滑精解暑熱酒毒痔帶濁泄瀉小便不禁大小便不利者勿服小兒不宜多食甚難消化蒸熟搗粉溫精藥或連殼用

薺



甘寒而滑消食攻積除胸中實熱治五種噎膈氣壅食噎勞瘵寒消渴黃疸血證寒服能破銅性極涼濕有冷氣人不可食致腹脹滿小兒食多膈下結痛

慈菇



苦甘微寒主治百毒瘡後血悶定心欲死產難胞衣不出搗汁服一升又下石淋多食發腸風痔漏崩中帶脚氣離風又使人乾嘔損齒失顏色皮肉乾燥慈菇葉調蚌粉燒存性研末散之